

معجم الرياضيات

Mathematics
Dictionary

١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م

اهداءات ٢٠٠٣

أ.د / شوقي ضيف
رئيس مجمع اللغة العربية

معجم الرياضيات

Mathematics Dictionary

وضع: لجنة الرياضيات بالمجمع

إشراف: الدكتور عطية عبد السلام عاشور

إعداد وتنفيذ: السيدة أوديت إلياس

السيدة تهاني العجاتي

عضو المجمع ومقرر اللجنة

مدير عام التحرير والمعاجم العلمية

المحررة العلمية

لجنة الرياضيات

عضو المجمع ومقرر اللجنة

عضو المجمع

عضو المجمع

عضو المجمع

خبير بالمجمع

خبير بالمجمع

خبير بالمجمع

محررة اللجنة

الأستاذ الدكتور عطية عبد السلام عاشور

الأستاذ الدكتور محمود مختار

الأستاذ الدكتور سيد رمضان هدارة

الأستاذ الدكتور بدوى طبانه

الأستاذ الدكتور بديع توفيق حسن

الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد غالب

الأستاذ الدكتور نصر على حسن

السيدة تهانى العجاتى

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(تقديم)

يمثل العمل الذى نقدمه اليوم أول معجم للرياضيات يصدر عن مجمع اللغة العربية ، ويتضمن المصطلحات العربية المقابلة لتلك التى تبدأ فى اللغة الإنجليزية بالحروف A ، B ، C . وقد احتفظنا بالرموز الأجنبية التى استقر الرأى عالمياً على استخدامها كما احتفظنا بالحروف اليونانية لاستخدامها فى جميع اللغات تقريباً . وقد كتبت المعادلات والجمل الرياضية من اليمين إلى اليسار أى فى عكس الاتجاه التى تكتب به فى اللغات الأوروبية . وذلك قد يسبب بعض الصعوبة للقارئ وربما بعض اللبس ، فمثلاً الرمز $>$ ، $<$ (أكبر من وأصغر من) تعنى العكس فى اللغة العربية . كما أن دالة مثل دالة بسل (x) إما أن تكتب على الصورة x_j (س) إذا أردنا الاحتفاظ بالرمز j الذى استقر دولياً أو على الصورة j (س) حيث لا يستخدم الرمز المستقر وكلا الاختيارين ليس مرضياً تماماً .

وقد دأبت بلاد كثيرة من التى لا تستخدم اللغات الأوروبية ، مثل اليابان والصين ، على كتابة المعادلات والجمل الرياضية كما هى فى اللغات الأوروبية ، حتى لوجاءت هذه المعادلات فى سياق الكلام ، وربما يكون الأفضل مستقبلاً أن نسير سيرهم فى هذا الأمر . وسوف يدرس هذا الموضوع ، وينفذ ما يتفق عليه عن إصدار المعاجم المقبلة .

وقد قمنا بإعطاء تعريف مختصر لكل مصطلح يساعد القارئ ، الذى يفترض أن له بعض الدراية بأحد فروع العلوم الرياضية ، على متابعة الدراسة فى هذا الفرع أو غيره من الفروع إذا هو شاء .


موضوع آخر سيدرس هو تخصيص معجم لكل فرع (أو لمجموعة فروع) من الرياضيات ، فقد اتسعت رقعتها بين البحتة والتطبيقية مما يجعلها عدة علوم وليس علماً واحداً . ونحن إذ نقدم هذا الاجتهاد ، نرحب بكل التعليقات والاجتهادات الأخرى وسننظر فيها بكل جدية .

المعجم الحالى هو نتيجة جهود سنوات طويلة للجنة الرياضيات . ولا بد أن نذكر هنا بكل
العرفان فضل كل من المرحومين الأساتذة الدكتور/ محمد مرسى أحمد ، والدكتور/ عبد العزيز
السيد والدكتور/ إبراهيم أدهم الدمرداش الذين كانوا مقررين للجنة فى فترات مختلفة والأستاذ/
الدكتور محمود مختار أطال الله عمره والذي سبقنى كمقرر للجنة .
ونود أن نسجل هنا تقديرنا للجهود الذى بذلته السيدة أوديت إلیاس اسكندر مدير عام
التحرير والمعاجم العلمية والسيدة تهانى العجاتى محررة اللجنة فى إعداد هذا المعجم ، ولولا هذا
الجهود والتعاون المخلص الذى لمسته اللجنة منها ما كان من الممكن إصدار هذا المعجم .

والله الموفق ، ، ،

عطية عبد السلام عاشور
« مقرر لجنة الرياضيات »

(A)

<p>بينها . فمثلاً :</p> $\frac{4}{5} = \frac{96}{120}$	<p>العادّ abacist</p> <p>من يستخدم العداد abacus</p>
<p>اختصار صيغة</p> <p>abbreviation of an expression</p> <p>تحويل صيغة رياضية إلى صيغة أبسط منها</p> <p>مثل :</p> $p(x + y) + (x + y) = (x + y)(p + 1)$ $\frac{p}{x} = \frac{(x - y)p}{(x - y)x} \quad (\text{بشرط أن } x \neq 0)$	<p>عداد abacus</p> <p>جهاز بسيط يستخدم لإجراء العمليات الحسابية .</p> 
<p>زمرة آبلية</p> <p>Abelian group</p> <p>= زمرة إبدالية</p> <p>= commutative group</p> <p>زمرة عملياتها الثنائية تحقق خاصية الإبدال .</p> <p>أي أنه : إذا كانت (س، *) زمرة فلكل ٢ ،</p> <p>\exists س : $٢ * س = س * ٢$. فمثلاً فئة</p> <p>الأعداد الحقيقية تكون مع عملية الجمع زمرة</p> <p>آبلية .</p>	<p>قسمة مختزلة</p> <p>abbreviated division</p> <p>= synthetic division</p> <p>قسمة كثيرة حدود في متغير واحد س على</p> <p>س - ٢ ، حيث ٢ مقدار ثابت ، باستخدام</p> <p>المعاملات المنعزلة detached coefficients وترتيب مبسط للعمل .</p>
<p>مطابقة آبل</p> <p>Abel's identity</p>	<p>اختصار كسر</p> <p>abbreviation of a fraction</p> <p>تحويل الكسر إلى أبسط صورة له ، بقسمة</p> <p>كل من بسطه ومقامه على العوامل المشتركة</p>

<p>مجموع ل إذا كانت</p> $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{r^n} = \frac{1}{1-r} \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ <p>موجودة وتساوى ل .</p>	<p>المتطابقة</p> $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{r^n} = \frac{1}{1-r} \sum_{n=0}^{\infty} a_n \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{r^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{r^n} + \dots + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{r^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{r^n}$ <p>حيث $r \neq 1$ ،</p>
<p>مسألة آبل</p> <p>Abel's problem</p> <p>إيجاد معادلة شكل سلك أملس واصل بين نقطتين في المستوى الرأسى ، إذا انزلت عليه نقطة مادية مبتدئة من حالة السكون تحت تأثير الجاذبية الأرضية فإن زمن هبوطها لمسافة رأسية ص يكون أقل ما يمكن .</p>	<p>ص $\frac{1}{r} = \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{r^n}$</p> <p>وتنسب إلى عالم الرياضيات الألماني آبل (١٨٠٢ - ١٨٢٩) .</p> <p>متباينة آبل</p> <p>Abel's inequality</p> <p>إذا كان $s_n \leq s_{n+1}$ صفر لكل عدد صحيح موجب n ، فإن</p>
<p>اختبار آبل لتقارب متسلسلة أعداد مركبة</p> <p>Abel's test for convergence of a complex series</p> <p>إذا كانت متسلسلة الأعداد المركبة $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ تقاربية ، وكانت المتسلسلة $\sum_{n=0}^{\infty} (c_n - c_{n+1})$ مطلقة التقارب ، فإن المتسلسلة $\sum_{n=0}^{\infty} a_n c_n$ تكون تقاربية .</p>	<p>حيث $\frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{r^n} \geq \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{r^n}$ ، حيث $\frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{r^n} \geq \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{r^n}$ ،</p> <p>$m = 1, 2, 3, \dots, n$</p> <p>طريقة آبل لجمع المتسلسلات</p> <p>Abel's method of summation of series</p> <p>طريقة لجمع المتسلسلات بحيث تكون</p>
<p>اختبار آبل للتقارب المنتظم</p> <p>Abel's test for uniform convergence</p>	<p>المتسلسلة $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{r^n}$ قابلة للجمع ولها</p>

التقارب لقيم s حيث $|s| > |c|$
 ٢ - إذا كان محـ $\sum_{n=0}^{\infty} s^n$ يؤول إلى d (س)
 لجميع قيم s حيث $|s| > 1$ وكان
 محـ $\sum_{n=0}^{\infty} s^n$ يؤول إلى l عندما $s = 1$ فإن
 نهـ $d = (s) = l$ ، حيث صفر $\geq s \geq 1$.

الزيع (في الفلك) **aberration**
 الحركة السنوية للموضع الظاهري للنجوم
 الثابتة ، والناشئة من حركة الأرض حول
 الشمس .

الضرب المختزل

abridged multiplication

إغفال الأرقام التي لا تؤثر على درجة الدقة
 المطلوبة بعد كل عملية ضرب برقم من العدد
 المضروب فيه . فمثلاً إذا كان المطلوب إيجاد
 حاصل الضرب $235 \times 7,1624$ صحيحاً
 لرقمين عشرين فقط ، فإن الضرب المختزل
 يجرى كالتالى

$$\begin{aligned} 235 \times 7,1624 &= 7,1624 \times 5 + 7,1624 \times 30 \\ &= 7,1624 \times 200 + 7,1624 \\ &= 1432,480 + 214,872 + 35,812 = \\ &= 1683,16 = 1683,164 \end{aligned}$$

إذا كانت المتسلسلة $\sum_{n=0}^{\infty} s^n$ منتظمة
 التقارب على الفترة المفتوحة $(-1, 1)$ وكانت
 d_n (س) موجبة ومطرودة النقصان في الفترة
 $(-1, 1)$ ، وكان هناك عدد k بحيث أن
 $d_n > k$ لجميع قيم s في الفترة
 $(-1, 1)$ ، فإن محـ $\sum_{n=0}^{\infty} s^n$ (س) d_n (س) تكون
 متسلسلة منتظمة التقارب .

اختبارات آبل للتقارب

Abel's tests of convergence

١ - إذا كانت محـ $\sum_{n=0}^{\infty} s^n$ متسلسلة تقاربية
 وكانت $\{s^n\}$ متتابعة مطردة بحيث $|s^n| > 0$ ،
 حيث له عدد ثابت موجب ، لجميع قيم n ،
 فإن المتسلسلة محـ $\sum_{n=0}^{\infty} s^n$ تكون تقاربية .

٢ - إذا كانت محـ $\sum_{n=0}^{\infty} s^n$ له لكل

m ، حيث له ثابت مختار بعناية ، وكانت $\{s^n\}$
 متتابعة موجبة مطردة النقصان تؤول إلى الصفر
 فإن المتسلسلة محـ $\sum_{n=0}^{\infty} s^n$ تكون تقاربية .

نظرية آبل لمتسلسلات القوى

Abel's theorem on power series

١ - إذا كانت متسلسلة القوى محـ $\sum_{n=0}^{\infty} s^n$
 تقاربية عندما $s = c$ ، فإنها تكون مطلقة

العنصر الأول من الزوج المرتب (س، ص) الذى يمثل النقطة فى نظام الإحداثيات الديكارتية المستوية . ويساوى المسافة بين النقطة ومحور الصادات مقيسة فى اتجاه محور السينات فالنقطة (٣، ٤) مثلاً إحداثيها السينى ٣ . أما فى الفراغ فهو العنصر الأول من الثلاثية المرتبة (س، ص، ع) التى تمثل النقطة فى نظام الإحداثيات الديكارتية ، ويساوى المسافة بين النقطة والمستوى ص ع مقيسة فى اتجاه محور السينات ، فالنقطة (-٣، ٤، ٥) إحداثيها السينى -٣ .

أمبير مطلق

absolute ampère (Abampère)

التيار فى كل من سلكين طويلين متوازيين يحملان نفس التيار بحيث توجد قوة قدرها 2×10^{-7} نيوتن للمتر تؤثر على كل من السلكين . وقد استخدم منذ سنة ١٩٥٠ وحدة قياس للتيار الكهربى .

absolute constant

ثابت مطلق

ثابت لا تتغير قيمته على الإطلاق .

أسلوب الرمز الموجز لـ "بلكر"

abridged notation, Plucker's

طريقة رمزية تستخدم لدراسة المنحنيات ، وتتضمن استخدام رمز واحد للإشارة إلى الدالة التى عند مساواتها بالصفر تمثل منحنياً معيناً . وبالتالي تختزل دراسة تحصيل المنحنيات إلى دراسة كثيرات الحدود من الدرجة الأولى . فمثلاً إذا كانت

$$s_3 = 2s + 3v - 5,$$

$$s_4 = (2-s)^2 + (2-v)^2 - 2,$$

$$s_1 = s + 1, s_2 = \text{صفرًا}$$

حيث s_1, s_2 له أعداد حقيقية ، تمثل عائلة

الدوائر المارة بنقطتى تقاطع المستقيم $s_1 =$

$$\text{صفرًا والدائرة } s_2 = \text{صفرًا}.$$

الإيجاز

abridging

استخدام رمز واحد للدلالة على صيغة أو علاقة أو مقدار . فمثلاً التعبير بالرمز ل عن $s^2 + b + v + c$ هو إيجاز يمكننا من كتابة معادلة الخط المستقيم $s^2 + b + v + c =$ صفرًا على الصورة الموجزة ل = صفرًا .

الإحداثى السينى

abscissa = X - coordinate

معجم الرياضيات

absolute inequality متباينة مطلقة
= متباينة غير مشروطة
= **unconditional inequality**

متباينة صحيحة لجميع قيم المتغيرات
(أولا تحوى أى متغيرات) ، مثال

$$\begin{aligned} & \text{ذلك} \\ & \text{س} + 1 < \text{س} + 2 \\ & \text{س} + 1 < 3 \end{aligned}$$

قيمة عظمى مطلقة

absolute maximum value

القيمة العظمى المطلقة لدالة د (س) على فترة
[أ ، ب] من مجالها هي أكبر قيمة للدالة د (س)
عندما تأخذ س كل القيم من أ إلى ب . والنقطة
التي تأخذ عندها الدالة قيمتها العظمى
المطلقة تسمى نقطة نهاية عظمى مضنة
absolute maximum للدالة د (س) .

قيمة صغرى مطلقة

absolute minimum value

القيمة الصغرى المطلقة لدالة د (س) على
فترة [أ ، ب] من مجالها هي أصغر قيمة للدالة
د (س) عندما تأخذ س كل القيم من أ إلى ب .

absolute continuity اتصال مطلق

(انظر : دالة مطلقة الاتصال
absolutely continuous function)

absolute convergence تقارب مطلق

(انظر : متسلسلة مطلقة التقارب
absolutely convergent series)

وأيضاً

(تكامل مطلق التقارب
absolutely convergent integral)

absolute error الخطأ المطلق

الفرق العددي بين القيمة الفعلية لمقدار ما
والقيمة المقدرة لهذا المقدار .

absolute geometry الهندسة المطلقة

النظام الهندسى الذى يبنى على مسلميات
أقليدس الأربع الأولى ، أى مع استبعاد مسلمة
أقليدس الخامسة للتوازي .

مجمع اللغة العربية - القاهرة

absolute symmetry	تماثل مطلق (انظر : دالة متماثلة symmetric function) .	والسطة التي تأخذ عندها الدالة قيمتها الصغرى المطلقة تسمى نقطة نهاية صغرى طلقة absolute minimum للدالة د (س) .
absolute term	الحد المطلق الحد الذي لا يحتوي على المتغير في مقدار جبرى . فمثلاً في المقدار : $٢س^٣ + ب س + ح$ ، حيث س هو المتغير ، يكون ح هو الحد المطلق ، وفي المقدار $٨ - ٢٧ + ٣$ ، حيث ٢ هو المتغير يكون $٨ -$ هو الحد المطلق .	عدد مطلق عدد يعبر عنه بالأرقام ، لا بالحروف كما في الجبر . مثال ذلك الأعداد ٢ ، ٣ ، $\sqrt{٢}$.
absolute value of a complex number	القيمة المطلقة لعدد مركب = مقياس عدد مركب = modulus of a complex number = معيار عدد مركب = norm of a complex number إذا كان $ع = س + ت ص$ عدداً مركباً ، حيث س ، ص عدداً حقيقيان ، $ت = \sqrt{١ - ص^٢}$ ، فإن القيمة المطلقة لهذا العدد هى $\sqrt{س^٢ + ص^٢}$ ويرمز لها بالرمز $ ع $. القيمة المطلقة (لعدد حقيقى) absolute value (of a real number)	احتمال مطلق الاحتمال المطلق ح ^(٨) لحدث ٢ هو الاحتمال الكلى للحدث ٢ (سلاسل ماركوف) الذى نحصل عليه في المحاولة التونية . صفة مطلقة للسطح absolute property of a surface = صفة ذاتية للسطح = intrinsic property of surface صفة تختص بالسطح فقط لا بالفضاء المحيط به ، أى صفة يحتفظ بها السطح ولا تتغير بتأثير تحويلات التساوى القياسى .

<p>دالة مطلقة الاتصال</p> <p>absolutely continuous function</p> <p>يقال لدالة d (س) أنها مطلقة الاتصال على فترة مغلقة $[a, b]$ إذا كان لكل عدد موجب $\epsilon \in$ يوجد عدد موجب آخر δ بحيث أنه إذا كانت $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)$ فئة نهائية من الفترات غير المتقاطعة التي مجموع أطوالها أقل من δ، فإن</p> $\sum_{i=1}^n d(b_i) - d(a_i) < \epsilon.$	<p>القيمة المطلقة لعدد حقيقي س، ويرمز لها بالرمز s، تساوى س إذا كان س موجباً وتساوى -س إذا كان س سالباً. فمثلاً:</p> $ 2 = 2, -2 = 2.$ <p>القيمة المطلقة لمتجه</p> <p>absolute value of a vector</p> <p>= طول المتجه = length of a vector</p> <p>= معيار المتجه = norm of a vector</p> <p>الجذر التربيعي لمجموع مربعات مركبات المتجه في اتجاهات محاور الإسناد وذلك في الفراغ الإقليدي. فمثلاً القيمة المطلقة للمتجه $2\hat{s} + 3\hat{v} + 4\hat{w}$ تساوى</p> $\sqrt{4 + 9 + 16} = \sqrt{29},$ <p>حيث س، ص، ع هي متجهات الوحدة في اتجاهات محاور الإسناد، والقيمة المطلقة للمتجه:</p> $2\hat{s} + 3\hat{v} + 4\hat{w} \text{ تساوى } \sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2}.$
<p>تكامل مطلق التقارب</p> <p>absolutely convergent integral</p> <p>يقال للتكامل المعتل $\int_a^\infty d(s)$ (س) $\int_a^\infty d(s)$ أنه مطلق التقارب، أو أنه يتقارب تقارباً مطلقاً، إذا كان التكامل $\int_a^\infty d(s)$ (س) $\int_a^\infty d(s)$ تقاربياً.</p>	
<p>متسلسلة مطلقة التقارب</p> <p>absolutely convergent series</p> <p>يقال لمتسلسلة $\sum a_n$ أنها مطلقة التقارب، أو أنها تتقارب تقارباً مطلقاً، إذا كانت المتسلسلة $\sum a_n$ تقاربية.</p>	<p>درجة الصفر المطلق</p> <p>absolute zero</p> <p>درجة الحرارة التي ينعدم عندها حاصل ضرب حجم غاز مثالي وضغطه، وهي -273, 15 درجة مئوية.</p>

الجبرية وهو مجرد عن التطبيقات في عالم المحسوس .	دالة مطلقة التماثل
الرياضيات المجردة	absolutely symmetric function
abstract mathematics	دالة في أكثر من متغير ولا تتغير قيمتها نتيجة كل تبديل لأي اثنين من متغيراتها ، فمثلاً الدالة $s + s + c + c$ دالة مطلقة التماثل في s, s, c, c .
(انظر : الرياضيات البحتة) pure mathematics	absorbent (ميكانيكا)
absurd	ماصّ (ميكانيكا) صفة للمادة أو المحلول الذي يجذب السوائل أو الغازات بغرض إزالتها من وسط أو حيز .
باطل منطقياً ما يؤدي إلى نتيجة تتناقض مع إحدى المسلمات أو المعطيات .	absorbing state
عدد زائد	الحالة الاستيعابية
عدد يزيد مجموع قواسمه الفعلية عن قيمته . فمثلاً العدد ١٢ قواسمه الفعلية ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ومجموعها ١٦ ، أي أكبر من ١٢ ، فهو إذاً عدد زائد . أما العدد ٦ فقواسمه الفعلية ١ ، ٢ ، ٣ ومجموعها ٦ ، أي تساوى العدد نفسه فلا يكون ٦ إذاً عدداً زائداً .	إذا كانت فئة حالات سلسلة "ماركوف" تتكون من الحالة المفردة ح ، فإن ح تسمى الحالة الاستيعابية لهذه الفئة .
المجرد	abstract
ما يدرك بالذهن دون الحواس .	
يعجل (يسارع) يزيد السرعة .	abstract algebra
accelerate, to	الجبر المجرد
	فرع من علم الجبر يبحث في تركيب البنية

معجم الرياضيات

<p>التسارع اللحظي</p> <p>acceleration, instantaneous</p> <p>تسارع الجسم المتحرك مقدراً عند كل لحظة .</p>	<p>تسارع (عجلة) acceleration</p> <p>متجه يساوى معدل تغير متجه السرعة بالنسبة للزمن .</p>
<p>تسارع " كوريوليس "</p> <p>acceleration of Coriolis</p> <p>إذا كان سرّ إطار إسناد يدور بسرعة زاوية ω حول نقطة ثابتة في إطار إسناد آخر ثابت سرّ، فإن التسارع \underline{a} لنقطة مادية (مقيساً بالراصد الثابت في إطار الإسناد سرّ) يعطى بالعلاقة $\underline{a} = \underline{a}_r + \underline{a}_c + \underline{a}_t$ ، حيث \underline{a}_c تسارع النقطة المادية بالنسبة إلى الإطار سرّ، $\underline{a}_r = -\omega \wedge \underline{r}$ التسارع المركزى ، $\underline{a}_t = \omega \wedge \underline{r}$ تسارع كوريوليس ، \underline{r} متجهها الموضع والسرعة للنقطة المادية بالنسبة للإطار سرّ.</p>	<p>التسارع الزاوى</p> <p>acceleration, angular</p> <p>معدل تغير السرعة الزاوية بالنسبة للزمن .</p>
<p>التسارع النسبى</p> <p>acceleration, relative</p> <p>تسارع جسم ٢ بالنسبة إلى جسم آخر ب هو متجه تسارع ٢ مطروحاً منه متجه تسارع ب (حيث تسارع كلا الجسمين يكون بالنسبة إلى محاور مشتركة للإسناد) .</p>	<p>التسارع العمودى</p> <p>acceleration, centripetal</p> <p>= normal acceleration</p> <p>مركبة التسارع فى الاتجاه العمودى على المسار المستوى لنقطة مادية نحو مركز التقوس لهذا المسار .</p>
<p>تسارع الجاذبية الأرضية</p> <p>acceleration due to gravity</p> <p>= تسارع الثقائل</p> <p>= acceleration of gravity</p> <p>تسارع جسيم يسقط رأسياً تحت تأثير ثقله .</p>	<p>تسارع الجاذبية الأرضية</p> <p>acceleration due to gravity</p> <p>= تسارع الثقائل</p> <p>= acceleration of gravity</p> <p>تسارع جسيم يسقط رأسياً تحت تأثير ثقله .</p>

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>access time</p> <p>الزمن التوصل</p> <p>الزمن الذى يمر بين اللحظة التى تطلب فيها وحدة الحساب فى الحاسب الإلكتروني بيانات من وحدة التخزين وبين اللحظة التى يتم فيها وصول هذه البيانات لوحدة الحساب ، أو الزمن الذى يمر بين اللحظة التى تبدأ فيها وحدة الحساب فى إرسال بيانات إلى وحدة التخزين وبين اللحظة التى يتم فيها وصول هذه البيانات لوحدة التخزين .</p>	<p>التسارع المماسى</p> <p>acceleration, tangential</p> <p>مركبة التسارع فى اتجاه المماس لمسار جسيم متحرك .</p> <p>مُعَجِّل (طاقة ذرية)</p> <p>accelerator</p> <p>جهاز يكسب الجسيمات المتحركة عجلة (تسارعاً) .</p>
<p>acclivity</p> <p>الحذب</p> <p>ميل مستقيم أو ميل مستوٍ إلى أعلى عن الأفقى .</p>	<p>مُعَجِّل " فان دى جراف "</p> <p>accelerator, Van de Graaff</p> <p>جهاز يُعَجِّل الإلكترونات بتأثير مجالات كهروستاتيكية تتزايد شدتها تدريجياً .</p>
<p>accumulation factor</p> <p>معامل تراكم</p> <p>المقدار (١ + r) ، حيث r سعر الفائدة .</p>	<p>التوصل المباشر</p> <p>access, direct</p> <p>الحصول مباشرة على بيانات مسجلة وقراءتها ونقلها إلى الحاسب الإلكتروني ، دون الحاجة إلى قراءة البيانات المسجلة الأخرى . ومثال ذلك الحصول على بيانات خاصة بحالة معينة من بيانات مسجلة على أشرطة أو أقراص مغناطيسية .</p>
<p>accumulation point of a sequence</p> <p>= limit point of a sequence</p> <p>= cluster point of a sequence</p> <p>نقطة تراكم لمتتابعة</p>	

معجم الرياضيات

<p>أما إذا كانت P فئة الأعداد الصحيحة فلا يوجد لها نقطة تراكم .</p>	<p>يقال لنقطة P إنها نقطة تراكم لمجموعة $\{P\}$ إذا كان كل جوار للنقطة P يحوى عدداً لا نهائياً من حدود المجموعة . فمثلاً صفر نقطة تراكم للمجموعة $\{\frac{1}{n}\}$ ، وكذلك صفر ، ١ نقطتا تراكم للمجموعة</p>
<p>accumulative تراكمى وصف للزيادة بالتراكم (انظر : cumulative) .</p>	<p>$\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}, 1, \frac{1}{4}, 1, \dots, \frac{1}{n}, 1$</p>
<p>accumulator مُرَكِّم جزء من الوحدة الحسابية للحاسب الإلكتروني توضع فيه نتائج العمليات الحسابية والمنطقية .</p>	<p>نقطة تراكم لفئة من النقط accumulation point of a set of points = cluster point of a set of points = limit point of a set of points</p>
<p>accuracy دقة مقياس لمدى الصحة ، وينسب عادة للحسابات العددية .</p>	<p>يقال لنقطة S أنها نقطة تراكم لفئة جزئية S من فراغ توبولوجى S إذا كان كل جوار للنقطة S يحوى نقطا من S مختلفة عن S . فمثلاً إذا كانت S فئة جميع الأعداد القياسية فإن كل نقطة من نقط خط الأعداد الحقيقية تكون نقطة تراكم لها .</p>
<p>accuracy test اختبار دقة اختبار لتحديد دقة قراءة أودقة قياس .</p>	<p>وإذا كانت S فئة الأعداد : $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ فإنه يوجد لها نقطة</p>
<p>accurate balance ميزان دقيق</p>	<p>تراكم وحيدة هي نقطة الأصل .</p>

أقل من خمسة ووضع بدلاً منه عشرة إذا كان أكبر من خمسة ، وإذا كان مساوياً للخمسة فقد يوضع بدلاً منه الصفر أو العشرة حسب الموقف . فمثلاً ١,٢٦ دقيقتان لرقمين عشرين إذا حصلنا عليه إما من ١,٢٦٤ أو ١,٢٥٦ أو ١,٢٥٥ .

acnode نقطة منعزلة

= isolated point


يقال لنقطة س أنها منعزلة بالنسبة لفئة جزئية من فراغ توبولوجي س إذا وجد للنقطة س جوار لا يحوي نقطة من نقط س مختلفة عن س . فمثلاً نقطة الأصل نقطة منعزلة لفئة النقط $\{(s, s) : s^2 = s^2 + s^2 = s^2\}$

الخاصية الصوتية للقطع الناقص

acoustical property of the ellipse

خاصية تعني أن الموجات الصوتية المنبعثة من إحدى بؤرتي قطع ناقص تتجمع في البؤرة الأخرى .

(انظر : الخاصية البؤرية للقطع الناقص)
focal property of the ellipse



ميزان يتميز بدرجة عالية من الدقة .

حسابات دقيقة

accurate computation

حسابات لا تتضمن أية أخطاء حسابية .

accurate measure قياس دقيق

قياس القيمة الفعلية بدرجة عالية من الدقة .

accurate reading قراءة دقيقة

قراءة تعطي تقريباً دقيقاً للقيمة الفعلية .

accurate statement عبارة دقيقة

تقرير صائب أو حقيقي .

دقيق لنون من المراتب العشرية

accurate to n decimal places

صفة تعني أن جميع الأرقام قبل العدد العشري النوني والعدد العشري النوني نفسه تكون صحيحة وأن العدد العشري التالي للعدد العشري النوني قد وضع بدلاً منه الصفر إذا كان

acre فدان
وحدة لقياس الأراضي تختلف من بلد
لآخر . فالفدان المصرى يساوى $\frac{5}{6}$ من ٤٢٠٠
المتر المربع تقريباً . والفدان الانجليزى يساوى
٤٠٤٧ متراً مربعاً .


action فعل
إذا تلاصق جسمان فكل ما قد يحدث أحدهما
في الآخر فعل . وقوانين نيوتن للحركة تنص على
أن لكل فعل رد فعل مساوياً له في المقدار ومضاداً
له في الاتجاه .

مثلث حاد الزوايا
acute angled triangle
مثلث كل من زواياه الثلاث حادة .

acyclic region منطقة بسيطة الترابط
= simply connected region
منطقة يمكن رسم كل مسار من المسارات
التي تصل بين أى نقطتين من نقطتها فوق مسار
آخر يصل بين هاتين النقطتين براسم متصل دون
الخروج من المنطقة . فمثلاً القرص منطقة
بسيطة الترابط والمنطقة الحلقية ليست بسيطة
الترابط .


الخاصية الصوتية للقطع الزائد
acoustical property of the hyperbola
خاصية تعنى أن الموجة الصوتية المنبعثة من
إحدى بؤرتي قطع زائد تنعكس بحيث يمر
امتدادها بالبؤرة الأخرى .

(انظر : الخاصية البؤرية للقطع الزائد)
focal property of the hyperbola



الخاصية الصوتية للقطع المكافئ
acoustical property of the parabola
خاصية تعنى أن الموجة الصوتية المنبعثة من
مصدر صوتي عند البؤرة تنعكس في موجات
موازية لمحور القطع المكافئ ، وبالعكس .

(انظر : الخاصية البؤرية للقطع المكافئ)
focal property of the parabola



مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>addition, algebraic مجموع جبرى</p> <p>= algebraic sum</p> <p>ضم الحدود إما بالجمع أو الطرح على أساس أن جمع عدد سالب يكافئ طرح عدد موجب فمثلاً العبارة $s - v + e$ مجموع جبرى بمعنى أنها تكافئ $s + (-v) + e$.</p>	<p>add, to يجمع</p> <p>ضم الأعداد أو الحدود الجبرية المتشابهة بعضها إلى بعض .</p>
<p>addition, arithmetic مجموع حسابى</p> <p>نتائج جمع عددين موجبين ونتائج جمع القيم المطلقة للأعداد ذات الإشارة . فمثلاً ٥ هى المجموع الحسابى للعددين ٢ ، ٣ كما أن ٨ هى المجموع الحسابى للعددين ٥ ، -٣ .</p>	<p>addend مكون جمع</p> <p>أحد العناصر المتضمنة فى عملية الجمع .</p>
<p>addition, associative property of</p> <p>خاصية الدمج لعملية الجمع</p> <p>(انظر : خاصية الدمج)</p> <p>associative property .</p>	<p>adder جماع</p> <p>جزء من الآلة الحاسبة يقوم بإجراء عملية جمع الأعداد الموجبة ومنها ما هو نصف جماع half-adder وما هو جماع تام full-adder.</p>
<p>addition axiom for general events</p> <p>مسلمة الجمع لأحداث عامة</p> <p>إذا كانت e_1, e_2, \dots, e_n أحداثاً عامة فإن :</p>	<p>adder, algebraic جماع جبرى</p> <p>جزء فى الآلة الحاسبة يقوم بإجراء عمليتي الجمع والطرح .</p>
<p>addition الجمع (عملية الجمع)</p> <p>عملية ثنائية على فئة ، تتضمن ضم عنصر من عناصر الفئة إلى عنصر آخر .</p>	

إذا كانت سرقة معرفة عليها عملية جمع فإن المجموع $P + B$ ينتمي إلى سرقة لكل P ، B في سرقة. أى أن $P + B \in$ سرقة لكل P ، $B \in$ سرقة. فمثلاً مجموع أى عددين حقيقيين يكون دائماً عدداً حقيقياً، ومجموع أى متجهين يكون دائماً متجهياً.

خاصية الإبدال لعملية الجمع
addition, commutative property of
خاصية تعنى أن الترتيب الذى يجمع به عددان لا يؤثر على الناتج. أى أن :
 $P + B = B + P$ لكل P ، B .

صيغ الجمع لحساب المثلثات
addition formulae for trigonometry
صيغ تعبر عن الجيب، جيب التمام، الظل لمجموع زاويتين أو الفرق بينهما بدلالة الدوال المثلثية للزاويتين وأهم هذه الصيغ هى :

حـا (س ± ص) = حـا س جـتا ص ± جـتا س حـا ص ،
جـتا (س ± ص) = جـتا س جـتا ص ∓ حـا س حـا ص ،

$$\frac{\text{ظا س} \pm \text{ظا ص}}{1 \mp \text{ظا س} \text{ ظا ص}} = \text{ظا (س} \pm \text{ص)}$$

$$\begin{aligned} \text{ح (} P \cup P_1 \cup P_2 \cup \dots \cup P_r) &= \text{ح (} P) + \text{ح (} P \cap P_1) \\ &+ \text{ح (} P \cap P_2) + \dots + \text{ح (} P \cap P_r) \\ &+ \text{ح (} P \cap P_1 \cap P_2) + \dots + \text{ح (} P \cap P_1 \cap P_2 \cap P_3) \\ &+ \dots + \text{ح (} P \cap P_1 \cap P_2 \cap \dots \cap P_r) \end{aligned}$$

مسلمة الجمع لأحداث متنافية
addition axiom for mutually exclusive events

إذا كانت P_1, P_2, \dots, P_r أحداثاً متنافية، فإن احتمال حدوث واحد منها يساوى مجموع احتمالات حدوث كل هذه الأحداث، أى أن

$$\text{ح (} P \cup P_1 \cup P_2 \cup \dots \cup P_r) = \text{ح (} P) + \text{ح (} P_1) + \text{ح (} P_2) + \dots + \text{ح (} P_r)$$

حقيقة جمع أساسية
addition basic fact

جمع عددين صحيحين موجبين كل منهما أقل من عشرة، وبالتالي يوجد $\frac{10 \times 9}{2} = 45$ حقيقة جمع أساسية.

خاصية الغلق للجمع
addition, closure property of

<p>جمع العشریات</p> <p>addition of decimals</p> <p>الطريقة المألوفة لجمع العشریات هی وضع مكونات كل عدد مباشرة تحت نظيره المکانی فی الأعداد الأخرى . فمثلاً لجمع ١٢٣ ، ٥٨٦ ، ٩١٧ تكتب :</p> <table> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> </tr> <tr> <td>٥</td> <td>٨</td> <td>٦</td> </tr> <tr> <td>٩</td> <td>١</td> <td>٧</td> </tr> </table>	١	٢	٣	٥	٨	٦	٩	١	٧	<p>فی تناسب بالجمع</p> <p>addition, in proportion</p> <p>إذا كان p ، b ، c . أعداداً بحيث</p> $\frac{c}{b} = \frac{p}{b} \text{ فإن } \frac{c}{b} = \frac{p}{b}$ <p>وذلك بإضافة واحد إلى كل طرف من الطرفين ، وبالمثل يكون</p> $\frac{c}{b} = \frac{p}{b}$ <p>وذلك بإضافة واحد لمقلوب كل طرف من الطرفين .</p>			
١	٢	٣											
٥	٨	٦											
٩	١	٧											
<p>ثم تجرى عملية الجمع . ولجمع ١ ، ٢٣ ، ٥٨ ، ٦ ، ٩١٧ ، ٠ تكتب :</p> <table> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٣</td> <td>٠</td> </tr> <tr> <td>٥</td> <td>٨</td> <td>٦</td> <td>٠</td> </tr> <tr> <td>٠</td> <td>٩</td> <td>١</td> <td>٧</td> </tr> </table> <p>ثم تجرى عملية الجمع .</p>	١	٢	٣	٠	٥	٨	٦	٠	٠	٩	١	٧	<p>جمع الزوايا</p> <p>addition of angles</p> <p>= مجموع الزوايا = sum of angles</p> <p>هندسياً : مجموع زاويتين هو الزاوية التي نحصل عليها بدوران من الضلع الابتدائي لإحدى الزاويتين عبر الزاوية متبوعاً بدوران بادئاً من الضلع النهائي لهذه الزاوية عبر الزاوية الأخرى . وجبرياً : مجموع قياسى هاتين الزاويتين .</p>
١	٢	٣	٠										
٥	٨	٦	٠										
٠	٩	١	٧										
<p>جمع القطع المستقيمة الموجهة</p> <p>addition of directed line segments</p> <p>مجموع قطعتين مستقيمتين موجهتين هو القطعة المستقيمة الموجهة التي نقطتا نهايتيها النقطة الابتدائية للقطعة الأولى والنقطة النهائية للقطعة الثانية ، بعد وضع القطعتين بحيث تكون النقطة النهائية للقطعة الأولى هي النقطة</p>	<p>جمع الأعداد المركبة</p> <p>addition of complex numbers</p> <p>إذا كان $e = (s_1, v_1)$ ، $e_2 = (s_2, v_2)$ ، عددان مركبين فإن :</p> $e + e_2 = (s_1 + s_2, v_1 + v_2)$												

معجم الرياضيات

إذا كانت المتسلسلتان تقاربتين وتؤولان إلى المجموعتين P ، Q على الترتيب فإن مجموعهما يكون متسلسلة تقاربية مجموعها $P + Q$.

جمع الأعداد الصحيحة

addition of integers

(انظر : الجمع addition) .

جمع الأعداد غير الكسرية

addition of irrational numbers

(انظر : الجمع addition) .

جمع الرواسم


إذا كان f, g راسمين ،
 $f: S \rightarrow T, g: S \rightarrow T$ حيث
 $S \supseteq S_1 \supseteq S_2$ فإن
 $(f+g)(s) = f(s) + g(s)$ لكل
 $s \in S_1 \cap S_2$.

جمع المصفوفات

addition of matrices

الابتدائية للقطعة الثانية . فمثلاً في الشكل

$$\overline{PQ} = \overline{PQ} + \overline{QR}$$



جمع الكسور

addition of fractions

(انظر : الجمع addition) .

جمع الدوال

addition of functions

(انظر : جمع الرواسم
 addition of mappings) .

جمع المتسلسلات اللانهائية

addition of infinite series

إذا كانت $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ، $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$

متسلسلتين لانهايتين فإن مجموعهما هو المتسلسلة

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$$

جمع الحدود المتشابهة في الجبر
addition of similar terms in algebra

عملية جمع معاملات الحدود المتشابهة من حيث معاملاتها الأخرى . فمثلاً

$$\begin{aligned} 2س + 3س &= 5س , \\ 3س^2ص - 2س^2ص &= س^2ص , \\ 4س + 2س &= 6س . \end{aligned}$$

جمع الممتدات
addition of tensors

إذا كان P ، B ممتدين من نوع (m, n) مركباتهما

$$\begin{matrix} P & B \\ \begin{matrix} 1^m \dots 1^m \\ \vdots \\ 1^n \dots 1^n \end{matrix} & \begin{matrix} 1^m \dots 1^m \\ \vdots \\ 1^n \dots 1^n \end{matrix} \end{matrix}$$

فإن مجموعتهما $P+B$ هو الممتد الذي مركباته

$$\begin{matrix} P+B \\ \begin{matrix} 1^m \dots 1^m \\ \vdots \\ 1^n \dots 1^n \end{matrix} \end{matrix}$$

جمع المتجهات
addition of vectors

إذا كان $P = (1, 2)$ ، $B = (3, 4)$ متجهين فإن

$$P+B = (1+3, 2+4) = (4, 6) .$$

إذا كان $P = [1, 2]$ ، $B = [3, 4]$ مصفوفتين من نفس الرتبة فإن :

$$P+B = [1+3, 2+4] = [4, 6] \text{ فمثلاً إذا كان :}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 8 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\text{فإن } P+B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

جمع الأزواج المرتبة
addition of ordered pairs

إذا كان $(1, 2)$ ، $(3, 4)$ زوجين مرتبين فإن مجموعهما :

$$(1, 2) + (3, 4) = (1+3, 2+4) = (4, 6) \text{ هو الزوج المرتب :}$$

$$(1, 2) + (3, 4) = (1+3, 2+4) = (4, 6) .$$

جمع الأعداد الحقيقية
addition of real numbers

(انظر : الجمع addition) .

معجم الرياضيات

<p>يقال لدالة D أنها جمعية إذا كان</p> $D(s + v) = D(s) + D(v) \text{ لكل } s, v,$ <p>دالة تحت جمعية</p> <p>additive function, sub</p>	<p>خاصية الجمع للأعداد المتساوية وغير المتساوية</p> <p>addition property of equal and unequal numbers</p> <p>إذا كان p, b عددين ، كان $p \leq b$ وأضيف نفس العدد c لكل منهما فإن</p> $p + c \leq b + c .$
<p>يقال لدالة D أنها تحت جمعية إذا كان</p> $D(s + v) \geq D(s) + D(v) \text{ لكل } s, v,$ <p>دالة فوق جمعية</p> <p>additive function, super</p>	<p>خاصية الجمع لعلاقة التساوي</p> <p>addition property of equality</p> <p>إذا جمعت أعداد متساوية على أعداد متساوية فإن الناتج يكون متساوياً ، أى إذا كان $p = b$ فإن :</p> $p + c = b + c$
<p>يقال لدالة D أنها فوق جمعية إذا كان</p> $D(s + v) \leq D(s) + D(v) \text{ لكل } s, v,$ <p>دالة تحت جمعية</p> <p>additive identity</p>	<p>خاصية الجمع للأعداد غير المتساوية</p> <p>addition property of unequal numbers</p> <p>إذا جمع عددين غير متساويين لهما ترتيب معين على عددين غير متساويين بنفس الترتيب ، فإن المجموعين يكونان غير متساويين بنفس هذا الترتيب . أى أنه إذا كان $p < b$ ، $c < s$ فإن</p> $p + c < b + s .$
<p>المحايد الجمعى</p> <p>العنصر في الفئة التي تُعرّف عملية الجمع عليها ، والذي إذا جمع إلى أى عنصر آخر فيها س ، أوجع إليه هذا العنصر كان الناتج هو س . فمثلاً ، المحايد الجمعى في فئة الأعداد الحقيقية هو الصفر ، لأن :</p>	<p>دالة جمعية</p> <p>additive function</p>


مجمع اللغة العربية - القاهرة

address register	وحدة تخزين مسجل العناوين في الحاسب الإلكتروني .	س + صفر = صفر + س = س . والمحايد الجمعي في فئة الأعداد المركبة هو العدد المركب (صفر ، صفر) .
adiabatic	أدياباتى صفة تعنى عدم فقد للحرارة أو اكتساب لها في نظام فيزيقي .	المعكوس الجمعي additive inverse المعكوس الجمعي لعنصر س هو العنصر الذي إذا جمع إلى س أو جمع إليه س كان الناتج هو المحايد الجمعي ، ويرمز إليه بالرمز (-س) ، أى أن س + (-س) = (-س) + س = صفرأ . فمثلاً كل من العددين ٣ ، -٣ معكوس جمعي للآخر .
adiabatic curves	منحنيات أدياباتية منحنيات توضح العلاقة بين ضغط وحجم مواد يفترض أن لها ترددات وانكماشات أدياباتية .	دالة فئوية جمعية additive set function دالة ن تعين لكل فئة س من عائلة س من الثقات عدداً ن (س) بحيث ن (س ل ص) = ن (س) + ن (ص) ، وذلك لكل عنصرين س ، ص \exists س بحيث س \cap ص = \varnothing ، س ل ص \exists س .
adiabatic expansion (contraction) (thermodynamics)	تغير في الحجم دون فقد أو اكتساب حرارة .	عنوان address ما يستدل به في الحاسب الإلكتروني على بيان ما أو مصدره أو مقصده .
ad infinitum	إلى اللانهاية مصطلح يستعمل في المتسلسلات والمتتابعات	

قطعتان مستقیمتان متجاورتان

adjacent segments

قطعتان مستقيمتان من خط منكسر تشتركان
في نقطة نهاية واحدة فقط . فمثلاً في الشكل
P ، \overline{AB} ، \overline{BC} قطعتان متجاورتان ، كما أن
 \overline{AB} ، \overline{CD} قطعتان متجاورتان كذلك .



المجاور (لزوية حادة في مثلث قائم الزاوية)

adjacent (side of an angle in a right angled triangle)

في المثلث Δ ب ح القائمة الزاوية في ب يسمى
الضلع ب ح المجاور للزاوية ح كما يسمى
الضلع Δ ب المقابل (opposite) لها .




معادلة تفاضلية مرافقة

adjoint differential equation

اللانهاية ، ويعنى التكملة إلى اللانهاية ويرمز له
بثلاث نقط مثل ∞ ، p_1 ، p_2 ، p_3 ، ... ، p_n .


adjacent angles زاویگان متجاورتان

زاويتان تشتركان في الرأس وفي ضلع
وضلعاهما الباقيان في جهتين مختلفتين من الضلع
المشترك . ففي الشكل ٢ و ب ،
ب و ح زاويتان متجاورتان .



adjacent polygons مضلعان متجاوران

مضلعان یشرکان فی جزء من ضلع علی الأقل
ولکن لا یشرکان فی ای نقطہ داخلیہ فمثلاً
۲ ب ح ۲ س ، آ ب ح ۲ ک ب آ مضلعان
متجاوران .



مصفوفة مرافقة
adjoint matrix

المصفوفة المرافقة للمصفوفة المربعة $P = (P_{ij})$ هي المصفوفة التي نحصل عليها بإحلال العنصر P_{ji} (العنصر في الصف الرائي والعمود الميمي) بمرافق العنصر P_{ij} (العنصر في الصف الميمي والعمود الرائي).

مرافقة معادلة تفاضلية متجانسة
adjoint of a homogeneous differential
equation

مرافقة المعادلة التفاضلية المتجانسة

$$L(v) \equiv (v) = d, \quad d = \frac{v^n}{\gamma^n} + d + \frac{\gamma^{1-n} v}{\gamma^{1-n}}$$

$$0 = \frac{\gamma v}{\gamma^n} + \dots + d^{1-n} v$$

هي المعادلة التفاضلية

$$L(v) \equiv (v) = (1-n) \gamma^n + \frac{\gamma^n (d, v)}{\gamma^n} + (1-n) \gamma^n$$

$$\gamma^{1-n} \frac{(d, v)}{\gamma^n} - \dots + \frac{\gamma^{1-n} (d, v)}{\gamma^{1-n}}$$

admiralty mile ميل بحرى
وحدة لقياس المسافات فى البحر ويساوى
١٨٥٢ متراً تقريباً .

إذا ضربت حدود معادلة تفاضلية ل في دالة بحيث تكون المعادلة التفاضلية الناتجة تامة ، فإن هذه الدالة تحقق معادلة تفاضلية أخرى \bar{L} تسمى المعادلة التفاضلية المرافقة للمعادلة التفاضلية الأصلية .

معادلة تفاضلية ذاتية الترافق

adjoint differential equation, self
معادلة تفاضلية تطابق مرافقتها ، أى أن
 L (ص) تكون ذاتية الترافق إذا كان L (ص) =
 \bar{L} (ص) .

مثال ذلك معادلات "شتورم - ليوفيل"
Sturm-Liouville differential equations التفاضلية
ومعادلات "ليجنדר" Legendre التفاضلية .

تحويل خطی مرافق

adjoint linear transformation
= **dual linear transformation**

إذا كان r تحويلاً خطياً فوق فراغ اتجاهي S ، فإن التحويل الخطي r^* فوق الفراغ الاتجاهي S^* المرافق للفراغ S والذي يحقق $ص (r (س)) = (r^* (ص)) (س)$ لكل $س \in S$ ، $ص \in S^*$ يسمى التحويل الخطي المرافق للتحويل الخطي r .

معجم الرياضيات

<p>يرسم التحويل الخطى الخطوط المتوازية إلى خطوط متوازية .</p>	<p>aerodynamics الديناميكا الهوائية</p> <p>فرع من فروع علم الديناميكا يبحث في حركة الهواء والغازات الأخرى وتأثيراتها الميكانيكية في الأجسام ، وهو يدخل في نطاق ديناميكا الموائع hydrodynamics .</p>
<p>affine geometry الهندسة المتآلفة</p> <p>دراسة لا متغيرات الزمرة المتآلفة التامة .</p>	<p>aerostatics الإستاتيكا الهوائية</p> <p>فرع من فروع علم الإستاتيكا يبحث في اتزان الهواء والغازات الأخرى وهو يدخل في نطاق إستاتيكا الموائع hydrostatics .</p>
<p>affine group, full الزمرة المتآلفة التامة</p> <p>زمرة فئتها فئة كل الاثلاثيات في المستوى وعمليتها عملية تحصيل الرواسم .</p>	<p>aether الأثير</p> <p>وسط افتراضى يملأ الفراغ ويتخلل الأجسام .</p>
<p>affine transformation تحويل متآلف</p> <p>تحويل من فراغ فوق نفسه بحيث تكون إحداثيات صورة أى نقطة في الفراغ ارتباطاً خطياً من إحداثيات النقطة . أى أنه إذا كانت $(س_1, س_2, \dots, س_n)$ صورة نقطة $(س_1, س_2, \dots, س_n)$ فإن $س_1 = ح_1 + ح_2 س_2 + \dots + ح_n س_n$ ، وفى المستوى الديكارتى إذا كانت $(س, ص)$ صورة $(س, ص)$ بتحويل متآلف فإن</p> $س_1 = ح_1 + ح_2 س + ح_3 ص$ $ص_1 = ح_4 + ح_5 س + ح_6 ص$	<p>affine collineation تحويل خطى</p> <p>= linear transformation</p> <p>تحويل يحفظ استقامة النقط ، أى يرسم كل فئة من النقط التى تقع على خط مستقيم فوق فئة من النقط الواقعة على خط مستقيم . وبالتالي</p>

تحويل متآلف يرسم كل زاوية فوق زاوية لها نفس المقياس . وفي المستوى الديكارتي يكون على الصورة $\bar{s} = s_1 + s_2 + s_3 + \dots + s_n$ ، $\bar{v} = v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_n$ حيث $\bar{v}_1 = v_1$ ، $\bar{v}_2 = v_2$ ، $\bar{v}_3 = v_3$ ، $\bar{v}_4 = v_4$ ، $\bar{v}_5 = v_5$ ، $\bar{v}_6 = v_6$ ، $\bar{v}_7 = v_7$ ، $\bar{v}_8 = v_8$ ، $\bar{v}_9 = v_9$ ، $\bar{v}_{10} = v_{10}$ ، $\bar{v}_{11} = v_{11}$ ، $\bar{v}_{12} = v_{12}$ ، $\bar{v}_{13} = v_{13}$ ، $\bar{v}_{14} = v_{14}$ ، $\bar{v}_{15} = v_{15}$ ، $\bar{v}_{16} = v_{16}$ ، $\bar{v}_{17} = v_{17}$ ، $\bar{v}_{18} = v_{18}$ ، $\bar{v}_{19} = v_{19}$ ، $\bar{v}_{20} = v_{20}$ ، $\bar{v}_{21} = v_{21}$ ، $\bar{v}_{22} = v_{22}$ ، $\bar{v}_{23} = v_{23}$ ، $\bar{v}_{24} = v_{24}$ ، $\bar{v}_{25} = v_{25}$ ، $\bar{v}_{26} = v_{26}$ ، $\bar{v}_{27} = v_{27}$ ، $\bar{v}_{28} = v_{28}$ ، $\bar{v}_{29} = v_{29}$ ، $\bar{v}_{30} = v_{30}$ ، $\bar{v}_{31} = v_{31}$ ، $\bar{v}_{32} = v_{32}$ ، $\bar{v}_{33} = v_{33}$ ، $\bar{v}_{34} = v_{34}$ ، $\bar{v}_{35} = v_{35}$ ، $\bar{v}_{36} = v_{36}$ ، $\bar{v}_{37} = v_{37}$ ، $\bar{v}_{38} = v_{38}$ ، $\bar{v}_{39} = v_{39}$ ، $\bar{v}_{40} = v_{40}$ ، $\bar{v}_{41} = v_{41}$ ، $\bar{v}_{42} = v_{42}$ ، $\bar{v}_{43} = v_{43}$ ، $\bar{v}_{44} = v_{44}$ ، $\bar{v}_{45} = v_{45}$ ، $\bar{v}_{46} = v_{46}$ ، $\bar{v}_{47} = v_{47}$ ، $\bar{v}_{48} = v_{48}$ ، $\bar{v}_{49} = v_{49}$ ، $\bar{v}_{50} = v_{50}$ ، $\bar{v}_{51} = v_{51}$ ، $\bar{v}_{52} = v_{52}$ ، $\bar{v}_{53} = v_{53}$ ، $\bar{v}_{54} = v_{54}$ ، $\bar{v}_{55} = v_{55}$ ، $\bar{v}_{56} = v_{56}$ ، $\bar{v}_{57} = v_{57}$ ، $\bar{v}_{58} = v_{58}$ ، $\bar{v}_{59} = v_{59}$ ، $\bar{v}_{60} = v_{60}$ ، $\bar{v}_{61} = v_{61}$ ، $\bar{v}_{62} = v_{62}$ ، $\bar{v}_{63} = v_{63}$ ، $\bar{v}_{64} = v_{64}$ ، $\bar{v}_{65} = v_{65}$ ، $\bar{v}_{66} = v_{66}$ ، $\bar{v}_{67} = v_{67}$ ، $\bar{v}_{68} = v_{68}$ ، $\bar{v}_{69} = v_{69}$ ، $\bar{v}_{70} = v_{70}$ ، $\bar{v}_{71} = v_{71}$ ، $\bar{v}_{72} = v_{72}$ ، $\bar{v}_{73} = v_{73}$ ، $\bar{v}_{74} = v_{74}$ ، $\bar{v}_{75} = v_{75}$ ، $\bar{v}_{76} = v_{76}$ ، $\bar{v}_{77} = v_{77}$ ، $\bar{v}_{78} = v_{78}$ ، $\bar{v}_{79} = v_{79}$ ، $\bar{v}_{80} = v_{80}$ ، $\bar{v}_{81} = v_{81}$ ، $\bar{v}_{82} = v_{82}$ ، $\bar{v}_{83} = v_{83}$ ، $\bar{v}_{84} = v_{84}$ ، $\bar{v}_{85} = v_{85}$ ، $\bar{v}_{86} = v_{86}$ ، $\bar{v}_{87} = v_{87}$ ، $\bar{v}_{88} = v_{88}$ ، $\bar{v}_{89} = v_{89}$ ، $\bar{v}_{90} = v_{90}$ ، $\bar{v}_{91} = v_{91}$ ، $\bar{v}_{92} = v_{92}$ ، $\bar{v}_{93} = v_{93}$ ، $\bar{v}_{94} = v_{94}$ ، $\bar{v}_{95} = v_{95}$ ، $\bar{v}_{96} = v_{96}$ ، $\bar{v}_{97} = v_{97}$ ، $\bar{v}_{98} = v_{98}$ ، $\bar{v}_{99} = v_{99}$ ، $\bar{v}_{100} = v_{100}$ ، $\bar{v}_{101} = v_{101}$ ، $\bar{v}_{102} = v_{102}$ ، $\bar{v}_{103} = v_{103}$ ، $\bar{v}_{104} = v_{104}$ ، $\bar{v}_{105} = v_{105}$ ، $\bar{v}_{106} = v_{106}$ ، $\bar{v}_{107} = v_{107}$ ، $\bar{v}_{108} = v_{108}$ ، $\bar{v}_{109} = v_{109}$ ، $\bar{v}_{110} = v_{110}$ ، $\bar{v}_{111} = v_{111}$ ، $\bar{v}_{112} = v_{112}$ ، $\bar{v}_{113} = v_{113}$ ، $\bar{v}_{114} = v_{114}$ ، $\bar{v}_{115} = v_{115}$ ، $\bar{v}_{116} = v_{116}$ ، $\bar{v}_{117} = v_{117}$ ، $\bar{v}_{118} = v_{118}$ ، $\bar{v}_{119} = v_{119}$ ، $\bar{v}_{120} = v_{120}$ ، $\bar{v}_{121} = v_{121}$ ، $\bar{v}_{122} = v_{122}$ ، $\bar{v}_{123} = v_{123}$ ، $\bar{v}_{124} = v_{124}$ ، $\bar{v}_{125} = v_{125}$ ، $\bar{v}_{126} = v_{126}$ ، $\bar{v}_{127} = v_{127}$ ، $\bar{v}_{128} = v_{128}$ ، $\bar{v}_{129} = v_{129}$ ، $\bar{v}_{130} = v_{130}$ ، $\bar{v}_{131} = v_{131}$ ، $\bar{v}_{132} = v_{132}$ ، $\bar{v}_{133} = v_{133}$ ، $\bar{v}_{134} = v_{134}$ ، $\bar{v}_{135} = v_{135}$ ، $\bar{v}_{136} = v_{136}$ ، $\bar{v}_{137} = v_{137}$ ، $\bar{v}_{138} = v_{138}$ ، $\bar{v}_{139} = v_{139}$ ، $\bar{v}_{140} = v_{140}$ ، $\bar{v}_{141} = v_{141}$ ، $\bar{v}_{142} = v_{142}$ ، $\bar{v}_{143} = v_{143}$ ، $\bar{v}_{144} = v_{144}$ ، $\bar{v}_{145} = v_{145}$ ، $\bar{v}_{146} = v_{146}$ ، $\bar{v}_{147} = v_{147}$ ، $\bar{v}_{148} = v_{148}$ ، $\bar{v}_{149} = v_{149}$ ، $\bar{v}_{150} = v_{150}$ ، $\bar{v}_{151} = v_{151}$ ، $\bar{v}_{152} = v_{152}$ ، $\bar{v}_{153} = v_{153}$ ، $\bar{v}_{154} = v_{154}$ ، $\bar{v}_{155} = v_{155}$ ، $\bar{v}_{156} = v_{156}$ ، $\bar{v}_{157} = v_{157}$ ، $\bar{v}_{158} = v_{158}$ ، $\bar{v}_{159} = v_{159}$ ، $\bar{v}_{160} = v_{160}$ ، $\bar{v}_{161} = v_{161}$ ، $\bar{v}_{162} = v_{162}$ ، $\bar{v}_{163} = v_{163}$ ، $\bar{v}_{164} = v_{164}$ ، $\bar{v}_{165} = v_{165}$ ، $\bar{v}_{166} = v_{166}$ ، $\bar{v}_{167} = v_{167}$ ، $\bar{v}_{168} = v_{168}$ ، $\bar{v}_{169} = v_{169}$ ، $\bar{v}_{170} = v_{170}$ ، $\bar{v}_{171} = v_{171}$ ، $\bar{v}_{172} = v_{172}$ ، $\bar{v}_{173} = v_{173}$ ، $\bar{v}_{174} = v_{174}$ ، $\bar{v}_{175} = v_{175}$ ، $\bar{v}_{176} = v_{176}$ ، $\bar{v}_{177} = v_{177}$ ، $\bar{v}_{178} = v_{178}$ ، $\bar{v}_{179} = v_{179}$ ، $\bar{v}_{180} = v_{180}$ ، $\bar{v}_{181} = v_{181}$ ، $\bar{v}_{182} = v_{182}$ ، $\bar{v}_{183} = v_{183}$ ، $\bar{v}_{184} = v_{184}$ ، $\bar{v}_{185} = v_{185}$ ، $\bar{v}_{186} = v_{186}$ ، $\bar{v}_{187} = v_{187}$ ، $\bar{v}_{188} = v_{188}$ ، $\bar{v}_{189} = v_{189}$ ، $\bar{v}_{190} = v_{190}$ ، $\bar{v}_{191} = v_{191}$ ، $\bar{v}_{192} = v_{192}$ ، $\bar{v}_{193} = v_{193}$ ، $\bar{v}_{194} = v_{194}$ ، $\bar{v}_{195} = v_{195}$ ، $\bar{v}_{196} = v_{196}$ ، $\bar{v}_{197} = v_{197}$ ، $\bar{v}_{198} = v_{198}$ ، $\bar{v}_{199} = v_{199}$ ، $\bar{v}_{200} = v_{200}$ ، $\bar{v}_{201} = v_{201}$ ، $\bar{v}_{202} = v_{$

تحويل متآلف غير شاذ
affine transformation, non-singular
تحويل متآلف بحيث $\Delta = |\mathbf{A}| \neq 0$ صفراً .

تحويل متآلف شاذ
affine transformation, singular
تحويل متآلف بحيث $\Delta = |A| = 0$ صفراً .

affinity
 = تحويل متآلف عام
 = general affine transformation
 حاصل ضرب عدد محدود من الرواسم التي
 كل منها ائتلاف منظوري .
 (انظر : ائتلاف منظوري)
 perspective affinity

ومن أمثلة التحويلات المتألّفة في المستوى
الديكارتى الانتقال (translation) والتصغير
والتكبير (stretching and shrinking) والدوران
(rotation) والانعكاس (reflection) .

تحويل متآلف متجانس
affine transformation, homogeneous

تحويل متآلف غير شاذ تنعدم فيه الحدود المطلقة حصر
فمثلاً في المستوى الديكارتي يكون على
الصورة :


س = س + ب ص ،
ص = ص + ب س ،

$$\text{حيث} \quad \begin{vmatrix} 1^p & 1^u \\ 2^p & 2^u \end{vmatrix} = \Delta \neq \text{صفرًا}$$


ومن أمثله في المستوى الديكارتي الدوران
والانعكاس

تحويل متآلف حافظ لقياس الزوايا
affine transformation, isogonal

فإن الائتلاف المنظوري يسمى الانعكاس بالنسبة للخط ل .



$$*P\bar{P} = *P\bar{P}$$



$$*P\bar{P} = *P\bar{P}, \quad 1 = K, \quad 90^\circ = H$$

العمر عند الإصدار (في التأمين على الحياة)

age at issue (life insurance)

عمر المؤمن عند تاريخ ميلاده التالي لتاريخ إصدار وثيقة التأمين .

ائتلاف عمودي affinity, normal

ائتلاف منظوري فيه $H = 90^\circ$

(انظر : ائتلاف منظوري perspective affinity)

ائتلاف منظوري affinity, perspective

إذا كان ل خطاً مستقيماً في المستوى π ، وكان ك عدداً حقيقياً غير الصفر ، وكانت ه الزاوية التي يصنعها اتجاه معين مع ل ، فإن الراسم π الذي يرسم النقطة π في المستوى π إلى النقطة $\bar{\pi}$ بحيث :

(١) يكون الخط المستقيم الواصل بين π ، $\bar{\pi}$ موازياً للاتجاه المعطى ،

(٢) يحقق المتجهان $*P\bar{P}$ ، $*P\bar{P}$ العلاقة $*P\bar{P} = *P\bar{P} \cdot K$ ، حيث π نقطة تقاطع $\bar{\pi}$ مع ل ، يسمى ائتلافاً منظورياً ويسمى الخط ل محور الائتلاف axis of affinity والاتجاه المعطى اتجاه الائتلاف direction of affinity

والعدد ك معامل قياس الائتلاف scale factor of the affinity

وفي الحالة الخاصة التي فيها $H = 90^\circ$ ، $K = 1$

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>فمثلاً : ٣ (٢ - ١ + ٤) تعنى ٣ × ٥ ، ٣ (٢ - ١ - ٤) تعنى ٣ - ٣ .</p> <p>بردية أحسن</p>	<p>توزيع الأعمار في مجتمع age distribution in a population المجموعات التي ينقسم إليها المجتمع وفقاً لفترات معينة من الأعمار .</p>
<p>Ahmes (Rhynd or Rhind) papyrus مخطوط مصري رياضى قديم كتب حوالى سنة ١٥٥٠ ق.م ، ويتضمن ٨٤ مسألة في الحساب والجبر والهندسة .</p>	<p>السنة العمرية age year (في التأمين على الحياة) (life insurance) سنة في حياة مجموعة من الناس ذوى عمر معين . فمثلاً السنة العمرية ع س ترمز إلى السنة من س إلى س + ١ ، أى السنة التي يكون عمر المجموعة خلالها س .</p>
<p>مقاومة الهواء air resistance القوة التي يقاوم بها الهواء حركة جسم وتكون في عكس اتجاه هذه الحركة .</p>	<p>تجمع aggregate لفيف من الأشياء .</p>
<p>ألف - صفر aleph-zero العدد الكاردينالى للفتات اللانهائية القابلة للعد . (انظر : العدد الكاردينالى cardinal number) .</p>	<p>علامات التجمع aggregation, signs of علامات تعامل الحدود التي تضمها معاملة الحد الواحد وهى في علم الجبر القوسان الهلاليان () parentheses ، والقوسان المعقوفان [] square brackets ، والقوسان المزدوجان { } braces ، والقضيبيب — vinculum or bar .</p>
<p>الجبر algebra الجبر تعميم للحساب . فمثلاً الحقيقة الحسابية ٢ + ٢ + ٢ = ٢ × ٣ ليست إلا حالة</p>	

معجم الرياضيات

إذا كونت المجموعة S حلقة لها الخاصتان :

(١) $S \times S = S$ لكل $s \in S$ ،

(٢) لكل $s \in S$ \exists s^{-1} يوجد عنصر $m \in S$ بحيث $s \times m = m$ ، سميت المجموعة جبراً بولياً .

جبر إبدالى **algebra, commutative**

يقال لجبر فوق حقل أنه إبدالى إذا كانت الحلقة إبدالية

(انظر : جبر فوق حقل)
algebra over a field

النظرية الأساسية في الجبر

algebra, fundamental theorem of

كل معادلة على الصورة

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 = 0$$

صفر ، حيث a_0, a_1, \dots, a_{n-1} أعداد مركبة ، $n \geq 1$ ، صفر ، لها n

من الجذور في حقل الأعداد المركبة وذلك مع

اعتبار الجذر المتكرر m من المرات m من الجذور .

جبر دوال مركبة

algebra of complex functions

خاصة من التعميم الجبرى $S + S + S = S$ حيث S أى عدد .

جبر من نوع σ **algebra, σ**

جبر فئات جزئية يحوى الفصل فيه اتحاد أى متتابعة من عناصره .

جبر "بناخ" **algebra, Banach**

جبر فوق حقل الأعداد الحقيقية (أو المركبة) معرف عليه بنية فراغ "بناخ" حقيقى (أو مركب) بحيث $\|s\| \geq 0$ لكل s ، $\|s\| = 0$ فقط إذا كان $s = 0$ ، $\|s + t\| \leq \|s\| + \|t\|$ ، $\|\alpha s\| = |\alpha| \|s\|$ لكل α حقيقى (أو مركب) ، $\|s\|$ أكبر قيمة للدالة $D(s)$ لقيم s بحيث $\|s\| \leq 1$.

يقال لجبر "بناخ" أنه حقيقى أو مركب تبعاً لما إذا كان الحقل هو حقل الأعداد الحقيقية أو المركبة . فمثلاً ، فئة جميع الدوال المتصلة على الفترة المغلقة [صفر ، ١] يكون جبر "بناخ" فوق حقل الأعداد الحقيقية إذا كان $\|D\|$ أكبر قيمة للدالة $D(s)$ لقيم s بحيث $\|s\| \leq 1$.

جبر بولياني **algebra, Boolean**

جبر مؤسس على مفاهيم وضعها العالم الرياضى البريطانى "جورج بول" (١٨١٥ - ١٨٦٤) ويستخدم غالباً في دراسة العلاقات المنطقية .

<p>جبر فوق حقل</p> <p>algebra over a field</p> <p>يقال لفئة S أنها جبر فوق حقل F إذا كانت S حلقة وكان ضرب عناصر S بعناصر من F تحقق :</p> $(a + b)s = as + bs$ $(s + t)a = sa + ta$ $(sa)b = s(ab)$ $(as)b = a(sb)$ <p>لكل $a, b \in S$ ، ولكل $s \in F$ ، $sa = as$.</p>	<p>يقال لعائلة \mathcal{A} من الدوال المركبة المعرفة على فئة S أنها جبر إذا كانت تحقق :</p> $(1) f + g \in \mathcal{A}$ $(2) hf \in \mathcal{A}$ $(3) f^2 \in \mathcal{A}$ <p>لكل $f, g \in \mathcal{A}$ ، ولكل ثابت مركب h.</p>
<p>جبر ذاتي الترافق</p> <p>algebra, self-adjoint</p> <p>يقال لجبر دوال مركبة \mathcal{A} أنه ذاتي الترافق إذا كان لكل $f \in \mathcal{A}$ يكون $\bar{f} \in \mathcal{A}$ ، حيث \bar{f} المرافق المركب للدالة f ويعرف كالتالي :</p> $\overline{(fs)} = \bar{s} \bar{f}$	<p>جبر الدوال الحقيقية</p> <p>algebra of real functions</p> <p>يقال لعائلة \mathcal{A} من الدوال الحقيقية المعرفة على فئة S أنها جبر إذا كانت تحقق :</p> $(1) f + g \in \mathcal{A}$ $(2) hf \in \mathcal{A}$ $(3) f^2 \in \mathcal{A}$ <p>لكل $f, g \in \mathcal{A}$ ، ولكل ثابت حقيقي h.</p>
<p>جبر مغلق بانتظام</p> <p>algebra, uniformly closed</p> <p>إذا كان \mathcal{A} جبراً (دوال حقيقية أو مركبة) على فئة S بحيث أن $f \in \mathcal{A}$ عندما $f \in \mathcal{A}$ ، $n=1, 2, 3, \dots$ ، وكانت $f \in \mathcal{A}$ بانتظام على S فإن \mathcal{A} يقال له جبر مغلق بانتظام.</p>	<p>جبر فئات جزئية</p> <p>algebra of sub-sets</p> <p>فصل من الفئات الجزئية لفئة يحوى مكمل كل عنصر من عناصره وكذلك فئة اتحاد (أو تقاطع) أى عنصرين من عناصر الفصل . وهو جبر بولياني بالنسبة لعمليتى الاتحاد والتقاطع .</p>

صيغة جبرية algebraic expression

صيغة تتضمن أو تستخدم رموزاً وعمليات جبرية ، مثال ذلك : $2س + 3$ ، $س^2 + 4$ ، $\sqrt{2س - 3}$.

دالة جبرية صريحة

algebraic function, explicit

دالة متغير مستقل س يمكن توليدها من س بعدد محدود من العمليات الجبرية . مثل :

$$\frac{\sqrt{3س - 1} + \sqrt{س + 1}}{\sqrt{3س - 1} + \sqrt{س + 1}}$$

$$\sqrt{س} + \sqrt{س} + \sqrt{س}$$

ومن أمثلتها كذلك كثيرات الحدود .

دالة جبرية منطقية (قياسية) كسرية

algebraic function, fractional rational

خارج قسمة كثيرة حدود على كثيرة حدود

أخرى ، أي $\frac{س^2 + س + 1}{س^3 + س^2 + س + 1}$ ،

ص = $\frac{س^2 + س + 1}{س^3 + س^2 + س + 1}$ ،

حيث م ، ن عددان صحيحان موجبان ،

مثل $\frac{س^2(س - 2)}{(س + 1)^2(س - 1)}$

جبر ذو عنصر وحدة

algebra with unit element

يقال لجبر فوق حقل أنه ذو عنصر وحدة إذا كانت الحلقة ذات عنصر وحدة

(انظر : جبر فوق حقل)
algebra over a field

algebraic

جبرى

ما ينسب إلى علم الجبر .

انحراف جبرى (فى الإحصاء)

algebraic deviation

انحراف عن المتوسط ، ويكون موجباً أو سالباً إذا كانت القيمة أكبر أو أصغر من المتوسط .

algebraic equation

معادلة جبرية

معادلة تتضمن أو تستخدم رموزاً وعمليات

جبرية ، مثال ذلك :

$$2س + 3 = 0 \text{ صفراً ،}$$

$$س^2 + 2س + 4 = 0 \text{ صفراً ،}$$

$$\sqrt{2س - 3} = 3 .$$

دالة جبرية ضمنية

algebraic function, implicit

إذا لم تكن الدالة الجبرية صريحة فإنه يقال أنها ضمنية . مثل

$$ص^5 - ص - س = \text{صفرًا} ،$$

$$\frac{(ص+1)^6}{(ص-1)^6} = \frac{(س+1)^3}{(س-1)^3}$$

والدالة الأولى لا يمكن التعبير عنها كدالة صريحة ، أما الدالة الثانية فيمكن التعبير عنها على صورة دالة صريحة :

$$ص = \frac{\sqrt[3]{س+1} - \sqrt[3]{س-1}}{\sqrt[3]{س+1} + \sqrt[3]{س-1}}$$

(انظر : دالة جبرية صريحة)
explicit algebraic function

دالة جبرية غير قياسية

algebraic function, irrational

دالة جبرية فيها القوى المرفوع إليها المتغير ليست أعداداً صحيحة موجبة . مثل :

$$ص = \sqrt[3]{س} + \sqrt[3]{س}$$

دالة جبرية من درجة n

algebraic function of degree n

يقال أن $ص$ دالة جبرية من درجة n في المتغير $س$ إذا كانت جذراً لمعادلة من درجة n في $ص$ معاملاتها دوال مُنطقة rational functions في $س$ ، أى إذا كانت $ص$ جذراً للمعادلة $ص^n + د_1(س)ص^{n-1} + \dots + د_n(س) = \text{صفرًا}$ ، حيث $د_1(س) ، \dots ، د_n(س)$ دوال مُنطقة في $س$.

(انظر : دالة جبرية مُنطقة (قياسية)
rational algebraic function

دالة جبرية مُنطقة (قياسية)

algebraic function, rational

الدالة التى تكون فيها القوى المرفوع إليها المتغير المستقل أعداداً صحيحة موجبة . ومن أمثلتها كثيرات الحدود ، والدوال الجبرية المنطقة الكسرية .

(انظر : دالة جبرية مُنطقة (قياسية) كسرية)
algebraic function, fractional rational

عدد جبرى صحيح

algebraic integer

عدد جبرى يحقق معادلة على الصورة :

$$ص^p + س_1ص^{p-1} + \dots + س_p = \text{صفرًا} ،$$

حيث $پ$ ، يساوى الوحدة ، والمعاملات $س_1 ، \dots ، س_p$ جميعها أعداد صحيحة .

معجم الرياضيات

المعادلة التي يكون العدد الجبري جذراً لها ولا يكون جذراً لمعادلة أخرى أقل منها في الدرجة .

العمليات الجبرية

algebraic operations

عمليات محدودة تجري على الأعداد مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة واستخراج الجذور والرفع إلى القوى ، على ألا تُستخدم العمليات عدداً لانهائياً من المرات .

منحنى جبري مستوي

algebraic plane curve

منحنى مستوي معادلته بدلالة الإحداثيات الديكارتية على الصورة $D(x, y) = 0$ حيث $D(x, y)$ كثيرة حدود في x, y .

إذا كانت $D(x, y)$ كثيرة حدود من الدرجة n النونية فيقال أن المنحنى جبري مستوى من الدرجة

النونية **algebraic plane curve of degree n**

وإذا كانت $n=1$ كان المنحنى خطاً مستقيماً .

وإذا كانت $n=2$ كان المنحنى تربيعياً quadratic ويسمى في هذه الحالة قطعاً مخروطياً .

. conic section

عدد جبري

algebraic number

أي عدد يصلح أن يكون جذراً لمعادلة كثيرة حدود معاملاتها أعداد صحيحة . فمثلاً الأعداد

$$\sqrt{2}, \frac{3}{2}, 2+3i$$

أعداد جذرية لأنها جذور للمعادلات

$$x^2 - 2 = 0, x^2 - 3 = 0$$

س $x^2 - 6 = 0$ س $x^3 + 1 = 0$ على الترتيب . كما أن ط ، هـ ليسا عددين جبريين .

(انظر : الأعداد المتسامية
transcendental numbers) .

درجة العدد الجبري

algebraic number, degree of an

إذا كانت $D(x)$ صفراً المعادلة الصغرى لعدد جبري ، فإن درجة هذا العدد هي درجة كثيرة الحدود $D(x)$.

(انظر : المعادلة الصغرى لعدد جبري
minimal equation of an algebraic number) .

المعادلة الصغرى لعدد جبري

algebraic number, minimal equation of an


<p>أو أكثر (على أساس أن جمع مقدار سالب يكافئ طرّح مقدار موجب) فالصيغة س - ص + ع مجموع جبرى على أساس أنها تكافئ س + (-ص) + ع .</p>	<p>وإذا كانت $n=3$ كان المنحنى تكعيبياً ، وهكذا .</p>
<p>سطح جبرى غير نسبى algebraic surface, irrational</p>	<p>براهين جبرية algebraic proofs براهين تستخدم فيها الرموز والعمليات الجبرية .</p>
<p>بيان دالة جبرية يظهر فيها المتغير (أو المتغيرات) تحت علامة جذر . فمثلاً المحل الهندسى لكل من الدالتين : $E = \sqrt{V + S^2} ,$ $E = \sqrt{V^3 + S} \text{ سطح جبرى غير نسبى .}$</p>	<p>حلول جبرية algebraic solutions حلول تُستخدَم الرموز والعمليات الجبرية للحصول عليها .</p>
<p>رموز جبرية algebraic symbols حروف تمثل أعداداً ، وكذلك رموز العمليات الجبرية المختلفة . مثل س ، - ، + ، $\sqrt{\quad}$ ، ...</p>	<p>الطرح الجبرى algebraic subtraction تغيير إشارة المطروح وجمعه على المطروح منه . فمثلاً $V + 5 = (V-) - 5 , (V-) + 5 = V - 5$</p>
<p>حد جبرى algebraic term الكمية الواحدة من الصيغة الجبرية الموضوعة على صورة حاصل جمع كميات . فالصيغة</p>	<p>مجموع جبرى algebraic sum = algebraic addition ما ينتج عن جمع أو طرح حدين جبريين</p>

معجم الرياضيات

<p>طريقة لإيجاد القاسم المشترك الأعظم لعددین صحیحین ، وتجری علی النحو التالی :</p> <p>يُقسَم أحد العددين على الآخر ، ثم يُقسم الثاني على باقى القسمة ، ويقسم باقى القسمة الأول على باقى القسمة الثاني ، ويقسم باقى القسمة الثاني على باقى القسمة الثالث ، وهكذا . وعند الحصول على قسمة تامة فى النهاية ، يكون القاسم الأخير هو القاسم المشترك الأعظم للعددين المعطيين .</p> <p>فمثلاً لإيجاد القاسم المشترك الأعظم للعددين ١٢ ، ٢٠ نجد أن :</p> <p>$20 \div 12$: خارج القسمة ١ وباقى القسمة ٨ ،</p> <p>$12 \div 8$: خارج القسمة ١ وباقى القسمة ٤ ،</p> <p>$8 \div 4 = 2$ وليس هناك باقى قسمة .</p> <p>إذن ٤ هو القاسم المشترك الأعظم للعددين ١٢ ، ٢٠ ، وفى الجبر يمكن تطبيق نفس الطريقة على كثيرات الحدود .</p>	<p>٢ س - ٣ ص + س ص^٢ تتكون من الحدود ٢ س ، - ٣ ص ، س ص^٢ .</p> <p>حقل مغلق جبرياً</p> <p>algebraically closed field</p> <p>حقل لكل معادلة كثيرة حدود عليه حل ، ومثال ذلك حقل الأعداد المركبة .</p> <p>الجول algol</p> <p>لغة من لغات الحاسب الإلكتروني تستعمل بصورة رئيسية للتطبيقات العلمية . واللفظة الانجليزية مختصرة من الكلمتين (لغة خوارزمية) algorithmic language</p> <p>خوارزمية algorithm</p> <p>متابعة من القواعد أو العمليات تؤدي إلى حل قضية محددة ، مثل إيجاد الجذر التربيعي لعدد ، وينسب هذا الأسلوب إلى الرياضى العربى "محمد بن موسى الخوارزمي" .</p>
<p>محاذاة alignment</p> <p>الوقوع على امتداد خط مستقيم .</p> <p>معامل المحاذاة</p> <p>alignment, coefficient of</p>	<p>خوارزمية "إقليدس"</p> <p>algorithm, Euclid's</p>

مجمع اللغة العربية - القاهرة

المماس عند P والوتر P هي h فإن القطعة المظللة (انظر الشكل) تسمى القطعة المتبادلة للزاوية h .



صيغة تناوبية **alternating form**
يقال لصيغة نونية الخطية y أنها تناوبية إذا كان

$y = (s_1, s_2, \dots, s_r)$ صفراً عندما يتساوى أى اثنتين من القيم s_1, s_2, \dots, s_r .

زمرة تناوبية من الدرجة النونية

alternating group of degree n

زمرة تتكون من جميع التباديل الزوجية لأشياء عددها n .

متسلسلة تناوبية **alternating series**

معامل إحصائي لقياس مدى المحاذاة ، يساوى $\sqrt{1 - r^2}$ حيث r معامل الارتباط . ويساوى هذا المعامل صفراً عندما تكون النقط على خط مستقيم .

قاسم تام **aliquot part**
أى عدد يقسم عدداً معطى بدون باق .
فمثلاً ٢ ، ٣ قواسم تامة للعدد ٦ .

محدد تبادلى **alternant**
محدد من درجة n عنصره الواقع فى العمود (أو الصف) الرائى والصف (أو العمود) الميمى هو $d_r (s_m)$ حيث d_1, \dots, d_r هي n من الدوال ، s_1, \dots, s_r هي n من الكميات
مثال ذلك المحدد

p	b	h	s
p^2	b^2	h^2	s^2
p^3	b^3	h^3	s^3

القطعة المتبادلة (لزاوية)

alternate segment

إذا كان P وترأ فى دائرة وكانت الزاوية بين

ارتفاع نقطة سماوية (أو جسم سماوى)
altitude of a celestial point (or body)
 البعد الزاوى أعلى (أو أسفل) أفق
 الراصد مقيساً على امتداد دائرة سماوية
 عظمى (دائرة رأسية) مارة بالنقطة
 (أو الجسم) والسمت والنظير . ويبعد الارتفاع
 موجباً عندما تكون النقطة (أو الجسم) أعلى
 الأفق ، وسالباً عندما تكون النقطة (أو الجسم)
 أسفل الأفق .

ارتفاع مخروط
altitude of a cone
 البعد العمودى من رأس المخروط إلى مستوى
 قاعدته .

ارتفاع أسطوانة
altitude of a cylinder
 البعد العمودى بين القاعدتين المتوازيتين
 للأسطوانة .

ارتفاع قطعة من قطع مكافئ
altitude of a parabolic segment

متسلسلة تناوب حدودها من حيث الإشارة
 بحيث إذا كان الحد الأول موجباً يكون الثانى
 سالباً والثالث موجباً والرابع سالباً وهكذا . . .
 مثال ذلك المتسلسلة :

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \dots$$

تناوب
alternation
 تبادل الحدود أو الأشياء .

تناسب بالتبديل
alternation, proportion by

إذا كان $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ فإن التناسب

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{d} \quad \text{وكذلك} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

يكون مشتقاً من التناسب الأصلى المعطى بالتبديل .

ارتفاع
altitude
 البعد الرأسى عن الأرض أو عن مستوى
 إسناد أفقى .

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>البعد العمودى من رأس الهرم إلى مستوى قاعدته .</p>	<p>البعد العمودى بين رأس القطع المكافئ والوتر الذى يحدد القطعة منه .</p>
<p>ارتفاع طاقة كروية</p> <p>altitude of a spherical cap</p> <p>البعد العمودى بين مركز القاعدة المستوية للطاقة وسطحها الكروى .</p>	<p>ارتفاع لمتوازى الأضلاع</p> <p>altitude of a parallelogram</p> <p>البعد العمودى بين ضلعين متوازيين من أضلاعه ، وبالتالي يكون لمتوازى الأضلاع ارتفاعان .</p>
<p>ارتفاع قطعة كروية</p> <p>altitude of a spherical segment</p> <p>= altitude of a spherical zone</p> <p>البعد العمودى بين القاعدتين المتوازيتين للقطعة الكروية ، ويساوى طول القطعة المستقيمة الواصلة بين مركزى هاتين القاعدتين .</p>	<p>ارتفاع لمتوازى السطوح</p> <p>altitude of a parallelopiped</p> <p>البعد العمودى بين وجهين متقابلين من أوجه متوازى السطوح ، وبالتالي يكون لمتوازى السطوح ثلاثة ارتفاعات .</p>
<p>ارتفاع شبه المنحرف</p> <p>altitude of a trapezoid</p> <p>البعد العمودى بين القاعدتين المتوازيتين لشبه المنحرف .</p>	<p>ارتفاع المنشور</p> <p>altitude of a prism</p> <p>البعد العمودى بين القاعدتين المتوازيتين للمنشور .</p>
<p>ارتفاع المثلث</p> <p>altitude of a triangle</p>	<p>ارتفاع الهرم</p> <p>altitude of a pyramid</p>

معجم الرياضيات

الحالة التي يكون المعلوم فيها ضلعين وزاوية تقابل أحدهما ، أو الحالة التي يكون المعلوم فيها زاويتين وضلعاً يقابل إحداهما .

الأعداد المتحابية amicable numbers

العددين المتحابان هما اللذان يكون مجموع قواسم كل منهما التي هي أصغر منه مساوياً للعد . الآخر . فالعددان ٢٢٠ ، ٢٨٤ متحابان لأن قواسم العدد ٢٢٠ التي تقل عنه هي ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ١٠ ، ١١ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٤٤ ، ٥٥ ، ١١٠ ومجموعها ٢٨٤ ، كما أن قواسم العدد ٢٨٤ التي تقل عنه هي ١ ، ٢ ، ٤ ، ٧١ ، ١٤٢ ومجموعها ٢٢٠ .

معادلة الاستهلاك الدوري لدين

amortization equation

معادلة تربط بين جملة المبلغ المطلوب سداؤه (أصل الدين أو القرض) ومعدل الفائدة وقيمة كل من الدفعات الدورية .

استهلاك دوري لدين

amortization of a debt

البعد العمودي من رأس المثلث إلى الضلع المقابل (القاعدة) ، وبالتالي يكون للمثلث ثلاثة ارتفاعات .

ambiguous


مبهم

ما ليس وحيد التعيين .

الحالة المبهمة للمثلث المستوي

ambiguous case for a plane triangle

حالة حل المثلث إذا علم منه ضلعان والزاوية المقابلة لأصغرهما . فمثلاً إذا أعطيت الزاوية P والضلعان \bar{P} ، \bar{P} ($\bar{P} > \bar{P}$) فإن كلاً من المثلثين P_1 ، P_2 ، P_3 قد يكون حلاً ممكناً (انظر الشكل) .



الحالة المبهمة للمثلث الكروي

ambiguous case for a spherical triangle

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>البسيط أو على حساب الربح المركب حتى ذلك التاريخ .</p>	<p>تسديد الدين أو القرض مع فوائده على دفعات دورية ، تكون متساوية عادة ، وتستمر حتى تمام سداد الدين . دون تجديد للعقد . والمبادئ الرياضية التي تستخدم هي نفس المبادئ المستخدمة في حساب الدفعات السنوية .</p>
<p>الأمبير ampère وحدة لقياس التيار الكهربى ، وينسب الاسم إلى العالم الرياضى والفيزيقي الفرنسى " أندريه أمبير " (١٧٧٥ - ١٨٣٦) .</p>	<p>استهلاك قسط على وثيقة amortization of a premium on a bond تخفيض القيمة الاسمية للوثيقة عند تاريخ كل ربيعة بقيمة مساوية للفرق بين الربحة والفائدة على القيمة الاسمية بمعدل الفائدة السارى .</p>
<p>الأمبير الدولى ampère, international وحدة لقياس التيار الكهربى وتساوى ٠,٩٩٩٨٣٥ من الأمبير المطلق .</p>	<p>بيان استهلاك الدين amortization schedule جدول يعطى الدفعة السنوية وجملة رأس المال والجملة شاملة الفوائد ورصيد رأس المال المستحق .</p>
<p>سعة العدد المركب amplitude of a complex number (انظر: argument of a complex number) .</p>	<p>الجملة amount جملة رأس مال معين حتى تاريخ معين هو مجموع رأس المال والفوائد على حساب الربح</p>
<p>سعة منحنى amplitude of a curve أكبر قيمة عددية للإحداثيات الصادية لمنحنى دورى (منحنى دالة دورية) .</p>	

أسلوب للاستنتاج والاستدلال يستخدم في الرياضيات لصياغة نظريات جديدة . وهو يبنى على المناظرة العقلانية : إذا اتفق شيان أو أكثر في بعض الأمور فإنها قد تتفق في أمور أخرى وربما تتفق في كل الأمور . وهذا القياس قد يفيد في تخمين بعض النتائج ولكنه لا يغنى عن البرهنة ، فلا بد من وضع البراهين المضبوطة للتحقق من صحة النظريات المطروحة بهذا الأسلوب .

يحلل
analyse, to
يستخدم الطرق التحليلية دون الطرق التركيبية .

التحليل
analysis
فرع الرياضيات الذى يستخدم - فى الغالب - الطرق الجبرية والتفاضل والتكامل .

التحليل التوافيقى
analysis, combinational
فرع الرياضيات الذى يعنى بدراسة طرق الاختيار سواء بأخذ الترتيب بعين الاعتبار أم بدون ذلك .

فمثلاً سعة ص = حاس تساوى ١ ، وسعة ص = ٢ حاس تساوى ٢ .

سعة نقطة
amplitude of a point
إذا كان (r, θ) الإحداثيين القطبيين لنقطة فى المستوى فإن الزاوية θ تسمى سعة النقطة .

سعة حركة توافقية بسيطة
amplitude of a simple harmonic motion
إذا كانت نقطة مادية تتحرك حركة توافقية بسيطة بين نقطتين وكان بعد كل منهما عن مركز الحركة يساوى p فإن p يسمى سعة الحركة التوافقية البسيطة .

حاسبة بالقياس
analogue computer
حاسبة يقوم عملها على إحلال قيم مقيسة محل الأعداد المعطاة ، مثل المسطرة الحاسبة .

القياس
analogy

<p>ثم تبيان المطلوب والخطوات التي سيجرى اتباعها لحل المسألة .</p>	<p>تحليل " ديوفانتيني "</p> <p>analysis, Diophantine</p>
<p>التحليل الإحصائي للبيانات</p> <p>analysis of data, statistical</p> <p>طريقة تبويب البيانات وإيجاد مداها ومتوسطها وتغيرها وغير ذلك من مقاييس التشتت (dispersion) أو مقاييس النزعة المركزية (central tendency) .</p>	<p>طريقة للحصول على جذور صحيحة لمعادلات جبرية معينة ، وتعتمد غالباً على استخدام حاذق لمتغيرات وسيطة اختيارية ، وتنسب إلى الرياضي السكندري " ديوفانتوس " Diophantus (٣٢٥ م - ٤١٠ م) .</p> <p>تحليل رياضي</p> <p>analysis, mathematical</p>
<p>تحليل التباين</p> <p>analysis of variance</p> <p>التحليل الإحصائي لتباين متغير عشوائي لتعيين ما إذا كانت عوامل معينة مصاحبة للمتغير تسهم في هذا التباين .</p>	<p>فرع الرياضيات الذي يعنى بدراسة الدوال والنهايات وحساب التفاضل والتكامل .</p> <p>تحليل نوني العوامل (في الإحصاء)</p> <p>analysis, n-way (in statistics)</p>
<p>تحليل بعامل واحد (في الإحصاء)</p> <p>analysis, one-way (in statistics)</p> <p>تحليل يعتمد فيه تصنيف العوامل محل الدراسة التي يعتقد أنها تسهم في التباينات تحت اسم واحد عام ، فمثلاً ذكر وأنثى يصنف تحت جنس .</p>	<p>تصنيف عام مشترك للقيم مبنى على ن من العوامل المشتركة معاً .</p> <p>تحليل مسألة</p> <p>analysis of a problem</p> <p>تبويب كل من المعلومات المعطاة في المسألة والمعلومات الأخرى المرتبطة بها بلغة رياضية ،</p>

<p>ثمن قنطارين منه بالرجوع إلى ثمن القنطار كوحدة .</p>	<p>البرهان بالتحليل analysis, proof by</p>
<p>محلل نظم analyst, systems خبير في تحليل النظم .</p>	<p>البدء من الشيء المراد إثباته والتقدم إلى حقيقة معينة معلومة ، وهو يضاد الأسلوب التركيبي للبرهان الذي يبدأ من حقيقة معلومة ليصل إلى ما يراد إثباته .</p>
<p>امتداد تحليلي لدالة تحليلية في متغير مركب analytic continuation of an analytic function of a complex variable = analytic extension of an analytic function of a complex variable</p>	<p>طوبولوجيا analysis situs = topology (انظر : طوبولوجيا topology) .</p>
<p>إذا كانت $y = f(x)$ دالة تحليلية وحيدة القيمة في متغير مركب x في مجال S فقد توجد دالة $g(x)$ تحليلية في مجال تكون S فئة جزئية فعلية منه وبحيث تكون $g(x) = f(x)$ في S . عملية الحصول على $g(x)$ من $f(x)$ تسمى امتداداً تحليلياً ، كما أن $g(x)$ تسمى الامتداد التحليلي للدالة $f(x)$.</p>	<p>تحليل بعاملين (في الإحصاء) analysis, two-way (in statistics) تحليل يعتمد فيه تصنيف القيم الملاحظة أو الملاحظة على عاملين رئيسيين معاً مثل الجنس والحالة الاجتماعية .</p>
<p>فمثلاً الدالة $f(x) = \frac{1}{x-1}$ ، $x \neq 1$ ، هي الامتداد التحليلي للدالة $f(x) = \frac{1}{x-1}$ ، $x > 1$ ، وذلك</p>	<p>تحليل واحد analysis, unitary نظام للتحليل يتمثل في التقدم من عدد معطى من الوحدات إلى الوحدة ، ثم إلى العدد المطلوب من الوحدات . ومثال ذلك إيجاد ثمن سبعة قناطير من القطن إذا علم</p>

رتبة (٢- نقطة) هي رتبة صفر الدالة د (ع) -
٢ عند النقطة .

دالة تحليلية عند نقطة .

analytic function at a point

يقال لدالة وحيدة القيمة د (ع) في المتغير
المركب ع إنها تحليلية عند النقطة ع ، إذا كان
هناك جوار للنقطة ع ، تكون د (ع) موجودة عند
كل نقطة من نقطه .

مشتقة دالة تحليلية

analytic function, derivative of an

إذا كانت د (ع) تحليلية لجميع نقاط
كفاف بسيط مغلق ل ونقاط داخلية
وكانت :

$$د(ع) = \int \frac{1}{ط ت له} د(ي) د ي$$

لأى نقطة ع من نقاط داخلية له ، وأى نقطة ي
من نقاط له فإن :

$$د(ع) = \int \frac{ك}{ط ت له} د(ي) د ي$$

، ١ = ٢ ، ... ،

حيث إن ر (ع) = د (ع) لجميع نقط داخلية
الدائرة | ع | = ١ . لاحظ أن الدالة ر (ع)
تحليلية عند جميع نقط المستوى عدا النقطة
ع = ١ .

منحنى تحليلي analytic curve

منحنى في فراغ إقليدى نونى البعد يمكن
تمثيله في جوار كل نقطة من نقطه على الصورة :
س_ر = س_ر(ي) ، س_ر = ١ ، ٢ ، ... ، ن ،
حيث س_ر دوال حقيقية تحليلية في المتغير ي .

منحنى تحليلي منتظم

analytic curve, regular

منحنى تحليلي بحيث :

$$\frac{ن}{١=ر} \left(\frac{د س ر}{د ي} \right) \neq \text{صفرًا} .$$

في هذه الحالة يسمى المتغير الوسيط ي متغيراً
وسيطاً منتظماً regular parameter للمنحنى .

٢- نقطة (لدالة تحليلية

analytic function, a-point of an

نقطة صفرية للدالة التحليلية د (ع) - ٢ ،

<p> $d(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_n(z) - f_{n-1}(z)}{1}$ </p> <p>دالة تحليلية في متغير مركب</p> <p>analytic function of a complex variable</p> <p>= Holomorphic function</p> <p>يقال لدالة متغير مركب د (ع) وحيدة القيمة أو متعددة القيم مأخوذة على أنها دالة وحيدة القيمة على سطح "ريمان" المناظر لها : إنها تحليلية عند نقطة ع. إذا كانت مشتقتها موجودة لا عند ع. فقط بل عند كل نقطة ع من نقط جوار ما للنقطة ع. . يقال للدالة د (ع) إنها تحليلية على منطقة ع إذا كانت تحليلية عند كل نقطة من نقط ع .</p> <p>دالة تحليلية لمتغير حقيقي</p> <p>analytic function of a real variable</p> <p>يقال لدالة د (س) إنها تحليلية عندما $s = s_0$ إذا كان بالإمكان تمثيلها بمتسلسلة "تايلور" في قوى (س - س₀) التي تكون مساوية للدالة لأي س في جوار ما للنقطة س₀.</p>	<p>نقطة شاذة أساسية لدالة تحليلية</p> <p>analytic function, essential singular point of an</p> <p>إذا كانت ع. نقطة شاذة معزولة لدالة د (ع) وكانت المتسلسلة $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f_n(z) - f_{n-1}(z)}{1}$ تحوى عدداً لا نهائياً من الحدود غير الصفرية ، فإن النقطة ع. تسمى نقطة شاذة أساسية للدالة د (ع) .</p> <p>(انظر : نقطة شاذة معزولة لدالة تحليلية)</p> <p>isolated singular point of an analytic function</p> <p>نقطة شاذة معزولة لدالة تحليلية</p> <p>analytic function, isolated singular point of an</p> <p>إذا وجد جوار للنقطة الشاذة ع. تكون الدالة د (ع) تحليلية عند جميع نقطه فيما عدا ع. فإنها تكون نقطة شاذة معزولة . فمثلاً نقطة الأصل $\frac{1}{z}$ نقطة شاذة معزولة للدالة $\frac{1}{z}$.</p> <p>وعندئذ توجد حلقة $r_1 < z - z_0 < r_2$ تكون عليها الدالة تحليلية ويمكن تمثيلها بمتسلسلة لوران على الصورة :</p>
--	---

شاذة للدالة د (ع) $\frac{1}{ع}$ (الدالة غير معرفة عند نقطة الأصل) ، والدالة د (ع) $= |ع|$ ليس لها نقط شذوذ لأنها ليست تحليلية عند أي نقطة .

أصفار دالة تحليلية

analytic function, zeros of an

إذا كانت د (ع) تحليلية عند ع . فإن ع . تسمى صفراً للدالة د (ع) إذا كان د (ع) = صفراً . إذا كانت ، بالإضافة إلى ذلك ، د (ع) = د (ع) = د (ع) = ... = د (ع) = صفراً ، د (ع) \neq صفراً فإن ع . تسمى صفراً من درجة م (zero of order m) لدالة د (ع) .

عائلة قياسية من الدوال التحليلية

analytic functions, normal family of

عائلة { د (ع) } من دوال في المتغير المركب ع ، جميعها تحليلية في مجال بـ ، بحيث تحوى كل متتابعة لانهاية من دوالها متتابعة جزئية منتظمة التقارب ، ودالة النهاية لها دالة تحليلية في كل منطقة مغلقة في بـ .

يقال للدالة إنها تحليلية في الفترة (ب ، ٢) إذا كانت تحليلية لكل س . في الفترة (ب ، ٢) .

نقطة شاذة قابلة للإزالة لدالة تحليلية

analytic function, removable singular point of an

إذا كانت ع . نقطة شاذة معزولة لدالة تحليلية د (ع) وكانت جميع المعاملات ب_n في المتسلسلة :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n!} (ع - ع_0)^n$$

تساوى صفراً ، فإن النقطة ع . تسمى نقطة شاذة قابلة للإزالة للدالة التحليلية د (ع) .

انظر : نقطة شاذة معزولة لدالة تحليلية

(isolated singular point of an analytic function)

نقطة شاذة لدالة تحليلية


analytic function, singular point of an

نقطة لا تكون عندها دالة المتغير المركب تحليلية ، ولكن يوجد في كل جوار لها نقط تكون الدالة عندها تحليلية . فمثلاً نقطة الأصل نقطة

<p>بنية تحليلية لفراغ</p> <p>analytic structure for a space</p> <p>غطاء لفراغ إقليدى محلى نونى البعد بفئة $\{Y_\alpha\}$ من الفئات المفتوحة كل منها متشاكل اتصالياً لفئة مفتوحة في فراغ إقليدى نونى البعد X وبحيث إنه لكل Y_α ، Y_β حيث $Y_\alpha \cap Y_\beta \neq \emptyset$ ، فإن التحويل الإحداثى في كل من الاتجاهين يعطى بدلالة دوال تحليلية .</p> <p>إذا كانت $M \ni Y_\alpha \cap Y_\beta$ فإن التشاكل المتصل لكل من Y_α ، Y_β مع فئة مفتوحة من الفراغ الإقليدى النونى البعد تعين إحداثيات (x_1, \dots, x_r) ، (y_1, \dots, y_s) للنقطة M بحيث تكون الدوال :</p> $x_r = x_r(y_1, \dots, y_s)$ $y_s = y_s(x_1, \dots, x_r)$ <p>تحليلية . البنية التحليلية تكون حقيقية أو مركبة تبعاً لما إذا كانت إحداثيات نقط X مأخوذة على أنها حقيقية أو مركبة .</p>	<p>هندسة تحليلية تح analytic geometry = analytical geometry</p> <p>الهندسة التى يمثل فيها موضع النقطة تحليلياً (أى بالإحداثيات) ، وتستخدم فيها الطرق الجبرية في أغلب الأحوال لإثبات المبرهنات ولحل المسائل .</p> <p>طريقة تحليلية analytic method</p> <p>طريقة تعتمد على الأسلوب الرياضى المسمى التحليل . (انظر : تحليل analysis) .</p> <p>برهان تحليلي analytic proof</p> <p>برهان يعتمد على الأسلوب الرياضى المسمى التحليل . (انظر : تحليل analysis) .</p>
<p>تحليلياً analytically</p> <p>صفة لما ينجز باستخدام الطرق التحليلية دون الطرق التركيبية (synthetic methods) .</p> <p>نقطة التحليلية analyticity, point of</p>	<p>حل تحليلي analytic solution</p> <p>حل يعتمد على الأسلوب الرياضى المسمى التحليل . (انظر : تحليل analysis) .</p>

السطح الناتج من دوران دائرة حول مستقيم في مستواها ويبعد عن مركزها بعداً يزيد على نصف قطرها . ومعادلة السطح الكعكي الناشئ من دوران دائرة مركزها (ب ، صفر) ونصف قطرها P ، $P < b$ ، في المستوى ص ع حول محور العينات هي :

$$P^2 = E^2 + (b - \sqrt{b^2 - P^2})^2$$



“and” gate

بوابة “و”

بوابة من بوابات المنطق لها مخرج واحد ومدخلان على الأقل كما في الشكل . وتعمل دائرة هذه البوابة بظهور نبضة كهربائية على مخرجها إذا وجدت نبضات كهربائية في نفس الوقت على جميع مدخلاتها ، ومخرجها في

نقطة تكون عندها الدالة د (ع) في المتغير المركب ع تحليلية .

السلف من النوع الأول لعلاقة ما
ancestral of the first kind of a relation,
the


يقال لعلاقة ع* فوق فئة سـ إنها السلف من النوع الأول لعلاقة ما ع فوق سـ إذا كانت س ع* ص تؤدي إلى س ع^ص ، حيث \mathcal{N} عدد صحيح موجب .

السلف من النوع الثاني لعلاقة ما
ancestral of the second kind of a
relation, the

يقال لعلاقة ع* فوق فئة سـ إنها السلف من النوع الثاني لعلاقة ما ع فوق سـ إذا كانت س ع* ص تؤدي إلى س ع^ص ، حيث \mathcal{N} عدد صحيح غير سالب وحيث س ع* ص تعني أن $s = v$.


السطح الكعكي anchor ring = torus

زاوية مقياسها أصغر من مقياس زاوية قائمة .




زاوية محيطية
= angle, inscribed

زاوية رأسها نقطة على محيط الدائرة وצלعاها وتران في الدائرة .




الزاوية بين خط مستقيم ومستوي
angle between a line and a plane


الزاوية الحادة التي ضلعاها الخط المستقيم ومسقطه في المستوي . θ الزاوية بين الخط المستقيم والمستوي .



هذه الحالة « ١ » بينما المخرج « صفر » فيما عدا ذلك .



زاوية
اتحاد شعاعين لها نفس نقطة البداية .
يسمى كل من هذين الشعاعين ضلعاً (side)
للزاوية كما تسمى نقطة بداية الشعاعين رأس
الزاوية (vertex) .




angle, acute

زاوية حادة

شعاع نقطة نهايته رأس الزاوية ، ويقسم
الزاوية إلى زاويتين متجاورتين متساويتين
المقياس .

زاوية مركزية **angle, central**
= **angle at the centre of a circle**
زاوية رأسها مركز الدائرة .


زاوية ثنائية الوجه **angle, dihedral**
فئة اتحاد نصفين مستويين لهما حد مشترك .
ووجهها الزاوية الثنائية الوجه هما نصفا المستويين
المكونين لها . وحافة الزاوية الثنائية الوجه هي خط
تقاطع وجهيهما . وتقاس الزاوية الثنائية الوجه
بالزاوية للمستوية التي ضلعها هما خطا تقاطع
مستوي عمودى على حافة الزاوية مع وجهيهما .



وبالتالى تكون الزاوية الثنائية الوجه حادة ،
منفرجة ، مستقيمة ، أو قائمة إذا كانت زاويتها


الزاوية بين منحنين متقاطعين
angle between two intersecting
curves
= **curvilinear angle**

الزاوية المحصورة بين مماسى المنحنين عند
تنطة تقاطعها .




الزاوية بين مستويين
angle between two planes
الزاوية المستوية للزاوية الثنائية الوجه التي
وجهها المستويان .

الزاوية بين المستويين ١ ، ٢ ، θ



متصف الزاوية **angle, bisector of an**

<p>حافة زاوية ثنائية الوجه</p> <p>angle, edge of a dihedral</p> <p>(انظر : زاوية ثنائية الوجه) angle, dihedral .</p>	<p>المستوية حادة ، منفرجة ، مستقيمة أو قائمة على الترتيب .</p>
<p>حافة زاوية متعددة الأوجه</p> <p>angle, edge of a polyhedral</p> <p>(انظر : زاوية متعددة الأوجه) angle, polyhedral .</p>	<p>زاوية ثنائية الوجه لزاوية متعددة الأوجه</p> <p>angle, dihedral angle of a polyhedral</p> <p>(انظر : زاوية متعددة الأوجه) polyhedral angle .</p>
<p>عنصر زاوية متعددة الأوجه</p> <p>angle, element of a polyhedral</p> <p>(انظر : زاوية متعددة الأوجه) angle, polyhedral .</p>	<p>زاوية الاختلاف المركزي</p> <p>angle, eccentric</p> <p>إذا كانت م نقطة على القطع الناقص الذى مركزه و ، ومحوره الأكبر س س ومحوره الأصغر ص ص فإنه توجد نقطة واحدة م مناظرة للنقطة م على الدائرة المساعدة للقطع الناقص (الدائرة التى قطرها س س) وهى نقطة تقاطع المستقيم المرسوم من م موازياً ص ص مع الدائرة المساعدة وفى نفس الربع والزاوية التى ضلعاها س س ، وم هى زاوية الاختلاف المركزى للنقطة م على القطع الناقص .</p>
<p>زاوية خارجية</p> <p>angle, exterior</p> <p>إذا قطع خط مستقيم ل مستقيمين م ، ن فإن كل زاوية ضلعاها نصف المستقيم م (أو ن) ونصف المستقيم ل الذى لا يقطع المستقيم ن (أو م) تسمى زاوية خارجية .</p>	

(انظر : زاوية متعددة الأوجه
angle, polyhedral)


زاوية في الربع الأول

angle, first quadrant


زاوية رأسها نقطة الأصل وينطبق ضلعها الابتدائي على الاتجاه الموجب لمحور السينات ويقع ضلعها النهائي في الربع الأول من مستوى الإحداثيات (س ، ص) . مثل الزوايا 72° ، 380° ، -350° .

الزاوية المرسومة في قطعة من دائرة
angle in a segment of a circle

زاوية رأسها على قوس القطعة الدائرية ويمر ضلعها بنهايتي وتر القطعة مثل $\angle P$ حـ في الشكل .



في الشكل الزوايا ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ زوايا خارجية



خارجية الزاوية angle, exterior of an
جميع نقط المستوى التي لا تنتمي للزاوية أولداخليتها .

زاوية وجه لزاوية متعددة الأوجه

angle, face angle of a polyhedral

(انظر : زاوية متعددة الأوجه
angle, polyhedral)

وجه لزاوية ثنائية الوجه

angle, face of a dihedral

(انظر : زاوية ثنائية الوجه
angle, dihedral)


وجه زاوية متعددة الأوجه

angle, face of a polyhedral

زاوية مرسومة في نصف دائرة

angle in a semicircle

زاوية يقع رأسها على محيط الدائرة ويمر ضلعاها بنهايتي قطر فيها . وهي زاوية قائمة دائماً .



زاوية في وضع قياسي


angle in standard position

تكون الزاوية المستوية في وضع قياسي إذا كان رأسها نقطة الأصل وانطبق ضلعاها الابتدائي على المحور السيني الموجب في نظام الإحداثيات المتعامدة (س ، ص) .

angle, interior

زاوية داخلية

إذا قطع خط مستقيم ل مستقيمين م ، ن فإن كل زاوية ضلعاها نصف المستقيم م (أو ن) ونصف المستقيم ل الذي يقطع المستقيم ن (أو م) تسمى زاوية داخلية . الزوايا ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ في الشكل زوايا داخلية .



angle, included

الزاوية المحصورة


(انظر : زاوية مثلث)

(angle of a triangle)

الضلع الابتدائي لزاوية

angle, initial side of an

إذا كانت ب و P زاوية دوران مولدة بالشعاع \overrightarrow{OP} فإن الشعاع \overrightarrow{OB} يسمى الضلع الابتدائي للزاوية .



angle, interior of an

داخلية الزاوية

إذا كانت P و B زاوية ، فإن فئة تقاطع نصف المستوى الذي حده المستقيم \overleftrightarrow{OP} ويحوى النقطة ب مع نصف المستوى الذي حده

قياس (أو تقدير) الزوايا

angle measure

يوجد عدد من الأنظمة لقياس الزوايا وأكثرها شيوعاً التقدير الدائري ووحدته الزاوية النصف قطرية ، والتقدير الستيني ووحدته الدرجة .

مقياس زاوية ثنائية الوجه

angle, measure of a dihedral

مقياس زاوية مستوية ضلعاها هما تقاطعا مستوي عمودى على حافة الزاوية الثنائية الوجه مع وجهيهما .


مقياس زاوية angle, measure of an
عدد الوحدات التى تحويها الزاوية ، تبعاً لنظام القياس المستخدم .

وحدات قياس الزاوية

angle, measure units of an

فى نظام التقدير الستيني : الدرجة degree ، وفى نظام التقدير الدائري : الزاوية النصف القطرية radian .


المستقيم \overleftrightarrow{AB} ويحوى النقطة P يسمى داخلية $\angle AOB$.



الضلع الأيسر للزاوية

angle, left side of an


إذا نظرنا إلى زاوية من عند رأسها فإن ضلع الزاوية الذى يقع على اليسار من العين يقال له ضلع أيسر للزاوية .



الزاوية نصف الرأسية للمخروط
(الدائري القائم)

angle of a cone, semi-vertical

الزاوية التي رأسها رأس المخروط الدائري
القائم وصلعاها محور المخروط وأحد روااسمه .



زاوية الاتجاه لمستقيم في المستوى

angle of a line in the plane, direction

أصغر زاوية موجبة (أو صفر) يصنعها
المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات في
المستوى .

زاوية هلال كروي

angle of a lune

الزاوية الناتجة عن تقاطع دائرتين عظميين في
كرة .

زاوية داخلية لمضلع

angle of a polygon, interior


angle, negative

زاوية سالبة

= زاوية سالبة التوجيه

= angle, negatively oriented


زاوية تنشأ من دوران في اتجاه دوران عقربى
الساعة .



angle, obtuse

زاوية منفرجة

زاوية مقياسها أكبر من مقياس الزاوية القائمة
وأقل من مقياس الزاوية المستقيمة .




زاوية ساعية لنقطة سماوية

angle of a celestial point, hour


الزاوية بين مستوى الزوال للراصد ومستوى
الدائرة الساعية للنجم .

(انظر : الدائرة الساعية hour circle) .

زاوية الانخفاض
angle of depression
إذا رصدت نقطة من نقطة مرتفعة عنها ،
فزاوية انخفاضها زاوية رأسها نقطة الرصد
وضلعها ، في مستوى رأسى ، أحدهما أفقى
والآخر واصل من رأسها إلى النقطة المرصودة .



زاوية الارتفاع
angle of elevation
إذا رصدت نقطة من نقطة منخفضة عنها ،
فزاوية ارتفاعها زاوية رأسها نقطة الرصد وضلعها ،
في مستوى رأسى ، أحدهما أفقى والآخر واصل من
رأسها إلى النقطة المرصودة .



زاوية الاحتكاك
angle of friction

زاوية ضلعها ضلعان متجاوران من أضلاع
المضلع . ومقياسها هو أصغر مقياس يتحدد
بدوران أحد الضلعين نحو الآخر عبر داخلية
المضلع .

زاوية وجه لزاوية متعددة الأوجه
angle of a polyhedral angle, face
(انظر : زاوية متعددة الأوجه)
polyhedral angle .

زاوية مثلث
angle of a triangle
زاوية رأسها رأس من رؤوس المثلث وضلعها
الشعاعان البادئان من هذا الرأس مارين
بالرأسين الآخرين للمثلث ، وتسمى أيضاً
بالزاوية المحصورة (angle, included) بين
ضلعين للمثلث .

زاوية رأس المثلث
angle of a triangle, vertical
= angle, vertex

الزاوية المقابلة لقاعدة المثلث .


زاوية تقاطع مستقيمين

angle of intersection of two lines

الزاوية بين متجهي اتجاه للمستقيمين إذا كانت الزاوية بين متجهي الاتجاه حادة أو مكملتها إذا كانت الزاوية بين متجهي الاتجاه منفرجة .


إذا كان Y_1 ، Y_2 متجهي اتجاه للمستقيمين L_1 ، L_2 فإن الزاوية θ بينهما تعطى من العلاقة

$$\cos \theta = \frac{|Y_1 \cdot Y_2|}{|Y_1| |Y_2|}$$




زاوية القذف angle of projection

الزاوية التي يصنعها اتجاه القذف ، لمقذوف في الهواء ، مع المستوى الأفقي المار بنقطة القذف .




إذا وضع جسم على سطح خشن فالزاوية بين رد الفعل المحصل م ورد الفعل العمودي ، عندما يكون الجسم على وشك الحركة ، هي زاوية الاحتكاك (انظر الشكل) وظلها هو معامل الاحتكاك ، ويسمى الاحتكاك في هذه الحالة الاحتكاك النهائي

(انظر : احتكاك friction) .



زاوية السقوط angle of incidence

إذا سقط شعاع ضوئي حـ د على سطح مصقول P (كسطح مرآة) وانعكس على امتداد عـ د ، وكان عـ د والعمودي على P ، فإن حـ د و تسمى زاوية سقوط الشعاع حـ د .




angle of rotation زاوية الدوران
إذا كان \vec{P} و \vec{Q} ، و \vec{K} شعاعين منطبقين لهما نفس الاتجاه ، ودار \vec{P} حول \vec{Q} في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة ، فإن \vec{K} و \vec{P} تسمى زاوية الدوران المولدة بالشعاع \vec{Q} .




زاوية ميل مستقيم (هندسة تحليلية
مستوية)

angle of slope of a line
= **angle of inclination of a line**


الزاوية الموجبة من الاتجاه الموجب لمحور السينات إلى الخط المستقيم ، ويتراوح مقياسها بين صفر ومائة وثمانين درجة ؛ في الشكل θ زاوية ميل المستقيم ل .




angle of reflection زاوية الانعكاس
إذا سقط شعاع ضوئي حـ د على سطح مصقول P (كسطح مرآة) وانعكس على امتداد د هـ ، وكان د والعمودي على P ، فإن حـ د تسمى زاوية انعكاس الشعاع حـ د .




angle of refraction زاوية الانكسار
إذا سقط شعاع ضوئي حـ د على الوجه المحدد P لوسط نفاذ للضوء (كالماء مثلاً) وانكسر داخل الوسط على امتداد د هـ وكان د و العمودي على السطح P ناحية الوسط ، فإن الزاوية د هـ و تسمى زاوية انكسار الشعاع حـ د .



عناصر الزاوية ، والعنصر المار برأس من رؤوس المضلع حافة للزاوية ، وجزء المستوى الواقع بين حافتين متتاليتين وجها للزاوية ، والزاوية بين حافتين متتاليتين زاوية وجه للزاوية ، والزاوية الثنائية الوجه المكونة من وجهين متقاطعين زاوية ثنائية الوجه للزاوية المتعددة الأوجه .



زاوية موجبة
angle, positive
= زاوية موجبة التوجيه
= angle, positively oriented
زاوية تنشأ من دوران في اتجاه ضد دوران عقربى الساعة .




زاوية منعكسة
angle, reflexive (reflex)
زاوية مقياسها أكبر من مقياس زاوية مستقيمة

الزاوية المستوية لزاوية ثنائية الوجه
angle, plane angle of a dihedral

(انظر : زاوية ثنائية الوجه
angle, dihedral)


زاوية قطبية (لنقطة)
angle, polar
زاوية ضلعها المحور القطبي والضلع الواصل من نقطة الأصل (القطب) إلى النقطة . وهي الإحداثى الزاوى (الثانى) للنقطة فى نظام الإحداثيات القطبية .
(انظر : إحداثيات قطبية polar coordinates) .

θ : الزاوية القطبية للنقطة



زاوية متعددة الأوجه
angle, polyhedral
فئة اتحاد نقطة والأشعة التى تصلها بجميع نقط أضلاع مضلع مستوي لا تقع النقطة فى مستواه . وتسمى النقطة رأس الزاوية ، والأشعة

إذا نظرنا إلى زاوية من عند رأسها فإن ضلع الزاوية الذي يقع على اليمين من العين يقال له ضلع أيمن للزاوية .




مقطع زاوية متعددة الأوجه

angle, section of a polyhedral

المضلع الناشئ عن قطع كل حواف الزاوية بمستوي غير مار برأس الزاوية . فمثلاً المضلع ABC في الشكل مقطع للزاوية الخماسية الأوجه التي رأسها النقطة O

(انظر : زاوية متعددة الأوجه)

angle, polyhedral



زاوية موجهة

angle, sensed (oriented)

وأقل من مقياس دورة كاملة .



angle, related

زاوية مرتبطة

زاوية حادة في الربع الأول تتساوى قيم دوالها المثلثية مع القيم المطلقة للدوال المثلثية لزاوية في ربع آخر . فمثلاً الزاوية 30° هي الزاوية المرتبطة لكل من الزاويتين 150° ، 210° .

angle, right

زاوية قائمة

زاوية مقياسها عددياً تسعون درجة $\left(\frac{\pi}{2}\right)$ بالتقدير الدائري .




الضلع الأيمن للزاوية

angle, right side of an

زاوية كروية **angle, spherical**

الزاوية بين دائرتين عظميين لكرة .

(انظر : الزاوية بين منحنين متقاطعين)
angle between two intersecting curves .



زاوية مستقيمة


angle, straight = flat angle

زاوية يقع ضلعاها على خط مستقيم واحد ويمتدان من الرأس في اتجاهين متضادين ومقياسها ١٨٠° .

زاوية مقابلة لخط

angle subtended by a line

أى زاوية يمر ضلعاها بنهايتى قطعة مستقيمة من الخط المستقيم ، وعليه فكل زاوية فى مثلث تكون مقابلة لضلع المثلث الذى ليس ضلعاً لها .



الزاوية الموجهة $\angle POQ$ هى الزوج المرتب $(O, \angle POQ)$ من الأشعة ، ويرمز لها بالرمز $\angle POQ$ ، حيث O هو الضلع الابتدائى ، و P هو الضلع النهائى . ويلاحظ أن $\angle POQ \neq \angle QOP$.


ضلع الزاوية

angle, side of an = angle, arm of an

أى شعاع من الشعاعين المكونين للزاوية .

زاوية مجسمة **angle, solid**


الزاوية المجسمة عند أى نقطة O المقابلة للسطح S تساوى جزء المساحة M لكرة الوحدة ذات المركز O والمقطوعة بسطح مخروطى رأسه فى O ، والمنحنى المحدد للسطح S مولد له . إذا كان S مغلقاً ، أى يقسم الفراغ إلى قسمين ، فإن الزاوية المجسمة تكون 4π أو 2π أو صفراً على حسب ما إذا وقعت O داخل S أو على سطحه أو خارجه .



الضلع النهائي للزاوية

angle, terminal side of an


إذا كانت θ و ϕ زاوية دوران مولدة بالشعاع \overrightarrow{OP} فإن الشعاع \overrightarrow{OQ} يقال له الضلع النهائي للزاوية .



زاوية رباعية الأوجه

angle, tetrahedral


زاوية متعددة الأوجه عدد أوجهها أربعة .



زاوية ثلاثية الأوجه

angle, trihedral


زاوية متعددة الأوجه والمقطع المقابل للرأس فيها مثلث . وهي أبسط أنواع الزوايا المتعددة الأوجه .



الزاوية المحيطية التي يحصرها قوس دائرة عند نقطة عليه

angle subtended by an arc of a circle at a point on the arc


الزاوية التي ضلعاها المستقيمان المتجهان من النقطة إلى نهايتي القوس .
(انظر الشكل)



الزاوية المركزية التي تقابل قوس دائرة

angle subtended by an arc of a circle at its centre


الزاوية التي ضلعاها نصف القطرين المتجهين إلى نهايتي القوس ويكون مقياسها أصغر من 180° إذا كان القوس أصغر من نصف الدائرة وأكبر من 180° إذا كان القوس أكبر من نصف الدائرة .



(انظر : زاوية متعددة الأوجه)
angle, polyhedral

زاوية صفيرية
angle, zero
زاوية مقياسها يساوى الصفر وبالتالي ينطبق ضلعها .

زاويتان متجاورتان
angles, adjacent
زاويتان تشتركان في الرأس وضلع والضلعان الباقيان في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك .
فمثلاً الزاويتان $\angle PAB$ ، $\angle PAC$ في الشكل متجاورتان



زاويتان ثنائيتا الوجه متجاورتان
angles, adjacent dihedral
زاويتان ثنائيتا الوجه تشتركان في الحد وفي وجه يقع بينهما .


تثليث زاوية
angle, trisection of an
مسألة تقسيم الزاوية إلى ثلاث زوايا لها نفس المقياس الذى يساوى ثلث مقياس الزاوية الأصلية باستخدام المسطرة والفرجار فقط . وقد أثبت "وانتزل" Wantzel سنة ١٨٤٧ استحالة ذلك . ومع ذلك فيمكن تثليث أى زاوية بطرق مختلفة باستخدام المنقلة ، أو صدفة "باسكال" Limacon of Pascal ، أو المنحنى الصدفي لـ "نيكوديمس" conchoid of Nicodemus ، أو مثلث "ماكلورين" trisectrix of Maclaurin ، على سبيل المثال .

الزاوية الوحدة
angle, unit
زاوية مقياسها الوحدة .

رأس الزاوية
angle, vertex of an
نقطة بداية الشعاعين المكونين للزاوية .

رأس زاوية متعددة الأوج
angle, vertex of a polyhedral

لمستقيمين وقاطع لهما إذا كانتا في جهتين مختلفتين
من القاطع . في الشكل الزاويتان ١ ، ٤ ،
وكذلك الزاويتان ٢ ، ٣ داخليتان متبادلتان .



زاويتان متتامتان

angles, complementary

زاويتان مجموع مقياسيهما 90° .

زاويتان متعددتا الأوجه متطابقتان

angles, congruent polyhedral


زاويتان متعددتا الأوجه ، زوايا الوجه والزوايا
الثنائية الوجه في أحدهما تساوي نظيراتها في
الأخرى مأخوذة بنفس الترتيب .

زاويتان مترافقتان angles, conjugate

زاويتان مجموع قيمتيهما $360^\circ \pm$
أو مضاعفاتهما ، ويقال لكل منهما إنها ترافق

زاويتان متحالفتان angles, allied


الزاويتان الداخليتان اللتان تقعان في جهة
واحدة من مستقيم قاطع لمستقيمين . في الشكل
الزاويتان ١ ، ٢ متخالفتان وكذلك الزاويتان
٣ ، ٤ .



زاويتان خارجيتان متبادلتان

angles, alternate exterior

تسمى الزاويتان الخارجيتان متبادلتين بالنسبة
لمستقيمين وقاطع لهما إذا كانتا في جهتين مختلفتين
من القاطع . في الشكل الزاويتان ٥ ، ٨ ،
وكذلك الزاويتان ٦ ، ٧ خارجيتان متبادلتان .



زاويتان داخليتان متبادلتان

angles, alternate-interior

تسمى الزاويتان الداخليتان متبادلتين بالنسبة

معجم الرياضيات

angles, coterminal زوايا متاخمة
الزوايا التي إذا رسمت أو وضعت في وضع
قياسي يكون لها أيضاً نفس الضلع النهائي ،
مثل 30° ، 390° ، -330° .

زوايا الاتجاه (لخط مستقيم في الفراغ)
**angles, direction (for a straight line
in space)**


الزوايا الثلاث الموجبة التي يصنعها المستقيم
مع الاتجاهات الموجبة لمحاور الإحداثيات
المتعامدة .

angles, equal زوايا متساوية
زوايا لها نفس المقياس .

زوايا "أويلر"
angles, Euler's
زوايا ثلاث تختار عادة لتعيين اتجاهات
مجموعة س ، ص ، ع من محاور إحداثيات
متعامدة في الفراغ بالنسبة لمجموعة أخرى س' ،
ص' ، ع' من المحاور المتعامدة وهي :

الأخرى ، مثال ذلك $(30^\circ, 330^\circ)$ ،
 $(30^\circ, -390^\circ)$ ، $(30^\circ, -750^\circ)$.


angles, consecutive زوايا متتالية
إذا دار الشعاع وم حول وليولد الزاوية
٢ وب أولاً ، ثم الزوايا ب وح ، ح ود على
التوالي ، فإن الزوايا ٢ وب ، ب وح ، ح ود
تسمى زوايا متتالية .




زاويتان متناظرتان

angles, corresponding

تسمى الزاويتان متناظرتين بالنسبة لمستقيمين
وقاطع لهما ، إذا وقعتا في جهة واحدة من القاطع
وكانت إحداهما داخلية والأخرى خارجية . في
الشكل كل زوج من الزوايا $(1, 7)$ ، $(2, 8)$ ،
 $(3, 5)$ ، $(4, 6)$ زوج من زاويتين متناظرتين .



كل زاويتين لمضلع زوجي الأضلاع ، يقع نصف عدد أضلاعه على كل من جانبي الخط الواصل بين رأسيهما . فمثلاً في الشكل الرباعي P $ABCD$ الزاويتان P B C ، P A D متقابلتان وكذلك الزاويتان P A B ، P C D .



زاويتا قاعدة المثلث

angles of a triangle, base

زاويتا المثلث اللتان تشتركان في قاعدة المثلث
كضلع مشترك .

زوايا الأرباع
 زوايا الربع الأول أو الثانى أو الثالث
 أو الرابع فى المستوى .


زوايا ربعية angles, quadrantal
 الزوايا صفر، ٩٠°، ١٨٠°، ٢٧٠°
 (صفر، $\frac{\pi}{2}$ ، π ، $\frac{3\pi}{2}$ بالتقدير الدائري)

(١) الزاوية بين المحورين ع ، ع ،
 (٢) والزاوية بين محور س وخط تقاطع
 المستويين س ص ، س ص ،
 (٣) والزاوية بين خط التقاطع المذكور في (٢)
 ومحور س .

الزوايا المصنوعة بقاطع

angles made by a transversal

إذا قطع خط مستقيم (القاطع) مستقيمين
أو أكثر فإن الزوايا التي ضلع كل منها نصف
المستقيم القاطع ونصف مستقيم من المستقيمتين
المقطوعة تسمى الزوايا المصنوعة بالقاطع . في
الشكل الخط المستقيم ل يقطع المستقيمين م ، ن
والزوايا ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ الزوايا المصنوعة بالقاطع



زاویتان متقابلتان لمضلع

angles of a polygon, opposite


معجم الرياضيات

الثنائية الوجه في أحديهما تساوى نظيراتها في الأخرى مأخوذة بالترتيب المضاد .

زاويتان متقابلتان بالرأس =
زاويتان متقابلتان

angles, vertical = angles, vertically
opposite = angles, opposite

زاويتان أضلاعهما يشكلان زوجين من الأشعة المتضادة . وهما غير متجاورتين ومقياس كل منهما أقل من مقياس زاوية مستقيمة وتنشآن من تقاطع مستقيمين . ففي الشكل الزاويتان ١ ، ٢ متقابلتان كما أن الزاويتين ٣ ، ٤ ، متقابلتان كذلك .



أنجستروم
angstrom
وحدة طول موجة الضوء .


زاوى
angular
منسوب إلى الزاوية .

وجميع الزوايا التي تشترك مع أى منها في ضلعى الابتداء والانتهاء .

زاويتان متكاملتان

angles, supplementary

زاويتان مجموع مقياسيهما يساوى زاوية مستقيمة .



زاويتان ثنائيتا الوجه متساويتان

angles, two equal dihedral

زاويتان ثنائيتا الوجه زاويتاهما المستويتان متساويتان .

زاويتان متعددتا الأوجه متماثلتان

angles, two symmetric polyhedral

زاويتان متعددتا الأوجه زوايا الوجه والزوايا

<p>مقدار السرعة الزاوية</p> <p>angular speed</p> <p>(انظر : مقدار السرعة speed)</p>	<p>التسارع الزاوى</p> <p>angular acceleration</p> <p>معدل تغير السرعة الزاوية بالنسبة للزمن . فإذا كانت ω متجه السرعة الزاوية ، α متجه التسارع الزاوى فإن : $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$</p>
<p>السرعة الزاوية</p> <p>angular velocity</p> <p>إذا كان (r, θ) الإحداثيين القطبيين لنقطة P تتحرك في مستوى فإن سرعتها الزاوية بالنسبة للقطب متجه مقداره $\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt}$ واتجاهه عمودى على المستوى (أى فى اتجاه محور الدوران) .</p>	<p>(انظر : السرعة الزاوية angular velocity) .</p> <p>البعد الزاوى بين نقطتين</p> <p>angular distance between two points</p> <p>(انظر : البعد الظاهرى apparent distance) .</p>
<p>نسبة غير توافقية</p> <p>anharmonic ratio = cross ratio</p> <p>إذا كانت P, B, C, A أربع نقاط مختلفة على استقامة واحدة فإن النسبة غير التوافقية (P, B, C, A) تعرف على أنها خارج قسمة النسبة التى تقسم بها C القطعة PA والنسبة التى تقسم بها B القطعة PA . إذا كانت الإحداثيات السينية (أو الصادية) لأربع نقط هى s_1, s_2, s_3, s_4 فإن النسبة غير التوافقية تكون :</p> $\frac{(s_1 - s_3)(s_2 - s_4)}{(s_1 - s_4)(s_2 - s_3)}$	<p>كمية الحركة الزاوية</p> <p>angular momentum</p> <p>= الزخم الزاوى</p> <p>= moment of momentum</p> <p>إذا تحرك جسيم كتلته k بسرعة v فإن كمية حركته الزاوية بالنسبة لنقطة ثابتة تساوى حاصل الضرب الاتجاهى لمتجه الموضع r للجسيم بالنسبة إلى النقطة الثابتة ، ومتجه كمية حركته الخطية v ، أى أن كمية الحركة الزاوية للجسيم بالنسبة إلى النقطة الثابتة تساوى $r \times mv$.</p>

معجم الرياضيات

<p>الأقساط السنوية (التأمين) annual premiums = net annual premiums دفعات سنوية متساوية يدفعها المؤمن عليه عند بداية كل سنة من سنوات الاتفاق لتغطية تكاليف هذا الاتفاق وتحسبها الشركة طبقاً للافتراضات التالية : ١ - أن كل حامل الوثائق سيموتون طبقاً لجداول المعدلات القياسية للوفاة . ٢ - أن كل أموال شركة التأمين المستثمرة ستحقق أرباحاً طبقاً لسعر فائدة معين . ٣ - أن شركة التأمين ستسدد قيمة كل وثيقة عند نهاية مدة التأمين المحددة . ٤ - أن لا تفرض رسوم على مباشرة أعمال الشركة .</p>	<p>إذا كانت l_1, l_2, l_3, l_4 أربعة مستقيمات متلاقية في نقطة واحدة ، وكانت m_1, m_2, m_3, m_4 الترتيب فإن النسبة غير التوافقية لهذه المستقيمات هي :</p> $\frac{(m_1 - m_2)(m_3 - m_4)}{(m_1 - m_4)(m_2 - m_3)}$ <p>annihilator of a set مُعَدِّم فئَة الفصل (class) الذي يشمل فقط النوع المعين من الدوال التي تعدم الفئة ، بمعنى أن قيمة كل من هذه الدوال تساوى صفراً عند كل نقطة من نقط الفئة .</p>
<p>annual rent الإيجار السنوى الإيجار عندما يكون الدفع سنوياً .</p> <p>annual variation تغير سنوى التغير على مدار سنة كاملة .</p>	<p>annihilator, the المُعَدِّم المُعَدِّم لى لى فئة جزئية من فراغ اتجاهى سـ هو فئة كل المتجهات $v \in S^*$ (S^* الفراغ الاتجاهى المرافق للفراغ S) بحيث $v(S) = 0$ صفراً لكل $S \in S$.</p>
<p>صاحب معاش أو مرتب سنوى annuitant</p>	<p>annual سنوى صفة لما ينسب إلى السنة .</p>

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>annuity, certain سنهية مؤكدة</p> <p>سنهية ذات عدد محدد من الدفع ، كمقابل للسنهيية العمريية . (انظر : سنهية عمريية annuity, life) .</p>	<p>١ - المستفيد من الدفع (انظر : المستفيد beneficiary)</p> <p>٢ - الشخص الحي الذي يرتبط ببقائه دفع كل دفعه من الدفع العمريية .</p>
<p>السنهيية العمريية التامة</p> <p>annuity, complete</p> <p>= annuity, apportionate</p> <p>= annuity, whole life</p> <p>سنهية عمريية يدفع فيها قدر من المال يتناسب مع الفتره الجزئيية من تاريخ آخر دفعه قبل وفاة المستفيد حتى تاريخ وفاته . (انظر : سنهية عمريية annuity, life) .</p>	<p>دفع مجمدة</p> <p>annuities, consolidated = consols</p> <p>سندات لا ترد قيمتها بالكامل .</p> <p>السنهيية annuity</p> <p>مبلغ ثابت يدفع في أوقات متتاليية بشروط خاصة مدونة فينشأ عن ذلك سلسله من الدفَع يكون الدفع سنويًا وقد يكون فتريًا .</p>
<p>annuity, contingent سنهية مشروطة</p> <p>سنهية حياة تخضع دفعاتها لشروط معينة ، مثال ذلك أن يكون شخص ما (ليس بالضرورة المستفيد) على قيد الحياة .</p>	<p>القيمة التراكمية لسنهية</p> <p>annuity, accumulated value of an</p> <p>القيمة التراكمية لسنهية عند تاريخ محدد هي مجموع القيم المركبة لدفع السنهيية حتى ذلك التاريخ .</p>
<p>سنهية مستديمة</p> <p>annuity, continued (or continuous)</p>	<p>سنهية صك annuity bond</p> <p>(انظر : صك bond) .</p>

معجم الرياضيات

<p>سنة تبدأ فترة دفعها الأولى بعد مضي وقت محدد من الزمن .</p>	<p>(انظر : سنة مستديمة annuity, perpetual) .</p>
<p>annuity due سنة فورية سنة تدفع دفعاتها عند بداية كل فترة .</p>	<p>annuity contract عقد سنة اتفاقية مكتوبة تبين مقدار السنة وتكلفتها والشروط التي تدفع بموجبها .</p>
<p>annuity, forborne سنة محسوكة (وقفية بحتة) ١ - سنة سمح لدفعاتها بأن تتراكم لدى شركة التأمين لفترة محددة متفق عليها ويمكن تحويلها عند الاستحقاق إلى دفعات .</p>	<p>annuity, curtate سنة مقتضبة سنة عمرية لم يسدد فيها قدر من المال متناسب مع الفترة الجزئية من تاريخ آخر دفعة قبل وفاة المستفيد حتى تاريخ وفاته . (انظر : سنة عمرية annuity, life) .</p>
<p>٢ - إذا ما ساهمت مجموعة من الأفراد بمبلغ معين لغرض ما لفترة محددة متفق عليها وحول المبلغ المتراكم عند نهاية الفترة إلى سنة لكل من الباقين على قيد الحياة فإن السنة تسمى أيضاً سنة محسوكة .</p>	<p>annuity, decreasing سنة تناقصية سنة تنقص فيها كل دفعة عن سابقتها .</p>
<p>annuity, general سنة عامة سنة فترات الدفع فيها غير متطابقة مع التواريخ الدورية لاستحقاق الفائدة .</p>	<p>annuity, deferred سنة مؤجلة = annuity, intercepted</p>

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>سنة مستديمة</p> <p>annuity, perpetual = perpetuity</p> <p>سنة تستمر دفعاتها ما بقى المؤمنون على قيد الحياة دون تحديد مدة معينة .</p>	<p>سنة عاجلة : annuity, immediate</p> <p>سنة يبدأ أمدها بعد توقيع العقد مباشرة .</p>
<p>وثيقة { لسنة</p> <p>annuity policy</p> <p>بوليصة</p> <p>مصطلح يستخدم أحياناً بدلاً من عقد السنة</p> <p>annuity contract عندما تكون السنة غير مستديمة</p> <p>(انظر : عقد السنة annuity contract) .</p>	<p>سنة تزايدية annuity, increasing</p> <p>سنة تزيد فيها كل دفعة عن سابقتها .</p>
<p>القيمة الحالية للدفعات السنوية</p> <p>annuity, present value of an</p> <p>= cash equivalent of an annuity</p> <p>مبلغ من المال إذا وضع بنفس سعر الدفعة السنوية ينتج جملة هذه الدفعات ، فإذا كانت الدفعة السنوية س ، وعدد الدفعات ، n ، وسعر الفائدة فإن القيمة الحالية ص تكون</p> $ص = س \frac{(1 + r)^n - 1}{r(1 + r)^n}$	<p>سنة المتبقى الأخير annuity, last survivor</p> <p>سنة تدفع حتى وفاة الشخص الأخير من بين شخصين أو أكثر .</p>
<p>سنة بالخلافة annuity, reversionary</p>	<p>سنة عمرية annuity, life</p> <p>سلسلة من دفع تسدد على فترات منتظمة مدى حياة شخص (سنة عمرية فردية single life annuity) أو مجموعة من الأشخاص (سنة عمرية مشتركة joint life annuity) .</p>
	<p>سنة عادية annuity, ordinary</p> <p>سنة تدفع دفعاتها في نهاية الفترات .</p>

معجم الرياضيات

<p>المدة بين تواريخ استحقاق الدفع المتتالية .</p>	<p>سنة تدفع طوال حياة شخص ما وتبدأ من لحظة موت شخص آخر ، مثال ذلك وثيقة التأمين على حياة زوج لصالح زوجته أو على حياة والد لصالح ولده .</p>
<p>أمد السنوية annuity, the term of an المدة من تاريخ بدء فترة الدفعة الأولى حتى تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة .</p>	<p>سنة بسيطة annuity, simple سنة تتطابق فترات الدفع فيها مع التواريخ الدورية لاستحقاق الفائدة .</p>
<p>سنة جماعية annuity, tontine سنة تشتريها مجموعة من الأفراد لصالح من يسقون على قيد الحياة منهم ، أى يوزع ما يستحقه كل مشارك يتوفى على الآخرين وبذلك يحصل آخر من يبقى على قيد الحياة على السنة بأكملها طوال بقية عمره .</p>	<p>سنة مؤقتة annuity, temporary سنة تدفعها شركة التأمين لفترة معينة من السنين ، أو حتى وفاة المستفيد أيها أقرب .</p>
<p>حلقى annular كل ما يتنسب إلى الحلقة الدائرية .</p>	<p>قيمة السنوية annuity, the amount of an القيمة التراكمية عند نهاية أمد السنوية .</p>
<p>حلقة دائرية annulus المنطقة المحصورة بين دائرتين متحدتي المركز وفي مستو واحد . ومساحتها تساوى ط (نق^٢ - نق^٢) ، حيث نق_١ نصف قطر</p>	<p>فترة الدفعة لسنوية annuity, the payment interval of an</p>

مجمع اللغة العربية - القاهرة


في النسبة P : B يسمى P المقدم ويسمى B التالى . كذلك في الكسر $\frac{P}{B}$ يسمى البسط P المقدم ويسمى المقام B التالى .
ففى النسبة $\frac{2}{3}$ يكون 2 هو المقدم و 3 هو التالى .

قبل الظهر (ante-meridien (A.M)
من الساعة صفر إلى ما قبل الثانية عشرة ظهراً .

تقوس تضادى anticlastic curvature
يكون التقوس تضادياً عند نقطة من نقط سطح إذا وقعت نقط السطح المجاورة لهذه النقطة فى جهتين مختلفتين من المستوى المماس للسطح عند هذه النقطة .

سطح تضادى عند نقطة ما
anticlastic surface at a point
يقال لسطح أنه تضادى عند نقطة ما إذا كان السطح يقع على جانبي المستوى المماس للسطح عند هذه النقطة .

الدائرة الكبرى ، نق ، نصف قطر الدائرة الصغرى .




في السنة (سنوياً)
annum, per
مرة كل سنة .

المُقَدِّم والتالى (فى المنطق)
antecedent and consequent (in logic)
إذا كان P ، B تقريرين بسيطين ففى التقرير المركب « إذا كان P فإن B » يسمى P المقدم أو الفرض hypothesis بينما يسمى B التالى أو النتيجة conclusion . فى التقرير المركب : « إذا كنت عربياً فأنت شاعر » يكون التقرير البسيط « أنت عربى » هو المقدم ، ويكون التقرير البسيط « أنت شاعر » هو التالى .

المقدم والتالى (فى النسبة)
antecedent and consequent (in ratio)

antilogarithm . مقابل اللوغارتم
العدد الذي لوغاريتمه بالنسبة للأساس هو
العدد المعطى .
فإذا كان لوغ $p = s$ فإن s هو العدد المقابل
للوغاريتم p .

مستقيمان متضادا التوازي
anti-parallel lines .
مستقيمان يصنعان مع مستقيمين معلومين
آخرين زوايا متساوية إذا أخذت بترتيب
عكسي . ففي الشكل المستقيمان p و h ،
متضادا التوازي بالنسبة للمستقيمين b و h ،
وذلك حيث أن
 $\angle b = \angle h = \angle h = \angle s$ ،
 $\angle p = \angle s = \angle b = \angle h$.



antipodal points نهايتا القطر
نقطتا نهايتي قطر في كرة .

ضد اتجاه دوران عقارب الساعة
anticlockwise = (counterclockwise)
(انظر : counterclockwise) .

مقابل مشتقة دالة
antiderivative of a function
= primitive of a function
= indefinite integral of a function
يقال لدالة $d(s)$ أنها مقابل مشتقة للدالة
 $r(s)$ إذا كانت $d(s)$ قابلة للتفاضل
وكانت مشتقتها هي $r(s)$ ، أي أن
 $d(s) = r(s)$.

الدوال الزائدية العكسية
anti-hyperbolic functions
(انظر : inverse hyperbolic functions) .

ضد التشاكل التَّقابليّ
anti-isomorphism
راسم أحادي ϕ من زمرة S إلى زمرة S'
بحيث $\phi(p) \phi(q) = \phi(pq)$ لكل p, q ،
 $\exists s$.
(انظر : تشاكل تَقَابُلِي isomorphism) .

<p>aperiodic لادورى</p> <p>تعبير يعنى عدم وقوع الحدث دورياً . أى أن الفترات الزمنية بين لحظات وقوع الحدث غير متساوية .</p>	<p>الدائرة الوسيطة للتعاكس</p> <p>antisimilitude, circle of</p> <p>= mid circle</p> <p>الدائرة التى تستخدم لمبادئة دائرتين معطاتين بالتعاكس ، ويسمى مركزها مركز التعاكس ونصف قطرها نصف قطر التعاكس .</p>
<p>حدث متواتر لادورى</p> <p>aperiodic recurrent event</p> <p>حدث يتكرر وقوعه بصفة لادورية .</p>	<p>إثنادى تخالفى التماثل</p> <p>anti-symmetric-dyadic</p> <p>(انظر : dyad) .</p>
<p>apex قمة</p> <p>أعلى نقطة بالنسبة إلى خط ما أو مستوي ما . فمثلاً قمة المثلث هي رأسه المقابل لضلعه المتخذ كقاعدة له ، وقمة المخروط هي رأسه .</p>	<p>علاقة تخالفية (فى الجبر)</p> <p>anti-symmetric relation (in algebra)</p> <p>العلاقة \sim على الفئة S تكون تخالفية إذا كان</p> $a \sim b \Rightarrow b \sim a$ <p>حيث $a, b \in S$.</p>
<p>aphelion نقطة ذنب كوكب سيار</p> <p>أبعد نقطة عن الشمس فى فلك كوكب سيار .</p>	
<p>APL إيه بى إل</p> <p>إحدى لغات برمجة الحاسب يتكون اسمها من الحروف البادئة لألفاظ العبارة :</p> <p>a programming language</p>	<p>الدوال المثلثية العكسية</p> <p>anti-trigonometric functions</p> <p>(انظر : inverse trigonometric functions) (وأيضاً arc trigonometric functions) .</p>

مسألة "أبولونيوس"

Apollonius' problem

عملية رسم دائرة تمس ثلاث دوائر معلومة .

كرة "أبولونيوس"

Apollonius, sphere of

الكرة الناشئة عن دوران دائرة أبولونيوس
حول الخط المستقيم المار بالنقطتين الثابتين
(انظر : دائرة أبولونيوس Apollonius'circle) .

أى أنها المحل الهندسى لنقطة تتحرك فى الفراغ بحيث تكون النسبة بين بعدىها عن نقطتين ثابتتين فى الفراغ تساوى نسبة ثابتة . فإذا كانت ب ، ح نقطتين ثابتتين فى الفراغ ، م نقطة متحركة فى الفراغ بحيث أن

م ب : م ح = ١ : ك (ك ثابت) فإن المحل
الهندسى للنقطة م يكون كرة قطرها $\overline{وه}$
بحيث :

ب : ي : ح = ب هـ : هـ ح = ا : ك .

نظرية "أبولونيوس"

Apollonius' theorem

نظرية تنص على أن مجموع المربعين المنشأين
على أي ضلعين في المثلث يساوي ضعف المربع
المنشأ على المستقيم المتوسط المنصف للضلع

apogee

الأوج

النقطة في مسار جسم (نجم أو كوكب أو قمر صناعي) يدور حول الأرض حركة دورانية فعلية أو ظاهرية يكون عندها الجسم في أقصى بعد له عن الأرض .

Apollonius « أبولونيوس »


عالم رياضيات إغريقى ولد بمدينة برجا Perga (٢٦٥-٢٠٠ قبل الميلاد) وقد برع فى الهندسة واكتشف العديد من خواص القطاعات المخروطية .

دائرة " أبولونيوس " Apollonius' circle

المحل الهندسى لنقطة تتحرك فى مستوي بحيث تكون النسبة بين بعدها عن نقطتين ثابتتين فى المستوى ثابتة .

فإذا كانت b ، ح نقطتين ثابتين في
مستوى ، m نقطة متحركة فيه بحيث أن

م ب : م ح = ١ : ك (ك ثابت) فإن المحل الهندسى للنقطة م يكون دائرة قطرها هـ بحيث
 ب هـ : هـ ح = ب هـ : هـ ح = ١ : ك .



إذا حدثت حادثة n من المرات ولم تحدث m من المرات في عدد $n+m$ من المحاولات ، فإن احتمال حدوثها في المحاولة التالية يساوي

$$\frac{n}{n+m}$$


ويفترض في تعيين الاحتمال الاستدلالي (الاحتمال التجريبي) أنه لا يوجد لدينا أية معلومات متعلقة باحتمال حدوث الحادثة سوى تلك المعلومات المستقاة من المحاولات السابقة . فمثلاً احتمال أن يعيش رجل خلال عام ما يكون احتمالاً استدلالياً عندما يبنى حسابه على الملاحظات السابقة التي تم تسجيلها في جداول الوفيات .

وزن صيدلي apothecaries'weight
نظام أوزان يستعمله الصيادلة .

عائد المضلع المنتظم
apothem (of a regular polygon)
نصف قطر الدائرة الداخلة للمضلع المنتظم .

الثالث مضافاً إليه ضعف المربع المنشأ على نصف هذا المضلع . فإذا كانت r منتصف المضلع BC في المثلث PBC فإن :

$$P^2 \cdot BC^2 + r^2 \cdot BC^2 = P^2 \cdot PC^2 + r^2 \cdot PC^2$$



استدلالي a posteriori
قائم على دراسة الوقائع المتفرقة والحالات الخاصة بغية استخلاص المبادئ العامة منها .

لمعرفة بالاستدلال
a posteriori knowledge
= المعرفة بالتجربة
= empirical knowledge
المعرفة المستقاة من الاستدلال أو من التجربة .

احتمال استدلال
a posteriori probability
= احتمال تجريبي
= empirical probability

الوقت الشمسى الظاهرى

apparent solar time

الوقت الذى تحدده المزولة (الساعة الشمسية) باعتبار أن اليوم أربع وعشرون ساعة . ويساوى ساعة زاوية (hour angle) الشمس الظاهرية أو ساعة زاوية الشمس الحقيقية مضافاً إليها اثنتا عشرة ساعة .

والساعات هنا لا تتساوى تماماً نظراً لميل محور الأرض على مستوى الدائرة الكسوفية (مستوى مدار الأرض) ولأن مدار الأرض قطع ناقص .

حزمة برامج تطبيق

application package

برامج معدة للاستخدام فى تطبيق محدد .

برنامج تطبيق **application program**

برنامج معد للاستخدام فى تطبيق محدد .

الرياضيات التطبيقية

applied mathematics

فروع الرياضيات التى تعنى بدراسة الموضوعات الطبيعية والحيوية والاجتماعية .

المحيط الظاهرى لجسم على مستوٍ

apparent circumference of a solid onto a plane

محيط مسقط الجسم على المستوى .

البعد الظاهرى **apparent distance**

= البعد الزاوى بين نقطتين

= **angular distance between two**

points

مقياس الزاوية التى ضلعاها المستقيمان المرسومان من نقطة الرصد (نقطة الإسناد) مارين بالنقطتين .

اتزان ظاهرى **apparent equilibrium**

= اتزان كاذب

= **false equilibrium**

= **pseudo equilibrium**

اتزان غير حقيقى لمجموعة ما ، وينشأ عن تدخل بعض العوامل التى تمنع المجموعة من الوصول إلى إتزان حقيقى .

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>(انظر : سنهية annuity) .</p>	<p>وتشتمل على ميكانيكا الأجسام الجاسئة rigid bodies والأجسام القابلة للتشكل</p>
<p>approach (١) اقتراب (٢) نهج ١ - الوصول إلى القيمة أو المكان تدريجياً . ٢ - أسلوب للمعالجة الرياضية .</p>	<p>deformable bodies (ونظرية المرونة theory of elasticity ونظرية المطاوعة theory of plasticity وديناميكا الموائع hydrodynamics) .</p>
<p>يقترّب من نهاية ما</p>	<p>والنظرية الكهرومغناطيسية ، النظرية النسبية ، نظرية الجهد ، الديناميكا الحرارية ، الرياضيات الحيوية ، والاحتمالات والإحصاء .</p>
<p>approach a limit (انظر : نهاية متغير limit of a variable) .</p>	<p>ومن ثم فهي تعنى باستخدام المبادئ الرياضية كأساس للدراسة في مجالات الفيزياء والكيمياء ، والعلوم الهندسية ، والعلوم الحيوية ، والدراسات الاجتماعية . . . ، إلخ .</p>
<p>approximate تقريبي صفة لما يكون تقريبياً وليس صحيحاً بالضبط . فمثلاً ١,٤ قيمة تقريبية للجذر التربيعي للعدد ٢ ($1,4 \approx \sqrt{2}$) .</p>	<p>وبصورة عامة ، فالرياضيات التطبيقية هي بناء رياضي يستخدم مفاهيم الزمن وما يتعلق بمجال الدراسة من مفاهيم أخرى ، وذلك بالإضافة إلى المفاهيم الرياضية المجردة للفراغ والعدد .</p>
<p>approximate, to يقرب (١) يجري عملية حسابية للحصول على قيمة قريبة من القيمة الصحيحة . فمثلاً يقرب شخص الجذر التربيعي للعدد ٢ بالعدد ١,٤ الذي مربعه ١,٩٦ .</p>	<p>صدمة مسلطة applied shock إثارة تحدث حركة صدمية . سنهية عمرية تامة</p>
<p>(٢) يجري عمليات حسابية متتالية</p>	<p>apportionable annuity</p>

معجم الرياضيات

<p>نتيجة قريبة من النتيجة الصحيحة ولكنها ليست النتيجة الصحيحة بالضبط .</p>	<p>للحصول على قيم تقترب تدريجياً من القيمة الصحيحة . فمثلاً يقرب شخص الجذر التربيعي للعدد ٢ عندما يجد على التوالى الأعداد ١,٤ ، ١,٤١ ، ١,٤١٤ ، ١,٤١٤٠ ، التى تقترب مربعاتها تدريجياً من العدد ٢ .</p>
<p>جذر تقريبي approximate root جذر قريب من الجذر الصحيح ولكنه ليس الجذر الصحيح بالضبط . مثال ذلك ١,٤ جذر تربيعى تقريبي للعدد ٢ .</p>	<p>إجابة تقريبية approximate answer إجابة قريبة من الإجابة الصحيحة ولكنها ليست الإجابة الصحيحة بالضبط .</p>
<p>قيمة تقريبية approximate value قيمة قريبة من القيمة الصحيحة ولكنها ليست القيمة الصحيحة بالضبط .</p>	<p>قيمة عشرية تقريبية لعدد نسبي approximate decimal value of a rational number (انظر : عدد نسبي rational number) .</p>
<p>تقريب approximation (١) نتيجة ليست صحيحة تماماً ، ولكنها قريبة من القيمة الصحيحة بدرجة تكفى لغرض محدد أو لاستخدام معين . (٢) عملية إيجاد نتيجة تقريبية .</p>	<p>مسافة تقريبية = بعد تقريبي approximate distance مسافة قريبة من المسافة الصحيحة ولكنها ليست المسافة الصحيحة بالضبط .</p>
<p>التقريب بالتفاضلات approximation by differentials</p>	<p>نتيجة تقريبية approximate result</p>


apriori	قَبْلِي	إذا كانت ص = د (س) فإن :
تعبير للدلالة على أمر مفروض أو مسلم به مسبقاً .		د (س) س يؤخذ كتقريب للتغير Δ ص في ص المناظر للتغير Δ س = د س في س ، أى أن Δ ص ≈ د ص = د (س) د س . فمثلاً التغير التقريبي في مساحة دائرة نصف قطرها ٢ سم عندما يزداد نصف قطرها بمقدار ٠,١ سم يحسب كالتالى :
apriori fact	حقيقة قَبْلِيَّة	مساحة الدائرة ح = ط نق ^٢
حقيقة مسلم بها (axiomatic fact) .	أو حقيقة ذاتية الوضوح (self-evident fact) .	وبالتالى فإن ح = ٢ ط نق × نق = ٢ ط × ٢ × ٠,١ = ٠,٤ ط سم ^٢
apriori knowledge	معرفة قبلية	وهذا يمثل الزيادة التقريبية في مساحة الدائرة . أما الزيادة الفعلية في مساحة الدائرة فتساوى Δ ح = ٠,٤٠١ ط سم ^٢ . ويلاحظ أن الفرق بين الزيادة الفعلية والتقريبية في هذه الحالة يساوى ٠,٠٠١ ط سم ^٢ .
		تقرّيات متتالية
apriori probability	احتمال قبلى	approximations, successive
= mathematical probability	= احتمال رياضى	(١) خطوات التقريب المتتالية التى تستخدم للوصول إلى النتيجة المطلوبة .
إذا كانت ١ , ٢ , ٣ , ٤ أحداثاً متنافية فإن احتمال كل من هذه الأحداث المؤسس فقط على المعلومات المتاحة قبل إجراء التجربة يسمى		(٢) القيم التقريبية المتتالية التى نحصل عليها من خطوات التقريب . مثال ذلك ١,٧ , ١,٧٣ , ١,٧٣٢ , ١,٧٣٢٠٥ , تقرّيات متتالية للجذر التربيعى للعدد ٣ .

معجم الرياضيات

<p>apsidal distance البعد القبوى</p> <p>بعد القبا عن مركز القوة .</p>	<p>احتمالاً قبلياً للحدث . فمثلاً إذا سحبت كرة واحدة من كيس يحتوى كرتين بيضاوين وثلاث كرات حمراء وكان p هو الحدث « الكرة المسحوبة تكون البيضاء » ، وكان p هو الحدث « الكرة المسحوبة تكون حمراء » فإن الاحتمال القبلى للحدث p يساوى $\frac{2}{5}$ والاحتمال القبلى للحدث p يساوى $\frac{3}{5}$.</p>
<p>arabic numerals الأرقام العربية</p> <p>أخذ العرب عن الهنود مجموعتين من الأرقام ، أولاهما تنحدر منها الأشكال المشرقية لهذه الأرقام وهى :</p> <p>٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩</p> <p>وثانيهما تنحدر منها الأشكال الافرنجية لهذه الأرقام وهى : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 . وقد انتشرت الأولى فى المشرق الإسلامى وانتشرت الثانية فى المغرب ، ومنه انتقلت إلى أوروبا حيث سميت بالأرقام العربية . أما العرب فكانوا يسمون المجموعتين الأرقام الهندية .</p>	<p>apriori reasoning تعليل قبلى</p> <p>تعليل يستخدم التعاريف والمسلمات والمبادئ للوصول إلى الاستنتاجات .</p>
<p>arbitrary اختياري</p> <p>ما يختار دون التقيد بأى قيود .</p>	<p>apse قَبَا (آبس)</p> <p>كل نقطة على مسار جسيم يتحرك فى مستوٍ تحت تأثير قوة مركزية ويكون اتجاه حركة الجسيم عندها عمودياً على متجه موضعه بالنسبة لمركز القوة .</p>
<p>arbitrary assumption فرض اختياري</p> <p>فرض يوضع دون التقيد بأن يكون متآلفاً</p>	<p>الزاوية القَبَوِيَّة</p> <p>= الزاوية الآبسية apsidal angle</p> <p>الزاوية التى ضلعاها متجها الموضع لقبوين متتالين .</p>

<p>ملف مجزأ اختيارياً arbitrary sectioned file ملف نظم بطريقة بسيطة تسمح بإضافة أو حذف أجزاء منه آلياً .</p>	<p>مع قوانين الطبيعة أو المبادئ الرياضية المعلومة .</p>
<p>قوس arc جزء من منحنٍ يتكون من نقطتين على المنحنى وفئة نقط المنحنى الواقعة بينهما ، النقطتان يقال لهما نقطتا نهايتي القوس .</p>	<p>ثابت اختياري arbitrary constant ثابت يمكن أن يأخذ قيمةً عديدة مختلفة مثل ثابت التكامل .</p>
<p>قوس قاطع التمام arc-cosecant قوس قاطع التمام س ، حيث $س \leq 1$ ، هي أى زاوية قاطع التمام لقياسها يساوى س ، وتكتب قتا⁻¹ س .</p>	<p>دالة اختيارية (فى حل المعادلات التفاضلية الجزئية) arbitrary function (in the solution of partial differential equations) دالة غير محددة ، ولكن قد تكون من نوع معين ، فى عبارة تحقق المعادلة التفاضلية محل الدراسة . فمثلاً $ع = س د (ص)$ هى حل للمعادلة $س \frac{كع}{كس} - ع = ص$ صفراً إذا كانت د أى دالة قابلة للتفاضل .</p>
<p>فمثلاً : قتا⁻¹ 2 = $\frac{\pi}{6}$ أو $\frac{5\pi}{6}$ أو ... وبصورة عامة $س = (1-)^{\pi}$ حيث $\frac{\pi}{6}$ حيث $س$ عدد صحيح . والدالة قتا⁻¹ س هى الدالة العكسية لدالة قاطع التمام . وتعرف فقط للجزء الأساسى من</p>	<p>وسيط (بارامتر) اختياري arbitrary parameter وسيط يوضع للمساعدة فى حل مسألة ، وليس من الضروري أن تتحكم فى اختياره ظروف المسألة موضع الدراسة .</p>

منحنى العلاقة قتا⁻¹س ، وهو الجزء المرسوم متصلاً في الشكل :



$$\text{مدى قتا}^{-1}\text{س} = (\text{صفر} , \frac{\pi}{2}] \cup [\frac{\pi}{2} - \pi , \pi)$$


قوس جيب التمام arc-cosine
قوس جيب التمام س ، حيث $|س| \leq 1$ ،
هى أى زاوية جيب تمام قياسها س ، وتكتب
جتا⁻¹س . فمثلاً :

$$\text{جتا}^{-1}\frac{1}{2} = \frac{\pi}{3} \text{ أو } \frac{5\pi}{3} \text{ أو } \dots$$

وبصورة عامة $\frac{\pi}{3} \pm 2\pi$ حيث $\frac{\pi}{3}$ عدد

صحيح .

والدالة ص = جتا⁻¹س هى الدالة العكسية
لدالة جيب التمام . وتعرف فقط للجزء
الأساسى من منحنى العلاقة جتا⁻¹س ، وهو
الجزء المرسوم متصلاً في الشكل :



$$\text{مدى جتا}^{-1}\text{س} = [\text{صفر} , \pi)$$


قوس ظل التمام arc-cotangent
قوس ظل التمام س هى أى زاوية ظل تمام
قياسها س ، وتكتب ظلنا⁻¹س .

$$\text{فمثلاً : ظلنا}^{-1}1 = \frac{\pi}{4} \text{ أو } \frac{5\pi}{4} \text{ أو } \dots$$

وبصورة عامة $\frac{\pi}{4} + 2\pi$ حيث $\frac{\pi}{4}$ عدد صحيح

مجمع اللغة العربية - القاهرة

الدالة ص = قتا⁻¹ س هي الدالة العكسية لدالة قاطع التمام الزائدي . هذه الدالة معرفة لقيم س بحيث س \neq صفراً ، ويبين الشكل المنحنى الخاص بها .



مدى قتا⁻¹ س = ح - { صفر } .


قوس جيب التمام الزائدي

arc-hyperbolic cosine

= inverse hyperbolic cosine

قوس جيب التمام الزائدي س ، حيث $س \geq 1$ ، هو أى عدد حقيقى جيب تمامه الزائدي س ، وتكتب جتا⁻¹ س ، وتساوى لو $\{س \pm \sqrt{س^2 - 1}\}$. الدالة ص = جتا⁻¹ س هي الدالة العكسية لدالة جيب التمام الزائدي وتعرف فقط للجزء الأساسى من منحنى العلاقة جتا⁻¹ س (أى منحنى لو $\{س \pm \sqrt{س^2 - 1}\}$) ، وهو الجزء

الدالة ص = ظتا⁻¹ س هي الدالة العكسية لدالة ظل التمام ، وتعرف فقط للجزء الأساسى من منحنى العلاقة ظتا⁻¹ س ، وهو الجزء المرسوم متصلاً في الشكل .



مدى ظتا⁻¹ س = (صفر ، ط) .

قوس قاطع التمام الزائدي

arc-hyperbolic cosecant

= inverse hyperbolic cosecant

قوس قاطع التمام الزائدي س ، حيث $س \neq$ صفراً ، هو العدد الحقيقى الذى قاطع تمامه الزائدي س ، وتكتب قتا⁻¹ س ، وتساوى :

$$\left\{ \frac{\sqrt{س^2 + 1}}{س} \right\} \text{ لو }$$

قوس القاطع الزائدى

arc-hyperbolic secant

= inverse hyperbolic secant


قوس القاطع الزائدى s ، حيث
صفر $> s \geq 1$ ، هو أى عدد حقيقى قاطعه
الزائدى s ، وتكتب قاز⁻¹ s ، وتساوى :

$$\text{لو} \left[\frac{\sqrt{s^2 - 1}}{s} \right]$$

الدالة $v = \text{قاز}^{-1} s$ هي الدالة العكسية
لدالة القاطع الزائدى ، وتعرف فقط للجزء
الأساسى من منحنى العلاقة قاز⁻¹ s

$$(\text{أى منحنى لو} \left[\frac{\sqrt{s^2 - 1}}{s} \right])$$

وهو الجزء المرسوم متصلاً فى الشكل .




مدى قاز⁻¹ $s = [\text{صفر} , \infty]$.

قوس الجيب الزائدى

arc-hyperbolic sine

= inverse hyperbolic sine

المرسوم متصلاً فى الشكل .



مدى جتاز⁻¹ $s = [\text{صفر} , \infty]$.


قوس ظل التمام الزائدى

arc-hyperbolic cotangent

= inverse hyperbolic cotangent


قوس ظل التمام الزائدى s ، حيث
 $|s| < 1$ ، هو العدد الحقيقى الذى ظل تمامه
الزائدى s ، وتكتب ظتاز⁻¹ s ، وتساوى
 $\frac{1}{2} \text{ لو} \left\{ \frac{1+s}{1-s} \right\}$.

الدالة $v = \text{ظتاز}^{-1} s$ هي الدالة العكسية لدالة
ظل التمام الزائدى ، ويبين الشكل المنحنى الخاص
بها .



مدى ظتاز⁻¹ $s = \text{ح} - \{ \text{صفر} \}$.

لدالة الظل الزائدى ، وبين الشكل المنحنى الخاص بها .



مدى ظاز⁻س = ح

طول قوس
الطول مقيساً بوحدات الطول الخطية لقوس
من منحنى .

تفاضلية (أو عنصر) طول القوس
arc length, differential (or element) of
تعبير بقرب طول المنحنى بين نقطتين
متقاربتين عليه . فمثلاً ، تفاضلية طول القوس
هى :


$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

$$= \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

ومن الشكل نرى أن dL تقريب لطول

قوس الجيب الزائدى س ، حيث
س $\in \mathbb{R}$ ، هو العدد الحقيقى الذى جيبه
الزائدى س ، وتكتب طاز⁻س ، وتساوى
لو $[س + \sqrt{1 + س^2}]$.

الدالة ص = طاز⁻س هى الدالة العكسية
لدالة الجيب الزائدى ومجال هذه الدالة هو فئة
جميع الأعداد الحقيقية ، وبين الشكل المنحنى
الخاص بها .



مدى حاز⁻س = ح



قوس الظل الزائدى
arc-hyperbolic tangent
= inverse hyperbolic tangent

قوس الظل الزائدى س ، حيث
 $|س| < 1$ ، هو العدد الحقيقى الذى ظله
الزائدى س ، وتكتب طاز⁻س ، وتساوى

$$\frac{1}{2} \ln \left[\frac{1 + س}{1 - س} \right]$$

الدالة ص = طاز⁻س هى الدالة العكسية


للدائرة (انظر الشكل) .



قوس أكبر في الدائرة

arc of a circle, major

قوس في الدائرة أكبر من نصف محيطها .
القوس \widehat{AB} في الشكل .



القوس Δ ل بين نقطتين .

وبدلالة الإحداثيات القطبية يكون :

$$s \Delta = \sqrt{\left(\frac{r \Delta}{\theta \Delta} \right)^2 + r^2}$$


وإذا أعطيت معادلة المنحنى في الفراغ على

الصورة الوسيطة :

$$s = s(r), \quad v = v(r)$$

$$e = e(r) \quad \text{فإن} \quad \Delta = \Delta(r)$$

$$r \Delta = \sqrt{\left(\frac{e \Delta}{r \Delta} \right)^2 + \left(\frac{v \Delta}{r \Delta} \right)^2 + \left(\frac{s \Delta}{r \Delta} \right)^2}$$



arc of a circle


قوس الدائرة

جزء من الدائرة يتكون من نقطتين على

الدائرة وفئة نقط الدائرة الواقعة بينهما ، وتسمى

النقطتان نهايتي القوس . \widehat{AB} ، \widehat{CD} قوسان

المرسوم متصلًا في الشكل .



$$\text{مدى قاس} = [\text{صفر}, \frac{\pi}{4}] \cup [\pi - \frac{\pi}{4}, \pi)$$

قوس بسيط arc, simple

إذا كانت $[a, b]$ فترة مغلقة ، فإن فئة نقط الفراغ ، التي هي صورة الفترة $[a, b]$ براسم أحادي متصل ، تسمى قوساً بسيطاً . وبالتالي فإن الدائرة ليست قوساً بسيطاً ، لأن كل راسم متصل لفترة مغلقة فوق الدائرة لابد أن يرسم نقطتين مختلفتين على الأقل من نقط الفترة إلى نفس النقطة على الدائرة .

قوس الجيب arc-sine

قوس الجيب s ، حيث $|s| \leq 1$ ، هي أي زاوية جيب قياسها s ، وتكتب حاس .
فمثلاً : $\text{حاس}^{-1} = \frac{1}{2}$ أو $\frac{\pi}{6}$ أو $\frac{5\pi}{6}$ أو ...


$$\text{وبصورة عامة حاس}^{-1} = \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} + (1 - \frac{\pi}{6})$$

قوس أصغر في الدائرة

arc of a circle, minor

= short arc of a circle

قوس في الدائرة أقل من نصف محيطها .
القوس \widehat{PQ} في الشكل .



قوس القاطع arc-secant


قوس القاطع s ، حيث $|s| \geq 1$ ، هي أي زاوية قاطع قياسها s ، وتكتب $\text{قاس}^{-1} s$.

$$\text{فمثلاً قاس}^{-1} = \frac{\pi}{3} \text{ أو } \frac{5\pi}{3} \text{ أو } \dots$$

وبصورة عامة $\text{قاس}^{-1} = \frac{\pi}{3} \pm 2\pi$ ، حيث n عدد صحيح .

الدالة $\text{ص} = \text{قاس}^{-1} s$ هي الدالة العكسية لدالة القاطع ، وتعرف فقط للجزء الأساسي من منحنى العلاقة $\text{قاس}^{-1} s$ ، وهو الجزء

منحنى العلاقة طا⁻¹س ، وهو الجزء المرسوم



نهاية النسبة بين طول قوس وطول وتره

arc to its chord, limit of the ratio of an

نهاية هذه النسبة عندما يؤول طول القوس
(أو الوتر) إلى صفر .

إذا كان المنحنى دائرة فإن هذه النهاية
تساوى ١ ، وهذه النهاية تساوى أيضاً ١
للمنحنيات ذات الأطوال المحدودة .


مجسمات " أرشميدس "

Archimedean solids

المجسمات التي أوجه كل واحد منها مضلعات
منتظمة (ليست كلها بالضرورة متطابقة)

حيث ن عدد صحيح .

الدالة ص = حا⁻¹س هي الدالة العكسية
لدالة الجيب وتعرف فقط للجزء الأساسي من
منحنى العلاقة حا⁻¹س ، وهو الجزء المرسوم
متصلاً في الشكل .



مدى حا⁻¹س = [$-\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2}$]

قوس الظل arc-tangent

قوس الظل س هي أى زاوية ظل قياسها
س ، وتكتب طا⁻¹س . فمثلاً :
طا⁻¹١ = $\frac{\pi}{4}$ أو $\frac{\pi}{4}$ أو ...

وبصورة عامة أى زاوية رط + $\frac{\pi}{4}$ ،

حيث ر عدد صحيح .

الدالة ص = طا⁻¹س هي الدالة العكسية
لدالة الظل ، وتعرف فقط للجزء الأساسي من

فئة من فراغ طوبولوجى يوجد لكل نقطتين P ، Q من نقطتها مسار يصل P ، Q ويقع بأكمله في هذه الفئة .

فراغ مترابط مسارياً

arcwise connected space

فراغ طوبولوجى يوجد لكل نقطتين P ، Q من نقطته مسار يصل P ، Q ويقع بأكمله في هذا الفراغ .

الآر
Area وحدة مساحة مقدارها مائة متر مربع .

مساحة
area مقدار ما في السطح من الوحدات المربعة (كالتر المربع) وأجزائها أو غير المربعة المتفق عليها أساساً للتقدير كالفدان .

المساحة بين منحنين مستويين

area between two plane curves

القيمة المطلقة للفرق بين المساحة تحت أحد المنحنين والمساحة تحت المنحنى الآخر .

وزواياه الثنائية منعكسة ويطابق بعضها بعضاً .

مبدأ " أرشميدس "

archimedes principle


إذا كان P ، Q عددين حقيقيين موجبين وكان $P > Q$ فإنه يوجد عدد صحيح موجب n بحيث يكون $nP < Q$.

حلزون " أرشميدس "

Archimedes, spiral of

منحنى مستو يمثل المحل الهندسى لنقطة تتحرك بسرعة منتظمة ع (ابتداء من نقطة ثابتة) على امتداد خط مستقيم يدور في مستوى بسرعة زاوية منتظمة ω .

ومعادلته في نظام الإحداثيات القطبية المستوية هي $r = P\theta$ ($P < \infty$ ، صفى) ، حيث $\frac{C}{\omega} = P$ الشكل يبين جزءاً من المنحنى .




فئة مترابطة مسارياً

arcwise connected set

المساحة الجانبية للمخروط

area of a cone, lateral

مساحة السطح المكون من رواسم المخروط . للمخروط الدائري القائم هذه المساحة تساوى ط نول ، حيث نول نصف قطر قاعدة المخروط ، ل ارتفاعه الجانبى .



مساحة سطح منحن

area of a curved surface

أولاً : السطح المنحنى المغلق (كالكرة مثلاً) : نهاية مجموع مساحات أوجه متعدد سطوح مغلف للسطح عندما تؤول أطوال أحرف متعدد السطوح إلى الصفر .


ثانياً : السطح المنحنى غير المغلق (كالطاقية الكروية مثلاً) : نهاية مجموع مساحات فئة المضلعات التى تغطى السطح والتى يكون كل منها مماساً له عندما يؤول طول كل حرف من حروفها إلى الصفر .

(انظر : مُغلف envelope) .

فمثلاً ، المساحة المحدودة بالمنحنين

ص = د (س) ، ص = ر (س) والمستقيمين ص = ب ، بحيث د (س) ≤ ر (س) لجميع قيم س التى تحقق ب > س > ب ، تساوى $\int_p^b [د (س) - ر (س)] د س$

$$= \int_p^b [د (س) - ر (س)] د س$$



مساحة الدائرة area of a circle


مساحة المنطقة التى يضمها محيط الدائرة ، وتساوى ط من المرات مربع نصف قطر الدائرة .

مساحة منحنٍ مستوٍ مغلق

area of a closed plane curve

عدد وحدات المساحة ، صحيحاً أو كسراً ، التى يضمها محيط المنحنى المستوى المغلق .

وتساوى ط ل (نوم_١ + نوم_٢) ، حيث ل طول راسمه ، نوم_١ ، نوم_٢ نصف قطر القاعدتين .



مساحة السطح المنحني لـ

area of a lune

مساحة سطح الكرة مضروبة في النسبة بين زاوية الهلال و ٣٦٠° ، أى أن :
مساحة السطح المنحني لـ =
زاوية الهلال $\times \frac{4 \times \text{ط نوم}^2}{360}$ ،
حيث نوم نصف قطر الكرة .

مساحة منطقة مستوية

area of a plane region

أكبر حد أدنى لمجموع مساحات المربعات غير المتداخلة التي تغطي المنطقة بأكملها .


area of a surface

مساحة السطح

المساحة الجانبية لسطح أسطوانى

area of a cylindrical surface, lateral .

مساحة السطح الأسطوانى الواقعة بين مستويين وتساوى حاصل ضرب طول راسم من رواسم السطح الأسطوانى ومحيط المنحنى الناشئ عن تقاطع السطح الأسطوانى مع مستوى عمودى على رواسم السطح .
ولأسطوانة الدائرية القائمة هذه المساحة تساوى ٢ ط نوم ل ، حيث نوم نصف قطر القاعدة ، ل طول راسم الأسطوانة .



المساحة الجانبية لمخروط دائرى قائم ناقص

area of a frustum of a right circular cone, the lateral

مساحة السطح المنحني للمخروط الناقص

مقدار ما في السطح من وحدات المساحة وأجزائها .

المساحة تحت منحنٍ مستوٍ


area under a plane curve

المساحة المحدودة بالمنحنى ومحور السينات والمستقيمين المارين بنقطتي نهايتي المنحنى والموازيين لمحور الصادات وتعطى بالتكامل

$\int_a^b f(x) dx$

$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$



وحدة المساحة area, unit of

مربع وحدة الطول مثل السنتيمتر المربع (سم²) أو المتر المربع (م²) . كما توجد وحدات عملية أخرى للمساحة مثل الفدان

ويساوى $\frac{5}{6}$ ٤٢٠٠ من الأمتار المربعة ،

وأجزاؤه القيراط ويساوى $\frac{1}{24}$ من الفدان

والسهم ويساوى $\frac{1}{24}$ من القيراط ، أى

يساوى $\frac{1}{576}$ من الفدان .

الإحداثيات المساحية

areal coordinates

الإحداثيات المساحية (س_١ ، س_٢ ، س_٣) لنقطة م في مستوى مثلث الإسناد ١ ٢ ٣

$$س_١ = \frac{\text{مساحة } \triangle م ٢ ٣}{\text{مساحة } \triangle ١ ٢ ٣}$$

$$س_٢ = \frac{\text{مساحة } \triangle م ١ ٣}{\text{مساحة } \triangle ١ ٢ ٣}$$

$$س_٣ = \frac{\text{مساحة } \triangle م ١ ٢}{\text{مساحة } \triangle ١ ٢ ٣}$$

(إذا كانت رؤوس المثلث الذى رأسه النقطة م لها نفس الاتجاه الدورانى لرؤوس المثلث ١ ٢ ٣ فإن مساحته تكون موجبة وإذا كان لها عكس الاتجاه الدورانى لرؤوس المثلث ١ ٢ ٣ فإن مساحته تكون سالبة) .



العلاقات بين مساحات السطوح المتشابهة
areas of similar surfaces, relation
between

تتناسب مساحات السطوح المتشابهة مع
مربعات مستقيمت متناظرة فيها . فمثلاً :
١ - النسبة بين مساحتي دائرتين تساوي
النسبة بين مربعي نصفى قطريهما ،
٢ - النسبة بين مساحتي مثلثين متشابهين
تساوي النسبة بين مربعي أى ضلعين متناظرين
فيهما .

مخطط "أرجاند" Argand diagram
= مستوى "أرجاند" = Argand plane
طبقاً للمسلمة التي تنص على أن كل عدد
مركب ع = (س ، ص) تناظره نقطة وحيدة في
مستوى ديكارت وبالعكس ، يمكن تمثيل
الأعداد المركبة هندسياً بنقط في هذا المستوى
الذي يسمى عندئذ مستوى "أرجاند" (نسبة
إلى العالم الفرنسي أرجاند) أو المستوى المركب
(complex plane) . ويسمى محور السينات
في مستوى أرجاند المحور الحقيقي (real axis)
وتمثل عليه الأعداد الحقيقية ، ويسمى محور
الصادات المحور التخيلي (imaginary axis)

وهذه الإحداثيات تحقق العلاقة :

$$١ = س_١ + س_٢ + س_٣$$



السرعة المساحية areal velocity
إذا تحركت نقطة مادية في مستوى ، فرسمت
منحنياً ونسبت الحركة إلى قطب وخط أصلي ،
فإن معدل تغير المساحة المحصورة بين الخط
الأصلي والمنحنى ونصف القطر المتجه من
القطب إلى النقطة المتحركة يسمى السرعة
المساحية .

معجم الرياضيات

القيمة الأساسية لسعة عدد مركب
argument of a complex number,
principal value of an

القيمة الوحيدة لسعة العدد المركب ع التي
تحقق - ط \geq سعة ع \geq ط تسمى القيمة
الأساسية لسعة ع .

عمدة الدالة

= المتغير المستقل للدالة

argument of a function

(انظر : متغير مستقل
independent variable)


العمد في جدول قيم دالة

arguments in a table of values of a
function

قيم المتغير المستقل بالجدول التي تحسب قيم
الدالة لها .

العمد في جدول مثلثات هي الزوايا التي
تجدول قيم الدوال المثلثية لها ، وفي جدول
اللوغاريتمات هي الأعداد التي تجدول
اللوغاريتمات لها .

وتمثل عليه الأعداد التخيلية الصرف . ويمكن
أيضاً النظر للعدد المركب ع = (س ، ص) على
أنه القطعة المستقيمة الموجهة (المتجه) من نقطة
الأصل للنقطة (س ، ص) .



سعة عدد مركب


argument of a complex number

= amplitude of a complex number

إذا كان ع = (س ، ص) عدداً مركباً فإن

أى زاوية θ = ظا⁻¹ ($\frac{ص}{س}$) تسمى سعة للعدد

المركب ع . هندسياً سعة ع هي أى زاوية
(مقدرة بالتقدير الدائري) يصنعها مع الاتجاه
الموجب لمحور السينات عند اعتبار ع على إنها
قطعة مستقيمة موجهة من نقطة الأصل إلى
النقطة (س ، ص) .



<p>المتوسط الحسابى</p> <p>arithmetic average</p> <p>= arithmetic mean = المتوسط العددي</p> <p>خارج قسمة مجموع الأعداد على عددها .</p> <p>فالمتوسط الحسابى للأعداد p_1, p_2, \dots, p_n</p> $\frac{p_1 + p_2 + \dots + p_n}{n}$ <p>يساوى</p> $\frac{\sum_{i=1}^n p_i}{\sum_{i=1}^n 1} = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{n}$ <p>وهو يساوى المتوسط الحسابى الموزون عندما تكون الأوزان متساوية وتساوى ١ . فمثلاً إذا كانت درجات طالب في أربعة مقررات هي :</p> <p>٥٠ ، ٦٠ ، ٧٠ ، ٨٠ فإن المتوسط الحسابى لدرجات هذا الطالب :</p> $\frac{٥٠ + ٦٠ + ٧٠ + ٨٠}{٤} = ٦٥$ <p>(انظر : المتوسط الحسابى الموزون)</p> <p>arithmetic average, weighted</p> <p>المتوسط الحسابى الموزون</p> <p>إذا كانت أوزان الأعداد s_1, s_2, \dots, s_n هي s_1, s_2, \dots, s_n و</p>	<p>الحساب</p> <p>arithmetic</p> <p>العلم الذى يعنى بدراسة الأعداد والعمليات عليها ، مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة ، والرفع إلى القوى وإيجاد الجذور ، إلخ ، وكذلك تطبيق هذه العمليات في مسائل الحياة العامة .</p> <p>حسابى</p> <p>arithmetic (adj)</p> <p>= arithmetical</p> <p>ما له علاقة بالحساب أوقواعده أورموزه .</p> <p>عنوان حسابى</p> <p>arithmetic address</p> <p>عنوان نحصل عليه بإجراء عملية حسابية على عنوان آخر .</p> <p>وحدة حساب ومنطق</p> <p>arithmetic and logic unit (ALU)</p> <p>مجموعة الدوائر الإلكترونية التى تجرى العمليات الحسابية والمنطقية فى الحاسب .</p>
---	--

عمليات الحساب الأربع الأساسية
arithmetic, four fundamental operations of
عمليات الجمع والطرح والضرب
والقسمة .

الأوساط العددية (بين عددين معلومين)
arithmetic means (between two numbers)

الحدود الأخرى لمتوالية عددية حدها الأول
والأخير عددان معلومان . وإذا كان بين العددين
المعلومين وسط عددي واحد فإنه يساوي
متوسطهما (أى نصف مجموعهما) .

(انظر : متوالية عددية)
arithmetic progression .

الأعداد الحسابية arithmetic numbers
الأعداد الحقيقية الموجبة . وتعنى
أيضاً الأعداد نفسها وليس الرموز التي
تمثلها .

على الترتيب فإن المتوسط الحسابي الموزون لها
يعطى بالصيغة :

$$\frac{\frac{r}{1=r} \cdot r}{\frac{r}{1=r} \cdot r}$$

فمثلاً إذا كانت درجات طالب في أربعة
مقررات هي :

٨٠ ، ٧٠ ، ٦٠ ، ٥٠

وأوزانها ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ على الترتيب فإن :
المتوسط الحسابي الموزون لدرجات الطالب
$$\frac{(4 \times 80) + (3 \times 70) + (2 \times 60) + 50}{10} =$$

$$70 = \frac{700}{10} =$$

وحدة حسابية arithmetic component
= arithmetic unit = arithmetic organ

أحد مكونات وحدة التشغيل المركزي
للحاسب ، وتقوم بأداء العمليات الحسابية
(جمع وضرب وطرح وقسمة) والعمليات
المنطقية بالإضافة إلى عمليات النقل والإزاحة ،
وذلك بناءً على البيانات الواردة لها من المخزن
الداخلي للخاصب في الصورة الثنائية .

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>ويسمى P الحد الأول للمتوالية ، r أساسها ، $P + (1 - r)r$ الحد النوني أو الحد العام لها .</p> <p>متتابة حسابية منتهية</p> <p>arithmetic sequence, finite</p> <p>متتابة حسابية لها عدد محدود من الحدود .</p> <p>متتابة حسابية عددية غير منتهية</p> <p>arithmetic sequence, infinite</p> <p>متتابة عددية عدد حدودها لانهاى .</p> <p>متسلسلة حسابية arithmetic series</p> <p>متسلسلة تتج من المتتابة الحسابية بوضع علامة + بين كل حدين من حدودها .</p> <p>فالمتسلسلة $2 + 4 + 6 + 8 + \dots$ تتج من المتتابة الحسابية $2, 4, 6, 8, \dots$ وإذا كانت $P + r, P + 2r, P + 3r, \dots$ ، $P + (1 - r)r$ متتابة حسابية فإن :</p> $P + (P + r) + (P + 2r) + \dots + [P + (1 - r)r]$ <p>تكون متسلسلة حسابية حدها الأول P ، وحدها النوني $P + (1 - r)r$ ، ومجموع n</p>	<p>وحدة حسابية arithmetic organ</p> <p>= arithmetic component</p> <p>= arithmetic unit</p> <p>(انظر : وحدة حسابية)</p> <p>arithmetic component</p> <p>فيض حسابى arithmetic overflow</p> <p>عبارة تدل على أن ناتج عملية حسابية يزيد عن الحد الأقصى للأعداد التى يمكن للحاسب تمثيلها .</p> <p>متوالية عددية arithmetic progression</p> <p>= متتابة حسابية</p> <p>= arithmetic sequence</p> <p>فئة مرتبة من الأعداد تسمى عناصرها حدود المتوالية ، يزيد (أو ينقص) أى منها عن السابق له مباشرة بعدد ثابت . مثل : $3, 7, 11, \dots, 15$ ويمكن كتابتها بصورة عامة على النحو :</p> $P, P + r, P + 2r, P + 3r, \dots, P + (1 - r)r$
--	---

معجم الرياضيات

<p>تكون فئة جزئية من فئة توجيهات الآلة التي تعتبر منفصلة عن التوجيهات المنطقية .</p>	<p>من حدود المتسلسلة الحسابية هو :</p> $ح = \frac{u}{y} [5(1 - u) + 22]$
<p>عملية حسابية arithmetical operation عملية تجرى باستخدام الأوامر الحسابية ، مثال ذلك الجمع والطرح والضرب والقسمة .</p>	<p>وحدة حسابية arithmetic unit = arithmetic organ = arithmetic component</p>
<p>آلة حاسبة arithmometer آلة تقوم بإجراء العمليات الحسابية .</p>	<p>(انظر : وحدة حسابية) arithmetic component</p>
<p>ذراع الازدواج arm of a couple البعد بين خطى العمل لقوتى الازدواج .</p>	<p>المتوسط الحسابي arithmetical average = المتوسط العددي (انظر : المتوسط الحسابي) arithmetic average = arithmetic mean</p>
<p>ضلع زاوية arm of an angle = side of an angle أحد المستقيمين اللذين يحددان الزاوية .</p>	<p>المتوسط العددي (انظر : المتوسط الحسابي) arithmetic average = arithmetic mean</p>
<p>ترتيب arrangement وضع عناصر فئة ، أو عناصر فئة جزئية منها ، في توالٍ معين .</p>	<p>أمر حسابي arithmetical instruction أمر يحدد عملية حسابية تجرى على البيانات ، مثال ذلك الجمع أو الضرب . الأوامر الحسابية</p>

مجمع اللغة العربية - القاهرة


arrow diagram

مخطط سهمي

إذا كانت S علاقة من فئة S إلى فئة S فإن كل زوج مرتب (S, S) $\in S$ يمثل هندسياً بخط ينتهي بسهم ويصل من النقطة S إلى النقطة S $\in S$

$S \leftarrow S$

وتسمى فئة جميع هذه الخطوط السهمية المخطط السهمي للعلاقة S .



artificial intelligence

ذكاء مصطنع . . . مصطلح يستخدم لوصف استخدام الحاسب بحيث يقوم بعمليات يحاكي بها ذكاء الإنسان في التعلم واتخاذ القرار .

ascending order

ترتيب تصاعدي

descending order

ترتيب تنازلي

ترتيب الحدود حسب القوى التصاعدية (أو التنازلية) للمتغير في ذات الحدود :

arrangement of terms

ترتيب الحدود

وضع الحدود في ترتيب معين .

array

صفيف

فئة عناصرها مرتبة تبعاً لنظام معين .

ب - منظومة (في الحاسب)

(in computer)

ترتيب لمفردات مجموعة البيانات وذلك بتمييز كل منها بمفتاح أو دليل تحتى . وتوضع بطريقة تسمح للبرنامج بفحص المنظومة لاستخلاص البيانات الخاصة بمفتاح أو دليل تحتى معين .
تُعد المنظومة هو عدد الأدلة التحتية اللازمة للتعرف على المفردة : فمثلاً ، إذا كانت المنظومة تتكون من أيام البسطة فإن المنظومة تكون أحادية البعد إذا ميز اليوم بعدده (مثلاً ٣٢ ليوم ١ فبراير) ، وتكون المنظومة ثنائية البعد إذا ميز اليوم بزوج مرتب من الأعداد عنصريه الأول اليوم والثاني الشهر (مثلاً (١ ، ٢) : لأول فبراير) .

arrow

سهم

قطعة من مستقيم تشير إلى اتجاه معين مثل الشكل المبين .

معجم الرياضيات

<p>assemble, to يُجَمِّع</p> <p>يضع التعليقات الرمزية والعمليات المتعاقبة ، التي ستعالج بها مسألة ما . في برنامج لحاسب آلي .</p>	<p>متسلسلة قوى تصاعدية (تزايدية)</p> <p>ascending power series</p> <p>(انظر: متسلسلة قوى power series) .</p>
<p>assembler language لغة المُجَمِّع</p> <p>لغة للحاسبات وهي أقرب إلى لغة الحاسبات البدائية من اللغات ذات المستوى الأعلى ، مثل لغات فورتران Fortran والجالول Algol وكوبول Cobol .</p>	<p>القوى التصاعدية لمتغير في كثيرة حدود</p> <p>ascending powers of a variable in a polynomial</p> <p>الترتيب الذي تظهر فيه قوى المتغير بحيث تزداد عند الحدود من اليمين إلى اليسار في كثيرة الحدود ، كما في كثيرة الحدود :</p> $p + b x + c x^2 + d x^3 + \dots$
<p>assembler program برنامج مُجَمِّع</p> <p>برنامج يصمم لتحويل عدة تعليقات رمزية إلى شكل يمكن معه تنفيذها بواسطة الحاسب الآلي .</p>	<p>متتابعة تصاعدية (تزايدية)</p> <p>ascending sequence .</p> <p>متابعة كل حد من حدودها أصغر من الذي يليه .</p>
<p>assess, to يثمن</p> <p>يقدر قيمة الشيء .</p>	<p>زمن الصعود</p> <p>ascending time</p> <p>الزمن الذي يستغرقه جسم يتحرك إلى أعلى حتى يبلغ أقصى ارتفاع له .</p>
<p>assessed value القيمة المقدرة</p>	

النقص في قيمة المعدات ويساوى الفرق بين
ثمن شراء (تكلفة) هذه المعدات cost value
وبين قيمتها الدفترية book value .

المرافق الهرميتي للمصفوفة

associate matrix

= Hermitian-conjugate of a matrix

(مدور transpose) المرافق المركب

للمصفوفة . فمثلاً المرافق الهرميتي للمصفوفة

$$\begin{bmatrix} 1-t & 2+t \\ 3+t & t \end{bmatrix}$$

هو المصفوفة

$$\begin{bmatrix} 1+t & -t \\ -2-t & -3-t \end{bmatrix}$$

نصف قطر التقارب القرين

associated radius of convergence

إذا كانت متسلسلة القوى

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

تقارب لقيم x بحيث $|x| < R$ ،
حيث $R = 1/a_1, a_2, \dots, a_n$ ، وتباعدية لقيم x بحيث
 $|x| > R$ ، حيث
 R موجبة ، فإن الفئة R ، \dots ، R تسمى

قيمة توضع للممتلكات لحساب الضرائب
وفقاً لها .

مُثَمِّن assessor

من يقدر قيمة الممتلكات أو الدخل
أوما مائلها لتقدير الضريبة عليها .

أصول ثابتة assets, fixed
ممتلكات للاستخدام لا للبيع ، مثال ذلك
المصانع ، المباني .

الأصول (لفرد أو المؤسسة)

assets (of an individual or firm)

مجموع ما يملكه الفرد أو المؤسسة من أموال
وبضائع وودائع وديون على الغير وعقار منقول
أو غير منقول أو أى شيء آخر ذى قيمة .
ويقابلها كلمة الخصوم liabilities وهي مجموع
ديون الشخص (أو المؤسسة) وما عليه أن يدفعه
للغير .


أصول مستهلكة

assets, wasting = depreciation

<p>تكون صحيحة دائماً لجميع العناصر p, b, a ، ح التي تنتمي للفئة . ويقال في هذه الحالة أن $*$ عملية ثنائية داخجة . ومن أمثلتها عمليتا الجمع والضرب العاديتان على الأعداد الصحيحة حيث :</p> $(a + b) + p = a + (b + p)$ $(a \times b) \times p = a \times (b \times p)$ <p>أما عملية الطرح على الأعداد الصحيحة فهي ليست داخجة لأن :</p> $a - (b - p) \neq (a - b) - p$	<p>أنصاف الأقطار القرناء لتقارب المتسلسلة . فمثلاً للمتسلسلة</p> $1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{2^{p+1}} + \dots = \frac{1}{2^{p-1}}$ <p>تكون أنصاف الأقطار القرناء هي أى عددين موجبين k_1, k_2 ، بحيث $k_1 + k_2 = 1$.</p> <p>عملية ثنائية داخجة</p> <p>associative binary operation</p> <p>(انظر : خاصية الدمج) (associative property)</p>
<p>assumption افتراض</p> <p>تقرير يحتمل الصواب أو الخطأ ويستخدم لإثبات قضية أو حل مسألة .</p>	<p>associative law قانون الدمج</p> <p>إذا كانت $*$ عملية ثنائية داخجة على فئة فإن المتطابقة :</p> $a * (b * p) = (a * b) * p$ <p>تسمى قانون الدمج للعملية $*$.</p>
<p>assumption, empirical افتراض تجريبي</p> <p>افتراض مبني على التجربة المباشرة وليس على اعتبارات منطقية أو رياضية .</p>	<p>خاصية الدمج</p> <p>associative property = associativity</p> <p>خاصية إذا توافرت في عملية ثنائية $*$ على فئة فإن المتطابقة :</p> $a * (b * p) = (a * b) * p$
<p>الافتراضات الأساسية لموضوع ما</p> <p>assumptions of a subject, fundamental</p>	<p>خاصية الدمج</p> <p>associative property = associativity</p> <p>خاصية إذا توافرت في عملية ثنائية $*$ على فئة فإن المتطابقة :</p> $a * (b * p) = (a * b) * p$

مجمع اللغة العربية - القاهرة

المحل الهندسى لنقطة معينة على محيط دائرة نصف قطرها نور تتدحرج دون انزلاق داخل دائرة أخرى نصف قطرها ٤ نور . الدائرة الثابتة



ومعادلة المنحنى النجماني الديكارتية هي :

$$\frac{2}{3}p = \frac{2}{3}ص + \frac{2}{3}س$$

حيث $p = 4$ نور

الأسطرلاب
astrolabe
آلة لقياس الزوايا كانت تستعمل قديماً وبخاصة في الأرصاد الفلكية .

الملاحة الفلكية
astronavigation
العلم الذى يهدف إلى دراسة الملاحة بين الكواكب والعمل على تحقيقها .

فلكى
astronomical
صفة لما له صلة بعلم الفلك .

فئة الافتراضات التى يبنى عليها الموضوع .
فمثلاً قوانين الإبدال ، والدمج افتراضات أساسية فى علم الجبر .

التأمين
assurance
(انظر : التأمين insurance)

مركز الاتزان المطلق
astatic centre
(انظر : الاتزان المطلق
astatic equilibrium)

اتزان مطلق
astatic equilibrium
إذا اتزن جسم تحت تأثير مجموعة قوى مستوية ، ثم أديرته هذه القوى جميعها زاوية ما حول نقطة فى مستواها وظل الجسم متزاناً ، قيل للاتزان فى هذه الحالة إنه اتزان مطلق ، وللنقطة أنها مركز الاتزان المطلق .

منحنى نجماني (الأسترويد)
astroid

مناط الإسناد الفلكي

astronomical frame of reference

مناط إسناد تكون فيه الشمس ثابتة ولا تدور بالنسبة لنجوم ثابتة ويستخدم مناط الإسناد هذا في الميكانيكا السماوية .

وحدة فلكية (A.U) astronomical unit

وحدة طول تكافئ نصف مجموع أكبر وأصغر بعدد للأرض عن الشمس وتساوى $1,495 \times 10^{13}$ سنتيمتر .

علم الفلك astronomy

العلم الذى يعنى بدراسة نشأة الأجسام السماوية من نجوم وكواكب وغيرها وتكوينها ومواقعها النسبية وحركتها .

علاقة لا تماثلية asymmetric relation

يقال لعلاقة \mathcal{R} على فئة S أنها لا تماثلية إذا كان $(s, s) \in \mathcal{R}$ يستلزم أن $(s, s) \in \mathcal{R}$. فمثلاً علاقة « أكبر من » علاقة لا تماثلية

$$s < s \Rightarrow s < s \nRightarrow s < s$$

خط تقربى (لمنحنى)

asymptote (to a curve)

خط مستقيم يمس المنحنى المعطى عند اللانهاية . فمثلاً إذا كان $d(s) \rightarrow \infty$ عندما $s \rightarrow \infty$. فإن $v = s$. يكون خطاً تقريبياً لمنحنى الدالة $v = d(s)$.

خط تقربى للقطع الزائد


asymptote to the hyperbola

عندما تعطى معادلة القطع الزائد في الصورة

$$\frac{s^2}{a^2} - \frac{v^2}{b^2} = 1 \quad \text{فإن المستقيمين}$$

$$v = \frac{b}{a}s, \quad v = -\frac{b}{a}s$$

يكونان خطين تقريبين له .



خط تقربى للقطع الزائد القائم

asymptote to the rectangular

hyperbola

$$1 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$$

$$1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}$$

فإن المقطع يكون دائماً قطعاً زائداً يمر بخطاه التقريبان بنقطة الأصل . المخروط المتولد بهذه الخطوط التقريبية عندما تتغير م يسمى المخروط التقريبي للسطح الزائدي المعنى .

إحداثيات تقريبية

asymptotic coordinates

إحداثيات انحنائية على السطح بحيث تكون منحنيات الإحداثيات خطوطاً تقريبية للسطح ، أى أنه إذا كانت u ، v إحداثيات انحنائية لسطح فإنها تكون إحداثيات تقريبية إذا كانت المنحنيات $u = \text{ثابت}$ ، $v = \text{ثابت}$ خطوطاً تقريبية للسطح .


اتجاه تقريبي لمنحن

asymptotic direction of a curve

إذا كان $r(u, v)$ متجه موضع أى نقطة على منحن ، حيث $u > u_0$ ، $v > v_0$ ، فإن اتجاه المتجه

$$T = \frac{r_u}{|r_u|} \text{ أو } \frac{r_v}{|r_v|}$$

كل من محوري السينات والصادات (أى $v = \text{صفراً}$ ، $u = \text{صفراً}$) خط تقريبي للمقطع الزائد القائم $u = v = \text{ح}$ لأن
 $|v| \rightarrow \infty$ عندما $|u| \rightarrow \text{صفر}$ ،
 $|u| \rightarrow \infty$ عندما $|v| \rightarrow \text{صفر}$.



سلوك تقريبي asymptotic behaviour

السلوك التقريبي لدالة $d(u, v)$ عندما $u \rightarrow \infty$ هو دالة أخرى $r(u, v)$ أكثر بساطة من $d(u, v)$ بحيث أن $d(u, v)$ تكون قريبة من $r(u, v)$ بمعنى معين عندما $u \rightarrow \infty$.

مخروط تقريبي لسطح زائدي

asymptotic cone of a hyperboloid

إذا قطع المستوى $z = m$ s أيًا من السطحين الزائدين

$$p, \left(\frac{1}{e}\right)^p + \left(\frac{2}{e}\right)^p + \dots + \left(\frac{n}{e}\right)^p - \dots$$

حيث $p, 1, \dots, n, \dots$ كميات ثابتة، إنها مفكوك تقريبي لدالة $d(e)$ إذا كانت:

$$n \left[d(e) - c_n(e) \right] = \text{صفرًا}$$

لأى قيمة ثابتة للعدد n ، حيث $c_n(e)$ مجموع الحدود النونية الأولى للمتسلسلة.

خط تقريبي لسطح

asymptotic line of a surface

منحنٍ على السطح اتجاهه عند كل نقطة من نقطه يكون اتجاهًا تقريبًا للسطح عند النقطة.

مثلث تقريبي asymptotic triangle

إذا كان $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ شعاعين متوازيين، L خطاً مستقيماً قاطعاً لهما في النقطتين p, q ، فإن فئة اتحاد القطعة المستقيمة $[p, q]$ والشعاعين \vec{a}, \vec{b} وتسمى مثلثاً تقريباً ويرمز له بالرمز $\Delta_{p,q}$ و. وتسمى النقطتان p, q

يقال له اتجاه تقريبي للمنحنى.

قد يكون للمنحنى اتجاه تقريبي دون أن يكون له خطوط تقريبية. مثال ذلك ليس للقطع المكافئ $y = x^2$ ، $e = \text{صفرًا}$ خطوط تقريبية ولكن اتجاه محور الصادات اتجاه تقريبي له.

اتجاه تقريبي على سطح عند نقطة

asymptotic direction on a surface at a point

الاتجاهات التقريبية عند نقطة p على سطح S هي الاتجاهات عند p التي ينعدم في اتجاهها التقوس العمودي.

توزيع تقريبي asymptotic distribution


إذا كان التوزيع $d(s)$ لمتغير عشوائي s دالة في متغير وسيط n (مثلاً قد يكون n حجم عينة، s المتوسط) فإن دالة التوزيع التقريبي للمتغير s هي نهاية $d(s)$ عندما $n \rightarrow \infty$.

مفكوك تقريبي asymptotic expansion

يقال لمتسلسلة تباعدية على الصورة

الزاويتان الداخليتان لمثلث تقربى
asymptotic triangle, interior
angles of an

إذا كان $\angle P$ و $\angle Q$ مثلثاً تقريباً فإن الزاويتين
 $\angle P$ و $\angle Q$ وتسميان الزاويتين
 الداخليتين للمثلث التقربى .



داخلية مثلث تقربى
asymptotic triangle, interior of an
 داخلية المثلث التقربى $\angle P$ و $\angle Q$ هي فئة
 تقاطع :


(١) نصف المستوى الذى حده الخط المستقيم
 \leftrightarrow P ويحوى النقطة Q ،

(٢) نصف المستوى الذى حده الخط المستقيم
 \leftrightarrow Q ويحوى النقطة P ،

(٣) نصف المستوى الذى حده الخط المستقيم
 \leftrightarrow P ويحوى النقطة Q .

ضلع مثلث تقربى
asymptotic triangle, side of an

رأسى المثلث التقربى ، كما تسمى القطعة
 المستقيمة PQ [ضلع المثلث التقربى .



الزاويتان الخارجيتان لمثلث تقربى
asymptotic triangle, exterior angles
of an

إذا كان $\angle P$ و $\angle Q$ مثلثاً تقريباً فإن مكملتي
 $\angle P$ و $\angle Q$ وتسميان الزاويتين
 الخارجيتين للمثلث التقربى .

(انظر : المثلث التقربى
 asymptotic triangle)

خارجية مثلث تقربى
asymptotic triangle, exterior of an

فئة جميع النقط التى لا تنتمى إلى المثلث
 التقربى أو إلى داخليته . . .


(انظر : داخلية مثلث تقربى
 asymptotic triangle, interior of an)

<p>أطلس تفاضلي تام atlas, c^∞, complete يقال لأطلس تفاضلي نوني البعد على فئة S إنه تام إذا كان يحوى كل أطلس تفاضلي نوني البعد على الفئة S ومكافئاً له .</p>	<p>(انظر : المثلث التقريبي asymptotic triangle) رأساً مثلث تقريبي asymptotic triangle, vertices of an (انظر : المثلث التقريبي asymptotic triangle)</p>
<p>الضغط الجوي atmospheric pressure وزن عمود الهواء الرأسى فى أعلى سطح مساحة مقطعة ١ سم^٢ . وهو يتناسب مع كثافة الهواء عند ثبوت درجة الحرارة .</p>	<p>قيمة تقريبية لتعداد مجتمع asymptotic value of a population إذا كان V (N) تعداد مجتمع ما وكانت $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{V}{N} = \bar{V}$</p>
<p>توهين الارتباط attenuation of correlation التناقص فى الارتباط بين متغيرين نتيجة لأخطاء مستقلة فى قياس أحد المتغيرين أو كليهما .</p>	<p>فإن \bar{V} تسمى القيمة التقريبية لتعداد المجتمع</p>
<p>مركز الجذب attraction, center of النقطة التى تتجه إليها دائماً قوة الجذب التى تؤثر على جسم .</p>	<p>أطلس تفاضلي atlas, c^∞ هو مفهوم فى الهندسة التفاضلية ينقل دراسة المتعدد التفاضلي (differential manifold) العام إلى دراسة أجزاء من الفراغ الإقليدى نونى البعد وعندئذ يقال أن الأطلس نونى البعد .</p>

قوة الجذب بين كتلتين	إذا كانت :
attraction force (between two masses)	$F_{11} = \frac{G m_1 m_1}{r_{11}^2} + \dots + \frac{G m_1 m_2}{r_{12}^2} + \dots + \frac{G m_1 m_n}{r_{1n}^2}$ $F_{22} = \frac{G m_2 m_1}{r_{21}^2} + \dots + \frac{G m_2 m_2}{r_{22}^2} + \dots + \frac{G m_2 m_n}{r_{2n}^2}$ $\dots \dots \dots$ $F_{nn} = \frac{G m_n m_1}{r_{n1}^2} + \dots + \frac{G m_n m_2}{r_{n2}^2} + \dots + \frac{G m_n m_n}{r_{nn}^2}$ <p>مجموعة من m من المعادلات الخطية في n من المجاهيل فإن المصفوفة</p> $\begin{vmatrix} F_{11} & F_{12} & \dots & F_{1n} \\ F_{21} & F_{22} & \dots & F_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ F_{n1} & F_{n2} & \dots & F_{nn} \end{vmatrix}$
الجذب الثقالي attraction, gravitational	تسمى المصفوفة المربعة هذه المجموعة من المعادلات .
صفة - خاصية attribute	دالة متشاكلة ذاتياً automorphic function
سمة كيفية لمتغير يرمز لوجودها أو لغيابها بقيمة كمية .	يقال لدالة d (ع) وحيدة القيمة ، وتحليلية إلا عند أقطابها ، في مجال معين K في المستوى المركب ، أنها متشاكلة ذاتياً بالنسبة إلى زمرة من التحويلات الخطية إذا كانت m (ع) تنع في K لكل $E \in K$ ولكل تحويل m في الزمرة وكانت $d(m(E)) = d(E)$.
المصفوفة المربعة augmented matrix	تشكل ذاتي automorphism
	إذا كان التشكل من مجموعة فوق نفسها

<p>متسلسلة ذاتية الارتداد autoregressive series</p> <p>إذا أمكن كتابة المتغير x_n = $d(n)$ على الصورة :</p> $x_n = a_0 + a_1 x_{n-1} + a_2 x_{n-2} + \dots + a_m x_{n-m}$ <p>يقال أن المتغير x_n يشكل متسلسلة ذاتية الارتداد .</p>	<p>أو من نظام رياضي (كالمجموعة مثلاً) فوق نفسه سمى تشكلاً ذاتياً .</p> <p>تشكل ذاتي داخلي automorphism, inner</p> <p>إذا كان التشكل الذاتي على زمرة بحيث أن $s \leftarrow s^*$ إذا ، وفقط إذا ، كان $s^* = s^{-1}$ لعنصر ما a من عناصر الزمرة ، سمى التشكل تشكلاً ذاتياً داخلياً .</p>
<p>مساعد auxiliary</p> <p>ما يستعمل لتبسيط عملية أو تسهيل حل مسألة رياضية معينة .</p>	<p>تشكل ذاتي (لفراغ اتجاهي) automorphism (of a vector space)</p> <p>تشكل من فراغ اتجاهي فوق نفسه .</p>
<p>زاوية مساعدة auxiliary angle</p> <p>إذا كانت $a \cos \alpha + b \sin \alpha = c$ فإن الزاوية التي قياسها α ، حيث صفر $\alpha \geq \alpha > 2\pi$ ، $\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} = \cos \alpha$ ، $\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} = \sin \alpha$ تسمى زاوية مساعدة . وهي تستخدم</p>	<p>تشكل ذاتي خارجي automorphism, outer</p> <p>يقال لتشكل ذاتي أنه خارجي إذا لم يكن تشكلاً ذاتياً داخلياً .</p> <p>فمثلاً إذا كانت $1, \omega, \omega^2$ الجذور التكعيبية للواحد الصحيح فإن التناظر $1 \leftarrow 1, \omega \leftarrow \omega^2, \omega^2 \leftarrow \omega$ يكون تشكلاً ذاتياً خارجياً على الزمرة التي عناصرها $1, \omega, \omega^2$ وعمليتها الثنائية هي الضرب .</p>

الدائرة التي قطرها المحور الأكبر للقطع



المعادلة المساعدة (لمعادلة فرقية)
auxiliary equation (of a difference equation)

إذا كانت

$$P_n s^n + P_{n-1} s^{n-1} + \dots + P_1 s + P_0 = 0$$

معادلة فرقية خطية من الرتبة n ، فإن
المعادلة :
$$P_n m^n + P_{n-1} m^{n-1} + \dots + P_1 m + P_0 = 0$$

حيث m ثابت، تسمى المعادلة المساعدة
للمعادلة الفرقية.

المعادلة المساعدة (لمعادلة تفاضلية)
auxiliary equation (of a differential equation)


إذا كانت :

$$P_n y^{(n)} + P_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + P_1 y' + P_0 y = 0$$

حيث $y^{(k)}$ هي المشتقة من الرتبة k ، فإن
المعادلة التفاضلية تسمى المعادلة المساعدة

للمساعدة في حل المعادلة التفاضلية وذلك بوضعها
على الصورة :


$$y'' + p y' + q y = 0 \quad \text{حيث } (p, q \text{ ثوابت})$$



الدائرة المساعدة لقطع زائد

auxiliary circle of a hyperbola

الدائرة التي قطرها المحور الحقيقي للقطع



الدائرة المساعدة لقطع ناقص

auxiliary circle of an ellipse

معجم الرياضيات

مقررات هي ٥٠ ، ٦٠ ، ٧٠ ، ٨٠ وأوزانها هي ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، فإن متوسط درجات الطالب عندما ص = ٢ تساوي :

$$\frac{1}{2} \left[\frac{4 \times 1(80) + 3 \times 2(70) + 2 \times 3(60) + 1 \times 4(50)}{4 + 3 + 2 + 1} \right]$$


$$70, 7 = \sqrt[2]{50} = \left(\frac{50000}{10} \right) = \text{تقريباً .}$$

التسارع المتوسط (العجلة المتوسطة)

average acceleration

التغير الاتجاهي في السرعة مقسوماً على التغير في الزمن . إذا كان متجه السرعة عندما $t = t_1$ هو \underline{v}_1 وعندما $t = t_2$ هو \underline{v}_2 فإن التغير الاتجاهي في السرعة هو $\underline{v}_2 - \underline{v}_1$ ، وبالتالي فإن التسارع المتوسط في الفترة الزمنية المناظرة من t_1 إلى t_2 هو :

$$\frac{\underline{v}_2 - \underline{v}_1}{t_2 - t_1}$$



معادلة تفاضلية خطية متجانسة ذات معاملات ثابتة فإن المعادلة :

$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0$ صفراً حيث a ثابت ، تسمى المعادلة المساعدة للمعادلة التفاضلية .

الذاكرة المساعدة auxiliary memory

وحدة تخزين إضافية في الحاسب تستخدم امتداداً لوحدة التخزين الرئيسية وتسمى كذلك خازنة مساعدة auxiliary storage .

المتوسط average

المتوسط M لفئة من الأعداد هو عدد يقع بين أصغر وأكبر عنصرين فيها ، ويعطى بالصيغة :

$$M = \frac{\frac{r}{n} + \frac{(n-r)}{n}}{2}$$

حيث r هو العنصر الـ r للفئة ، n عدد عناصر الفئة ، و $\frac{r}{n}$ وزن العنصر r ، $\frac{n-r}{n}$ ص عدد اختياري .

فمثلاً إذا كانت درجات طالب في أربعة

$\frac{\sum_{i=1}^n s_i - \bar{s} }{n}$ <p>حيث \bar{s} المتوسط الحسابي للأعداد s_1, s_2, \dots, s_n.</p>	<p>التقوس البسيط لمنحنٍ مستوٍ average curvature of a curve in a plane</p> <p>التغير في ميل المماس للمنحنى على امتداد قوس منه مقسوماً على طول القوس .</p>
<p>المتوسط الهندسى average, geometric = الوسط الهندسى = geometric mean</p> <p>الجذر النونى لحاصل ضرب n من الأعداد الموجبة . وعليه فالقانون العام للمتوسط الهندسى M لفئة من الأعداد الموجبة s_1, s_2, \dots, s_n هو</p> $M = \sqrt[n]{s_1 s_2 \dots s_n}$	<p>التاريخ المتوسط (لمجموعة من الدفع) average date (for a set of payments) = equated date</p> <p>التاريخ الذى تستبدل فيه جميع الدفع بدفعة وحيدة مساوية لمجموع قيمها عند الاستحقاق ، مع الأخذ فى الاعتبار تراكمات الدفع المستحقة قبل هذا التاريخ والقيم الحالية عنده للدفع المستقبلية .</p>
<p>المتوسط التوافقى average, harmonic = الوسط التوافقى = harmonic mean</p> <p>مقلوب المتوسط الحسابى لمقلوبات مجموعة من الأعداد . وعليه فالقانون العام للمتوسط التوافقى لفئة من الأعداد s_1, s_2, \dots, s_n أوزانها w_1, w_2, \dots, w_n هو:</p> $M = \frac{w_1 + w_2 + \dots + w_n}{\frac{w_1}{s_1} + \frac{w_2}{s_2} + \dots + \frac{w_n}{s_n}}$	<p>الانحراف المتوسط (فى إحصاء) average deviation in statistics = mean deviation</p> <p>إذا كانت s_1, s_2, \dots, s_n أعداداً حقيقية تمثل بيانات ، فإن الانحراف المتوسط لها هو المقدار</p>


<p>متوسط تغير دالة</p> <p>average rate of change of a function</p> <p>متوسط تغير دالة $v = d (s)$ على الفترة</p> <p>من s إلى $s + \Delta s$ هو النسبة $\frac{\Delta v}{\Delta s}$ ، أى</p> $\frac{\Delta v}{\Delta s} = \frac{d(s + \Delta s) - d(s)}{\Delta s}$	<p>$\frac{محرك \frac{v}{s}}{محرك \frac{v}{s} \left(\frac{1}{s} \right)}$ = $\frac{v}{s}$</p> <p>ويستنتج من القانون العام للمتوسط بأخذ</p> <p>$v = 1$.</p> <p>(انظر : المتوسط average) .</p>
<p>مقدار السرعة المتوسطة average speed</p> <p>القيمة الثابتة للسرعة التى لو سار بها الجسم</p> <p>فى فترة زمنية لقطع نفس المسافة التى قطعها فعلاً</p> <p>فى تلك الفترة ، أى أن :</p> <p>مقدار السرعة المتوسطة =</p> <p>المسافة المقطوعة</p> $\frac{\text{المسافة المقطوعة}}{\text{الزمن الذى استغرقه الجسم فى قطعها}}$	<p>المتوسط المتحرك average, moving</p> <p>المتوسط المتحرك الذى دورته n هو متسلسلة</p> <p>المتوسطات العددية التى نحصل عليها بإيجاد</p> <p>متوسطات فئات جزئية من حدود متتالية</p> <p>ومتساوية البعد عددها n فى متسلسلة زمنية .</p> <p>فمتوسط الحدود النونية الأولى يقرن عادة</p> <p>بأنقطة المتوسطة لهذه الفترة .</p> <p>المتوسط الثانى نحصل عليه من الفئة الجزئية</p> <p>التي تحوى n من العناصر بدءاً من العنصر</p> <p>الثانى فى المتسلسلة .</p>
<p>القيمة المتوسطة لدالة</p> <p>average value of a function</p> <p>= mean value of a function</p> <p>القيمة المتوسطة لدالة d فى متغير واحد ، على</p> <p>الفترة التى نهايتها a ، b ، هى ناتج قسمة</p> <p>المساحة المحدودة بالمنحنى $d (s)$ والمستقيمين</p>	<p>الإحداثى الصادى المتوسط</p> <p>average ordinate = mean ordinate</p> <p>القيمة المتوسطة لدالة فى متغير واحد</p> <p>(انظر : القيمة المتوسطة لدالة</p> <p>average value of a function)</p>

الزمنية t فإن

$$\frac{\text{الإزاحة } s}{t_2 - t_1} = \text{السرعة المتوسطة للنقطة المادية}$$

$$\frac{s_2 - s_1}{t_2 - t_1} =$$

حيث s_1 ، s_2 هما متجهاً موضع النقطة بالنسبة لنقطة ثابتة وعند $t_1 = t_2$ ، $t_1 = t_2$ على الترتيب . (انظر الشكل) .



إيجاد الحساب المتوسط

averaging an account

عملية إيجاد قيمة الحساب الذي يسدد في

تاريخ متوسط محدد .

(انظر : التاريخ المتوسط)
average date

الأوزان في نظام القياس البريطاني

avoirdupois weight

$s = t$ ، $s = t$ ، ومحور السينات على طول الفترة ، أى :

$$\int_a^b \frac{1}{s-t} dt$$

أما القيمة المتوسطة لدالة في أكثر من متغير على منطقة فهي تكامل الدالة على المنطقة مقسوماً على قيمة مقياس المنطقة ، أى :

$$\int_D \frac{1}{K} dV$$

حيث ترمز D إلى المنطقة ، dV إلى عنصر منها ، K إلى قيمتها ، فمثلاً القيمة المتوسطة للدالة s على المستطيل الذي رؤوسه النقط $(0,0)$ ، $(0,2)$ ، $(3,2)$ ، $(3,0)$


هى : $\int_0^3 \int_0^2 s \, dV$

$$= \frac{1}{6} \int_0^3 \int_0^2 s \, dV = \frac{3}{2}$$

السرعة المتوسطة average velocity

التغير في متجه الموضع مقسوماً على التغير في الزمن .

فإذا تحركت نقطة مادية من الموضع t عند اللحظة الزمنية t إلى الموضع b عند اللحظة



محورا القطع الزائد axes of a hyperbola
المستقيمان اللذان يتماثل القطع الزائد بالنسبة
لهما . فمثلاً إذا أعطيت معادلة القطع الزائد في

الصورة القياسية :

$$1 = \frac{ص^2}{P^2} - \frac{س^2}{B^2}$$

فإن محوريه يكونان محور السينات ومحور
الصادات .

المحوران السمتعرض والمرافق لقطع
الزائد

axes of a hyperbola, transverse and
conjugate

إذا أعطيت معادلة القطع الزائد في الصورة
القياسية :


$$1 = \frac{ص^2}{P^2} - \frac{س^2}{B^2}$$

مجموعة من الأوزان وحدتها الأساسية وزن
الباوند pound weight وهو يساوي ١٦ وزن
الأوقية ounce weight .

مقطعا محوري الإحداثيات (في المستوى)
axes, intercepts of (in plane)

مقطع محور إحداثيات بخط مستقيم هو
إحداثي نقطة التقاطع مع هذا المحور . فمقطعا
محوري السينات والصادات بالخط المستقيم

P $ص + ب = ح$ هما $\frac{ح}{P}$ ، $\frac{ح}{B}$
على الترتيب .



مقاطع محاور الإحداثيات (في الفراغ)
axes, intercepts of (in space)

مقطع محور إحداثيات بمستوى هو إحداثي
نقطة تقاطع هذا المحور مع المستوى . فمقاطع


محاور الإحداثيات $س$ ، $ص$ ، $ح$ بالمستوى
 P $ص + ب + ح = س$

القطعتان المستقيمتان اللتان يقطعهما القطع الناقص من محوريه . فمثلاً إذا أُعطيت معادلة القطع الناقص في الصورة القياسية

$$1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

وكان $a < b$ فإن القطعة

المستقيمة التي نقطتا نهايتها $(\pm a, 0)$ ، صفر تكون المحور الأكبر للقطع الناقص وطولها $2a$ ، والقطعة المستقيمة التي نقطتا نهايتها $(0, \pm b)$ ، صفر تكون المحور الأصغر للقطع الناقص وطولها $2b$.



محاور السطح الناقص

axes of an ellipsoid


المستقيمت الثلاث التي يتماثل السطح الناقص بالنسبة إليها . فمثلاً إذا أُعطى السطح الناقص في الصورة القياسية :

$$1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$$

فإن محاوره تكون محاور الإحداثيات x, y, z .

فإن القطعة المستقيمة التي نقطتا نهايتها $(\pm a, 0)$ ، صفر تكون المحور المستعرض للقطع الزائد وطولها $2a$. والقطعة المستقيمة التي نقطتا نهايتها $(0, \pm b)$ ، صفر تكون المحور المرافق للقطع الزائد وطولها $2b$.

(انظر الشكل)



محورا القطع الناقص axes of an ellipse
المستقيمان اللذان يتماثل القطع الناقص
بالنسبة لهما . فمثلاً إذا أُعطيت معادلة القطع
الناقص في الصورة القياسية :

$$1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

فإن محوريه يكونان محوري السينات والصادات .

المحوران الأكبر والأصغر للقطع الناقص
axes of an ellipse, major and minor

المحاور الأساسية للقصور الذاتي
(لجسم عند نقطة معلومة)

axes of inertia, principal

المحاور الثلاثة المتلاقية عند النقطة المعلومة والمتعامدة شتى مثلى والتي تنعدم مضروباً القصور الذاتي للجسم بالنسبة لكل اثنين منها .

المستوى على مستوى الإسناد المناظر . فمثلاً أثر المستوى^٢ س + ب ص + ح ع = صفر على المستوى س = صفر هو الخط المستقيم ب ص + ح ع = صفر ، س = صفر

تماثل محورى axial symmetry

إذا كان الشكل الهندسى متماثلاً بالنسبة لخط مستقيم يقال أن له تماثلاً محورياً أو أنه تماثل محورياً ويكون هذا الخط المستقيم هو محور التماثل

(انظر : محور التماثل axis of symmetry)


مستوى إسناد axial plane

مستوى يحوى محورين من محاور الإسناد (محاور الإحداثيات) . فى الفراغ يوجد ثلاثة مستويات إسناد هى المستويات

س ص (ع = صفر) ، ص ع (س = صفر) ، ع س (ص = صفر) .

مسلمة axiom

قضية فى نظام رياضى أو عبارة فيه يسلم بصحتها ، وتستنتج منها منطقياً مبرهنات (نظريات ، نتائج ، ...) هذا النظام .



مسلمة مستقلة axiom, independent

يقال لمسلمة أنها مستقلة عن بقية المسلمات فى نظامها إذا لم تكن نتيجة منطقية لمسلمة أو لأكثر من مسلمات النظام .

الآثار على مستويات الإسناد

axial planes, intercepts on the

إذا تقاطع مستوى مع مستويات الإسناد فإن كل خط مستقيم من خطوط التقاطع يسمى أثر

يقال لفراغ طوبولوجى إنه يحقق مسلمة قابلية
العد الثانية إذا كان لبنيته الطوبولوجية أساس
قابل للعد .

مسلمة التطابق

axiom of superposition

المسلمة التى تنص على أن أى شكل
هندسى يمكن تحريكه فى الفراغ دون أن يتغير
البعد بين أى نقطتين فيه وبالتالي يحتفظ بجميع
خواصه الهندسية (الأطوال ، المساحات ،
الحجوم ، ...) .

نظام مسلمات **axiomatic system**
النظام المكون من المسلمات والمسميات
الأولية (اللامعرفات) والمعرفات والمبرهنات
(النظريات ، والتتائج ، ...) على
أساسها .

نظام مسلمات تصنيفى

axiomatic system, categorical

مسلمة " كانتور - ديديكند "

axiom of Cantor-Dedekind

المسلمة التى تنص على أن هناك تناظراً أحادياً
بين نقاط الخط المستقيم وفئة الأعداد الحقيقية .

مسلمة الاختيار **axiom of choice**

(انظر : choice, axiom of) .

مسلمة الاتصال **axiom of continuity**

مسلمة تنص على أن كل نقطة على خط
الأعداد الهندسية يناظرها عدد حقيقى وحيد
(نسبى أو غير نسبى) .

مسلمة قابلية العد الأولى

axiom of countability, first

يقال لفراغ طوبولوجى إنه يحقق مسلمة قابلية
العد الأولى إذا كانت فئة جميع الجوارات لكل
نقطة فيه لها أساس قابل للعد .


مسلمة قابلية العد الثانية

axiom of countability, second

<p>مسلمتان كل منهما نتيجة منطقية للأخرى .</p>	<p>نظام مسلّمات كل نموذج من نماذجه متشاكل مع نموذج آخر .</p>
<p>مسلّمات "أقليدس" axioms, Euclid's</p> <p>مسلّمات تنص على :</p> <p>(١) مساويات نفس الشيء تكون متساوية ،</p> <p>(٢) إذا أضيفت متساويات إلى متساويات كانت النتائج متساوية ،</p> <p>(٣) إذا طرحت متساويات من متساويات كانت البواقي متساوية ،</p> <p>(٤) الأشياء التي تتطابق تكون متساوية ،</p> <p>(٥) الكل أكبر من أى جزء من أجزائه .</p>	<p>نظام مسلّمات متآلف axiomatic system, consistent</p> <p>نظام مسلّمات لا يتضمن مسلّمتين متعارضتين أو مسلمة ونظرية متعارضتين أو نظريتين متعارضتين ، أى أنه إذا كانت س مسلمة أو نظرية فى نظام مسلّمات متآلف فلا يمكن أن يحوى النظام المسلمة أو النظرية ~ س (أى نفى س) .</p>
<p>محور إحداثيات axis, coordinate</p> <p>الخط المستقيم الذى يقاس عليه (أوفى موازاته) الإحداثى .</p>	<p>نظام مسلّمات غير تام axiomatic system, incomplete</p> <p>يقال لنظام مسلّمات أنه غير تام إذا أمكن إضافة مسلمة جديدة مستقلة إليه بحيث يظل متآلفاً . أما إذا لم يمكن إضافة مسلمة جديدة مستقلة للنظام بحيث يظل متآلفاً فيقال له أنه نظام مسلّمات تام axiomatic system, complete</p>
<p>المحور التخيلى axis, imaginary</p> <p>(انظر : مستوى "أرجاند" Argand diagram)</p>	<p>مسلّماتان متكافئتان axioms, equivalent</p>


محور التماثل للمنحنى أو للسطح إن وجد .

محور قطع مكافئ axis of a parabola
المستقيم الواقع في مستوى القطع المكافئ
والذى يتماثل القطع بالنسبة إليه . فمثلاً إذا
أعطيت معادلة القطع المكافئ في الصورة
القياسية $y^2 = 4px$ س يكون محوره هو محور
السينات




(انظر الشكل) .

محور حزمة مستويات axis of a pencil of planes
الخط المستقيم الذى تمر به جميع مستويات
الحزمة . فمثلاً الخط P هو محور حزمة
المستويات بالشكل .




محور الدائرة axis of a circle
المستقيم المار بمركز الدائرة والعمودى على
مستواها

محور مخروط دائرى axis of a circular cone
الخط الواصل من رأس المخروط إلى مركز
قاعدته الدائرية .




محور أسطوانة دائرية axis of a circular cylinder
الخط الواصل بين مركزي قاعدتين متوازيتين
للأسطوانة الدائرية .



محور منحنى أو سطح axis of a curve or a surface

معجم الرياضيات

<p>محور الدوران axis of revolution</p> <p>خط مستقيم تدور حوله المنحنيات والمساحات المستوية لتوليد مساحات وأجسام دورانية ، ويكون هذا المستقيم محوراً للمثال في المساحات والحجوم الدورانية في حالة الدور الكاملة الكاملة .</p>	<p>محور الكرة axis of a sphere</p> <p>أى قطر من أقطار الكرة .</p>
<p>محور الدوران axis of rotation</p> <p>(انظر : محور الدوران axis of revolution)</p>	<p>محور الصادات axis of ordinates</p> <p>= محور ص = Y-axis</p> <p>محور الإحداثيات الصادية .</p>
<p>محور تماثل axis of symmetry</p> <p>يقال لخط مستقيم أنه محور تماثل لشكل هندسى (منحنى ، سطح ، ... إلخ) إذا كان لكل نقطة من نقط الشكل يوجد نقطة أخرى عليه بحيث يكون زوج النقطتين متماثلان بالنسبة للخط المستقيم ، بمعنى أن الخط المستقيم يكون عمودياً على القطعة المستقيمة الواصلة بين هاتين النقطتين وينصفها .</p> <p>فمثلاً العمود النصف لقاعدة المثلث المتساوى الساقين محور تماثل له (محور تماثل وحيد) .</p> <p>منصف أى زاوية من زوايا المثلث المتساوى الأضلاع محور تماثل له (ثلاث محاور تماثل) .</p>	<p>المحور المنظورى axis of perspectivity</p> <p>الخط المستقيم الذى تقع عليه نقط تقاطع كل مستقيمين متناظرين من مستقيمتين حزمتين فى وضع منظورى .</p>
<p>محور إسناد axis of reference</p> <p>أى خط مستقيم يستخدم للمساعدة فى تعيين مواضع النقط فى المستوى أو فى الفراغ . فمثلاً فى المستوى كل من المحورين السينى والصادى فى نظام الإحداثيات الديكارية محور للإسناد ، وكذلك المحور القطبى فى نظام الإحداثيات القطبية محور للإسناد . وفى الفراغ كل من المحاور السينى والصادى والعينى فى نظام الإحداثيات الديكارية محور للإسناد .</p>	



المحور الحقيقى
axis, real
(انظر : مستوى أرجاند)
Argand diagram

زاوية السميت لنقطة سماوية (فى الفلك)

azimuth of a celestial point

(انظر زاوية الساعة
hour angle
، و دائرة الساعة
hour circle)

سعة نقطة فى المستوى

azimuth of a point in a plane

الإحداثى القطبى الزاوى للنقطة .

(انظر : إحداثيات قطبية مستوية
polar coordinates in a plane)

محور الكرة السماوية

axis of the celestial sphere

المحور التخيلى الذى يتصور أن الكون يدور
حوله .

axis of the earth

محور الأرض

الخط المستقيم الذى تدور حوله
الأرض .

axis of x

محور السينات

= X-axis

= محور س

محور الإحداثيات السينية .

axis of z

محور العيانات

= Z - axis

= محور ع

محور الإحداثيات العينية .

axis, radical

المحور الأساسى



المحل الهندسى للنقط التى تتساوى أطوال

المماسات المرسومة منها لدائرتين معلومتين فى

مستوى واحد ، ويكون عمودياً على الخط المار

بمركزيهما . وإذا تقاطعت الدائرتان يكون المحور

فإن الراسم السمتي يقال له راسم عمودي
orthographic map .



رسم سمتي azimuthal map
إذا كان من سطحاً كروياً، بك مستوى مماساً
له، م نقطة على قطره العمودي على المستوى
ك، فإن الإسقاط الذي يرسم كل نقطة م من
نقط س إلى نقطة تقاطع الخط المستقيم م م مع
المستوى. يسمى راسم سمتي، وتسمى
النقطة م نقطة الإسقاط. وإذا كانت نقطة
الإسقاط هي نفسها مركز السطح الكروي فإن
الراسم السمتي يقال له راسم مركزي
gnomonic map أو central map، وإذا كانت
نقطة الإسقاط على بعد لا نهائي من السطح

(B)

نشعب برنامج في الخلفية .
انظر : برنامج في الخلفية
(background program)

برنامج في الخلفية

background program

برنامج يستخدم غالباً في العمليات
التجميعية ويتم تشغيله على دفعات
بصورة غير فورية كما سمحت ظروف
تحميل الحاسب .

خريطة مساندة backing chart

عدد معين من الخطوط الرأسية والأفقية
المطبوعة بطريقة ظاهرة للاستعانة بها في
إعداد الرسوم التخطيطية والأشكال المختلفة ،
مثل المخططات التجميعية block diagrams
وخرائط سير العمليات flow charts
وغيرها .

ذاكرة مساندة backing memory

ذاكرة تستخدم امتداداً للذاكرة الحاسب
الرئيسية عند الحاجة .

قوة دافعة كهربائية عكسية

back electromotive force

قوة دافعة كهربائية مضادة للقوة الدافعة
الكهربائية المؤثرة .

انظر : قوة دافعة كهربائية
(electromotive force)

حركة خلفية back space

تحريك وحدة الإدخال أو الإخراج خطوة
واحدة إلى الخلف .

ملف احتياطي back up file

نسخة إضافية من ملف يحتفظ بها كبديل
للملف المستخدم فعلاً .

نظام احتياطي للتشغيل

back up system

نسخة إضافية من نظام تشغيل يحتفظ بها
بديلاً للنظام المستخدم فعلاً .

تشغيل في الخلفية (في الحاسب)

background processing (in computer)

$\alpha > \beta$ وكانت الدالة هي النهاية من خلال
النقط لدوال تنتمي إلى فصول "بير" من أنواع
مناظرة لأعداد تسبق α .
فمثلاً فئة الدوال المتصلة تكون من فصل بير
من النوع $\alpha = 1$.

شرط "بير" **Baire, condition of**
يقال لفئة جزئية S_1 من فراغ طوبولوجي
 S_1 إنها تحقق شرط "بير" أو أنها تكاد تكون
مفتوحة تقريباً almost open إذا ، وفقط إذا ،
وجدت فئة واهية meager S_2 بحيث يكون
الفرق المتماثل :
($S_1 - S_2$) \cup ($S_2 - S_1$) فئة مفتوحة .

دالة "بير" **Baire function**
دالة حقيقية د بحيث تكون فئة جميع S التي
تحقق $D(S) < \infty$ ، حيث ∞ أى عدد
حقيقى ، فئة بوريلية Borel set .

خاصية "بير" **Baire, property of**
لفئة S_1 محتواة في فئة S_2 خاصية "بير" إذا
كانت كل فئة مفتوحة غير خالية K تحوى نقطة
تكون عندها S_1 أو مكملتها من النسق الأول .

خازنة مساندة **backing storage**
= خازنة ثانوية **= secondary storage**
وحدة أو أكثر لتخزين البيانات خارج ذاكرة
الحاسب الرئيسية .

قانون النمو البكتيرى
bacterial growth, law of
= قانون النمو العضوى
= law of organic growth
القانون الذى ينص على أن معدل الزيادة في
حجم تجمع بكتيرى ينمو دون قيد في وجود غذاء
وفير يتناسب مع عدد البكتيريا الموجودة .
ويمثل القانون رياضياً بالمعادلة التفاضلية :
$$\frac{dx}{dt} = kx$$

حيث k ثابت ، t الزمن ، x عدد البكتيريا الموجودة . وحل هذه المعادلة هو :
$$x = x_0 e^{kt}$$

حيث x_0 أساس اللوغاريتم
الطبيعى ، k ثابت يساوى عدد البكتيريا عندما
 $t=0$ = صفر .

فصل "بير" من نوع α
Baire class α
تنتمي الدالة إلى فصل "بير" من نوع α إذا
لم تكن تنتمي لفصل "بير" من نوع β لكل

إذا كانت كل القيم في مدى خطأ معين لها نفس الاحتمال وكانت النهايتان العظمى والصغرى للمدى متساويتين في القيمة ومختلفتين في الإشارة فإنه يكون للمدى خطأ متوازن .

كرة ball

إذا كانت $s \in \mathbb{R}^n$ ، $k < \infty$ ، فإن فئة النقط $s \in \mathbb{R}^n$ بحيث $|s| - |s| > k$ (أو $|s| - |s| \geq k$) تسمى الكرة المفتوحة (أو المغلقة) التي مركزها s ونصف قطرها k .

بندول المقذوفات ballistic pendulum
جهاز لتعيين السرعة النسبية للمقذوفات ومقاومة الهواء لها .

علم القذائف ballistics
دراسة حركة القذائف ، وتنقسم إلى دراسة حركة القذائف بعد انطلاقها (exterior ballistics) ودراسة حركة القذائف داخل الماسورة في مدفع الإطلاق (interior ballistics) .

جبر "بناخ" Banach algebra
(انظر : جبر algebra) .

أويكون للفئة سر خاصية "بير" إذا ، فقط إذا ، أمكن جعلها فئة مفتوحة (أو مغلقة) بإضافة (أو حذف) فئات مناسبة من النسق الأول .

نظرية النسق لـ "بير"

Baire's category theory

نظرية تنص على أن الفراغ المقياسي التام complete metric space يكون من النسق الثاني في نفسه ، أي أن تقاطع أي متتابعة من الفئات المفتوحة المكتظة في فراغ مقياسي تام تكون مكتظة . مثال ذلك فراغ جميع الدوال المتصلة على الفترة المغلقة [صفر ، ١] يكون فراغاً مقياسياً تاماً إذا عرفنا البعد بين أي دالتين d, s على أنه أصغر أعلى حد للمقدار : $|d(s) - s(s)|$.

جميع عناصر هذا الفراغ التي تكون قابلة للتفاضل عند نقطة أو أكثر من نقط الفترة [صفر ، ١] تكون من النسق الأول first category في الفراغ ، وبالتالي فإن فئة الدوال المتصلة وغير القابلة للتفاضل عند أي نقطة من نقط الفترة [صفر ، ١] تكون من النسق الثاني .

خطأ متوازن balanced error

<p>نظرية "بناخ وشتاينهاوس" .</p> <p>Banach - Steinhau theorem</p> <p>إذا كان S، S فراغين من فراغات "بناخ" وكانت M_1 ، M_2 ، ... متتابعة من التحويلات الخطية المحدودة من S إلى S وكانت الفئة $\ M_1(S)\$ ، $\ M_2(S)\$ ، ... محدودة لكل $S \in S$، فإنه يوجد عدد K بحيث أن $\ M_n(S)\ \geq K \ S\$ لكل $S \in S$ $\exists S$ ولكل n.</p>	<p>فراغ "بناخ" Banach space</p> <p>فراغ اتجاهى فوق حقل الأعداد الحقيقية أو المركبة يصاحب كل عنصر S فيه عدد حقيقى $\ S\$ يسمى مقياس أو معيار (norm) S ويحقق الفروض :</p> <p>(١) $\ S\ \geq 0$ صفر إذا كان $S \neq 0$ صفرًا،</p> <p>(٢) $\ aS\ = a \ S\$ لكل عدد a،</p> <p>(٣) $\ S+T\ \leq \ S\ + \ T\$ لكل S, T.</p>
<p>نظرية "هان و بناخ"</p> <p>Banach theorem, Hahn</p> <p>نفرض أن K فئة جزئية خطية من فراغ "بناخ" "س" وأن "د" دال خطى حقيقى متصل معرفة على K، يوجد دال خطى حقيقى متصل معرفة على كل $S \in S$ بحيث يكون :</p> <p>(١) $d(S) = r(S)$ لكل $S \in K$ $\exists K$...</p> <p>(٢) معيار d على K يساوى معيار r على S،</p> <p>إذا كان S فراغ "بناخ" مركب فإن d، r قد تكونان مركبتى القيم .</p>	<p>(٤) الفراغ يكون تاماً complete ، حيث الجوار لعنصر S هو فئة كل T بحيث $\ S-T\ < \epsilon$ لعدد ثابت ϵ .</p> <p>ويكون فراغ "بناخ" حقيقياً real Banach space أو مركباً complex Banach space تبعاً لما إذا كان الفراغ الاتجاهى فوق حقل الأعداد الحقيقية أو حقل الأعداد المركبة . ومن أمثلة فراغات "بناخ" : فراغات "هلبرت" Hilbert spaces ، الفراغات L^p ($1 \leq p < \infty$) لجميع المتتابعات $S = (S_1, S_2, \dots)$ بحيث $\sum_{n=1}^{\infty} S_n ^p < \infty$ يكون محدوداً ،</p>
<p>نظرية النسق لـ "بناخ"</p> <p>Banach's category theorem</p>	<p>$\ S\ = \left[\sum_{n=1}^{\infty} S_n ^p \right]^{\frac{1}{p}}$</p>

معجم الرياضيات

شيك يصدره بنك ويصرف من حساب البنك لدى بنك آخر في مدينة أخرى .

بنك ادخار مشترك

bank, mutual saving

بنك يقتصر رأسماله على أموال المودعين المشتركين في ملكيته .

ورقة مصرفية (بنكنوت) banknote
صك يعطى من البنك يتعهد فيه بدفع القيمة لحامله ويتداول كعملة .

٢ - قضيب bar

١ - جسم طوله أكبر بكثير من مساحة مقطعه العرضي .

٢ - يستخدم المصطلح أيضاً كإحدى

علامات التجميع

(أنظر : علامات التجميع)
aggregation, signs of

بار بار

وحدة لقياس الضغط ، وتعادل مليون دايين على السنتيمتر المربع .


إذا كانت سـ فئة محتواة في فراغ طوبولوجى كـ (من النوع كـ) من النسق الثانى فى كـ ، فإنه توجد فئة مفتوحة غير خالية و \exists كـ ، بحيث تكون سـ من النسق الثانى عند كل نقطة من نقط و . ينتج من هذه النظرية أن أى فئة جزئية من كـ تكون من النسق الأول فى كـ إذا كانت من النسق الأول عند كل نقطة من نقط كـ .

الخصم المصرفى bank discount

خصم يساوى الربح البسيط للعقد ما ويكون هذا الربح مضمناً فى القيمة الاسمية للعقد ويدفع مقدماً . فمثلاً عند أخذ قرض مقداره مائة جنيه من بنك بسعر ٦ ٪ لمدة سنة فإن البنك يدفع مبلغ أربعة وتسعين جنيهاً حيث يكون الخصم المصرفى ستة جنيهات . وفى هذا المثال إذا دفع المدين مائة جنيه فى نهاية السنة فإنه يكون فى الحقيقة قد سدد المبلغ بفائدة قدرها ٣٨ , ٦ ٪ أما لو كانت الفائدة ٦ ٪ فقط فالخصم الحقيقى true discount هو ٦٦ , ٥ ٪ لا ٦٠ , ٦ ٪ جنيهات كما هو الحال فى الخصم المصرفى .

bank draft

حوالة بنكية


<p>barotropic fluid مائع باروتروبي</p> <p>مائع تتوقف كثافته على الضغط فقط .</p>	<p>bar diagram مخطط أعمدة</p> <p>= bar graph</p> <p>شكل لتمثيل البيانات الإحصائية يتألف من أعمدة يمثل كل منها كمية ما ، وأطوالها تتناسب مع هذه الكميات . والشكل التالي يمثل مخطط أعمدة .</p> 
<p>barycentre مركز الكتلة</p> <p>(انظر : مركز الكتلة centre of mass)</p>	
<p>مركز كتلة تبسيطة</p> <p>barycentre of a simplex</p> <p>إذا كانت $S^n = \langle 1, 0, \dots, 0 \rangle$ تبسيطة رؤوسها النقط $1, 0, \dots, 0$ ، فإن النقطة التي تكون إحداثياتها الكتلية بالنسبة للرؤوس $1, 0, \dots, 0$ ، $0, 1, \dots, 0$ ، $0, 0, \dots, 1$ جميعها متساوية تسمى مركز كتلة التبسيطة S^n .</p>	
<p>الإحداثيات الكتلية</p> <p>barycentric coordinates</p> <p>إذا كانت M ، m_1 ، m_2 ، \dots ، m_r نقاطا مستقلة خطياً عددها $(r+1)$ في الفراغ الإقليدي النسوي البعد n ، فإن الأعداد الحقيقية λ_1 ، λ_2 ، λ_3 ، \dots ، λ_r بحيث</p> $\lambda_1 m_1 + \lambda_2 m_2 + \dots + \lambda_r m_r = 0$ $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_r = 1$	<p>bar magnet قضيب مغنطيسي</p> <p>قضيب مستقيم مساحة مقطعة α صغيرة وثابتة ، وشدة مغنطته الطولية I منتظمة . وهو يناظر قطبين مغنطيسيين شدتهما $\pm \alpha I$ عند طرفيه .</p>
<p>baroclinic fluid مائع باروكلينيكي</p> <p>مائع تتوقف كثافته على الضغط وعلى متغيرات أخرى كدرجة الحرارة .</p>	

زاويتا قاعدة شبه المنحرف

bases angles of a trapezoid

زاويتا شبه المنحرف اللتان تشتركان في قاعدته
كضلع. ففي الشكل الزاويتان \angle ب ح، \angle ح د
زاويتا القاعدة ب ح لشبه المنحرف \angle ب ح، \angle ح د.

(انظر : قاعدتا شبه المنحرف
bases of a trapezoid)



زاويتا القاعدة لمثلث

base angles of a triangle

زاويتا المثلث اللتان تشتركان في قاعدة المثلث
كضلع لهما .

base curve

منحنى أساس

منحنى على سطح مسطر (ruled surface)

تسمى الإحداثيات الكتلية للنقطة م بالنسبة لفئة

النقط م . $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$

التجزئة الكتلي الأول

barycentric subdivision, first

إذا كانت $s^m = \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \rangle$ تبسيطة
رؤوسها النقط $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ وكانت
س^ل هي مركز كتلة الوجه

س^ل = $\langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \rangle$ وكانت α له
هي عدد التبسيطات التي بعدها ك في الفئة
المكونة من س^ل وجميع أوجهها ، فإن التبسيطة
التي رؤوسها النقط س^ل ، حيث له = 0 ،
 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m = 1, \dots, \alpha$ تسمى
التجزئة الكتلي الأول للتبسيطة س^ل .

أساس (في الحاسب) **base**

عنوان يدل على نقطة البداية لمجموعة من
البيانات أو التعليمات .


عنوان أساس (في الحاسب)

base address

عنوان يستخدم للحصول على عناوين مطلقة
من أخرى نسبية .

<p>= أساس محلي عند نقطة = local base at a point</p> <p>يقال لفصل \mathcal{F} من الفئات المفتوحة إنه أساس محلي عند نقطة s إذا كانت s تنتمي لكل عنصر من عناصر \mathcal{F} وكانت كل فئة مفتوحة من الفئات التي تحوي s أيضاً عنصراً من عناصر \mathcal{F}.</p>	<p>يقابل كل مولد للسطح مرة واحدة فقط .</p> <p>أساس جزئي لبنية طوبولوجية base for a topology, sub-</p> <p>فصل \mathcal{F} من الفئات المفتوحة بحيث يكون فصل جميع التقاطعات النهائية لعناصر من \mathcal{F} أساساً للبنية الطوبولوجية للفراغ .</p>
<p>أساس جزئي لجوارات نقطة base for the neighbourhood system of a point, sub-</p> <p>= أساس محلي جزئي عند نقطة = local sub- base at a point</p> <p>فصل \mathcal{F} من الفئات التي تحوي النقطة بحيث يكون فصل جميع التقاطعات النهائية لعناصر من \mathcal{F} أساساً محلياً عند النقطة .</p>	<p>أساس لتناسق base for a uniformity</p> <p>يقال لعائلة جزئية \mathcal{F} من تناسق \mathcal{U} إنها أساس له إذا كان كل عنصر من عناصر \mathcal{U} يحوي عنصراً من عناصر \mathcal{F}.</p>
<p>أساس لمجموعة الجوارات لفئة base for the neighbourhood system of a set</p> <p>عائلة من جوارات الفئة \mathcal{F} يحوي كل جوار لها عنصراً من عناصر العائلة .</p>	<p>أساس جزئي لتناسق base for a uniformity, sub-</p> <p>يقال لعائلة جزئية \mathcal{F} من تناسق \mathcal{U} أنها أساس جزئي له إذا كانت عائلة التقاطعات النهائية لعناصر \mathcal{F} أساساً للتناسق \mathcal{U}.</p>
<p>أساس فراغ طوبولوجي base for topological space</p>	<p>أساس لمجموعة الجوارات لنقطة base for the neighbourhood system of a point</p>

إذا كان دليل السطح الأسطوانى منحنياً مغلقاً ، فإن الأسطوانة المكونة من جزء السطح الأسطوانى المحصور بين مستويين موازيين لمستوى الدليل تكون لها قاعدتان هما المنطقتان المستويتان المحصورتان داخل منحنى تقاطع المستويين مع السطح الأسطوانى .



القاعدة السفلى لمخروط ناقص

base of a frustum of a cone, lower

إذا كان لدينا مخروطاً وحصلنا منه على مخروط ناقص بقطعه بمستوى يوازي قاعدته فإن القاعدة السفلى للمخروط الناقص الناشء تكون هي نفسها قاعدة المخروط الأصيل .

(انظر الشكل)



القاعدة
العليا

القاعدة
السفلى

فصل ٤ من الفئات المفتوحة للفراغ الطوبولوجى بحيث تكون كل فئة مفتوحة من فئات الفراغ اتحاداً لبعض عناصر الفئة ٤ . فمثلاً فصل الفترات المفتوحة أساس لبنية طوبولوجية على فئة الأعداد الحقيقية .

المبلغ الأصيل (فى الرياضيات المالية)


base (in mathematics of finance)

مبلغ من المال تخصص منه نسبة مئوية أو تحسب عنه فائدة .

base of a cone

قاعدة مخروط

المنطقة المستوية داخل المنحنى الناشء عن تقاطع مستوى يوازي مستوى الدليل مع السطح المخروطى .



(قاعدة المخروط)

base of a cylinder


قاعدة الأسطوانة

قاعدة شكل هندسى
base of a geometric configuration
 ضلع (أو وجه) للشكل الهندسى المستوى
 (أو الجسم) يقام عليه ارتفاع الشكل .

أساس اللوغاريتم
base of a logarithm
 فى العلاقة $y = \log_m x$ يسمى y أساس
 اللوغاريتم كما يسمى x لوغاريتم العدد y
 للأساس m .


أساس القوة
base of a power
 فى المقدار a^x يسمى a أساس القوة له .

قاعدة هرم
base of a pyramid
 المنطقة المستوية المحدودة بمضلع تصل قطع
 مستقيمة بين نقطه ونقطة واقعة خارج مستواه
 (رأس الهرم) .



القاعدة العليا لمخروط ناقص
base of a frustum of a cone, upper
 مقطع المخروط الأسمى بالمستوى القاطع .
 (انظر التعريف السابق والشكل) .

القاعدة السفلى لهرم ناقص
base of a frustum of a pyramid, lower
 إذا كان لدينا هرم وحصلنا منه على هرم
 ناقص بقطعه بمستوى يوازي قاعدته فإن القاعدة
 السفلى للهرم الناقص الناشئ تكون هى نفسها
 قاعدة الهرم الأسمى .
 (انظر الشكل)



القاعدة العليا لهرم ناقص
base of a frustum of a pyramid, upper
 مقطع الهرم الأسمى بالمستوى القاطع
 (انظر التعريف السابق والشكل) .

أساس نظام عددي

base of a system of numbers

عدد الوحدات التي يجب أن تؤخذ في منزلة من منازل نظام عددي معين لتكون وحدة في المنزلة الأعلى مباشرة . ففي النظام العشري مثلاً ، عشر وحدات في منزلة الأحاد تصبح وحدة في المنزلة الأعلى مباشرة أى منزلة العشرات . وإذا كان أساس النظام العددي ١٢ فإن كل اثنتى عشرة وحدة وحدة في منزلة الأحاد تصبح وحدة في المنزلة الأعلى مباشرة ، فمثلاً العدد ٢٣ في هذا النظام يعنى $2 \times 12 + 3$. وبصفة عامة أى عدد صحيح لاي أساس يكون على صورة :

$a_0 + a_1(\text{الأساس}) + a_2(\text{الأساس})^2 + \dots$ حيث a_0, a_1, a_2, \dots أعداداً غير سالبة أصغر من الأساس . أما إذا كان العدد واقعاً بين صفر ، ١ فيمكن كتابته على الصورة :

$$0.a_1 a_2 a_3 \dots = \frac{a_1}{(\text{الأساس})} + \frac{a_2}{(\text{الأساس})^2} + \frac{a_3}{(\text{الأساس})^3} + \dots$$

قاعدة مثلث


base of a triangle

أى ضلع من أضلاع المثلث

قاعدتا متوازي أضلاع

bases of a parallelogram


ضلعان متوازيان في متوازي الأضلاع . في الشكل القاعدتان هما : AB ، CD أو : AD ، BC .



قاعدتا منشور

bases of a prism

وجهان متوازيان للمنشور محدودان بمضلعين متطابقين . في الشكل القاعدتان هما $ABCD$ ، $A'B'C'D'$ أو $ABCD$ ، $A'B'C'D'$.



إذا كان s_1, s_2, \dots, s_n أساساً
لفراغ اتجاهي فإن الصيغ
 s_1, s_2, \dots, s_n
تسمى صيغاً أساسية من رتبة n .

الأساس المرافق **basis, dual**
إذا كان s_1, s_2, \dots, s_n أساساً
المرافق يكون فئة الدالات الخطية
 $\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ المعرفة بالعلاقة
 $d_i(s_j) = \delta_{ij}$

توسيع إلى أساس

basis, extension to a

إذا كان s_1, s_2, \dots, s_n أساساً
وكانت e فئة جزئية من s_1, s_2, \dots, s_n
المتجهات المستقلة خطياً حيث $n > r$ ،
وكان e أساساً للفراغ s_1, s_2, \dots, s_n
فإن e يكون توسيعاً للفئة e إلى أساس
للفراغ s_1, s_2, \dots, s_n .


basis, Hamel

أساس "هاميل"

قاعدتا شبه المنحرف

bases of a trapezoid

الضلعان المتوازيان في شبه المنحرف . في
الشكل القاعدتان هما a ، b .



BASIC

بيسيك

لغة من لغات الحاسب تستخدم أساساً
في الأغراض التعليمية ، والمصطلح الأجنبي
مكون من أوائل حروف كلمات العبارة :

beginners all - purpose symbolic instruction
code

بيانات أساسية (إحصاء)

basic data (statistics)

البيانات التي تبدأ بها الدراسة الإحصائية ،
وتسمى أيضاً البيانات الخام raw data .

basic forms

الصيغ الأساسية

: معجم الرياضيات

<p>إذا كان S فراغاً اتجاهياً نونى البعد فإن النونية المرتبة (s_1, s_2, \dots, s_n) من عناصر S، بحيث تكون الفئة $\{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ أساساً للفراغ S تسمى أساساً مرتباً له.</p> <p>أساس متعامد basis, orthogonal أساس لفراغ اتجاهى عناصره متعامدة مثنى مثنى.</p> <p>أساس عيارى متعامد basis, orthonormal = normalized orthogonal basis = normal orthogonal basis أساس متعامد معيار كل عنصر من عناصره هو الوحدة.</p> <p>الأساس القياسى basis, standard إذا كان V حقلاً فإن الأساس المرتب (e_1, e_2, \dots, e_n) للفراغ (V) حيث $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$، $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$، $e_n = (0, 0, \dots, 1)$ يسمى</p>	<p>إذا كان S فراغاً اتجاهياً فوق حقل F فإنه توجد فئة E من عناصر S بحيث :</p> <p>(١) تكون عناصر أى فئة نهائية جزئية من E مستقلة خطياً.</p> <p>(٢) يمكن التعبير عن كل عنصر من عناصر S كارتباط خطى نهائى لعناصر من E ومعاملاته عناصر من F. فمثلاً يوجد أساس "هاميل" لفئة الأعداد الحقيقية، على اعتبار أنها فراغ اتجاهى فوق حقل الأعداد القياسية. كل عدد حقيقى s يمكن كتابته على الصورة $s = \sum_{i=1}^n a_i e_i$ بطريقتين وحيدة، حيث a_i أعداداً قياسية، $s \in S$ عناصر فى F.</p> <p>أساس فراغ اتجاهى basis of a vector space فئة E من متجهات الفراغ بحيث :</p> <p>(١) تكون E فئة مستقلة خطياً.</p> <p>(٢) يكون كل متجه من متجهات الفراغ ارتباطاً خطياً من متجهات E. فمثلاً المتجهات $(1, 0)$، $(0, 1)$ أساس للفراغ H^2 والمتجهات $(1, 1)$، $(1, -1)$ أيضاً أساس للفراغ H^2.</p> <p>أساس مرتب basis, ordered</p>
---	---

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>ب معلومة عندما لا يكون هناك شيئاً معلوماً عن وقوع الحدث ٢ ،</p> <p>(٣) الاحتمال الشرطى ل (٢ ، ب_١) لوقوع الحدث ٢ بشرط وقوع الحدث ب_١ معلوماً لجميع قيم ب_١ من ١ إلى ن ،</p> <p>فإن الاحتمال البعدى ل (ب_١ ، ٢) لوقوع الحدث ب_١ بشرط وقوع الحدث ٢ يعطى بالعلاقة :</p> $L(B_1, 2) = \frac{L(B_1, 2) \cdot L(2)}{L(2)}$	<p>الأساس القياسى للفراغ (٥) .</p> <p>شرذمة batch عدد من المفردات المتجانسة مثل : شرذمة بطاقات batch of cards ، شرذمة برامج batch of programs .</p> <p>تشغيل على دفعات batch processing تشغيل فى الخلفية لعدد من البرامج أو التعاملات .</p>
<p>تشفير ثنائى لأرقام النظام العشرى BCD (انظر : binary coded decimal)</p> <p>زاوية وجهة نقطة بالنسبة لأخرى bearing of a point with reference to another point</p> <p>الزاوية التى يصنعها الخط المستقيم المار بالنقطتين مع اتجاه شمال - جنوب .</p>	<p>بود baud وحدة لقياس سرعة وصول الإشارات فى الشفرات البرقية ، وينسب المصطلح إلى العالم الفرنسى " بودو " (١٩٠٣) (Baudot 1903) .</p>
<p>زاوية وجهة خط مستقيم bearing of a straight line</p>	<p>نظرية " بايز " (فى الاحتمالات) Bayes theorem (In probability) إذا كان : (١) الحدث ٢ ممكن الوقوع وذلك فقط عندما يقع واحد من الأحداث ب_١ ، ب_٢ ، ... ، ب_ن ، (٢) الاحتمالات القبلية ل (ب_١) للأحداث</p>

الزاوية التي يصنعها الخط المستقيم مع اتجاه
شمال - جنوب .

مسألة " بهرين وفيشر "

Behren's- Fisher problem

مسألة تعيين احتمال سحب عینتين عشوائيتين
الفرق بين وسطيهما له (له قد تساوى الصفر)
لمجتمعين يتبعان التوزيع الطبيعي والفرق بين
وسطيهما معلوم ، بينها النسبة بين تباينهما مجهولة .

دالة " بي " **Bei-function**

(انظر : دالة " بر " Ber function)

الانتماء (ورمزه \in)

belonging (\in)


يكون العنصر P متتمياً إلى فئة S إذا كان P
عنصراً من عناصرها ، ويكتب في هذه الحالة
 $P \in S$.

أما عدم الانتماء فرمزه \notin ، أى أنه إذا لم يكن
 P عنصراً من عناصر S فيكتب $P \notin S$.

bend point

نقطة انحناء

نقطة على منحنٍ مستوي يكون للإحداثي
الصادي عندها قيمة عظمى أو صغرى .



bending

انحناء


التغير في التقوس

(انظر : تقوس curvature)

bending moment

عزم الانحناء

المجموع الجبري لجميع عزوم القوى المؤثرة في
جانب واحد من مقطع قضيب مرن عمودي على
محوره حول مركز سطح هذا المقطع .



المستفيد (تأمين)

beneficiary (insurance)

الشخص الذي تدفع له قيمة وثيقة تأمين
واسمه وارد فيها .

تعويضات وثيقة تأمين

benefits of an insurance policy

المبلغ أو المبالغ التي تتعهد شركة التأمين بدفعها حال وقوع حادثة معينة طبقاً لشروط الوثيقة .

دالة "بر" Ber function

تعرف دالة بر ودالة برى بالمعادلة :


$$بر(ع) = \pm ت(ع) = ج(ع) = \left(\frac{ط}{٤} \right)^{\pm ١}$$

حيث الدالتان من درجة ١ في المتغير المركب ع ،
ت = $\sqrt{١-ع}$ ، ج = دالة بسل في درجة ١ في ع .

منحنى "ليمنسكيت برنولى"
(منحنى فيونكة برنولى)

Bernoulli, lemniscate curve of

المحل الهندسى المستوى لموقع العمودى من مركز قطع زائد قائم على مماس متغير للقطع .



أو المحل الهندسى لرأس مثلث حاصل ضرب طولى الضلعين المجاورين للرأس فيه يساوى ربع مربع طول الضلع الثالث . ومعادلة هذا المنحنى بدلالة الإحداثيات القطبية

(١، ٠) هى $ر^٢ = ٢$ جتا ٢θ ، حيث القطب هو عقدة المنحنى ، والمحور القطبى هو خط تمثله ، أكبر بعد بين القطب والمنحنى (انظر الشكل) .

وبدلالة الإحداثيات الديكارتية معادلته هى
(س + ص) = (س - ص) ٢ .
وأول من درس هذا المنحنى هو "جاك برنولى" Jacques Bernoulli (١٧٠٥) .

معادلة "برنولى" Bernoulli's equation
معادلة تفاضلية على الصورة :

$$\frac{ص}{س} + ص د(س) = ص م(س)$$

أعداد "برنولى" Bernoulli's numbers

(١) القيم العددية لمعاملات

$$\frac{س^٢}{٢!} ، \dots ، \frac{س^٤}{٤!} ، \dots ، \frac{س^{٢٠}}{٢٠!} \dots$$

في مفكوك $\left(\frac{س}{١-س} \right)$.

باستبدال $س$ بمتسلسلتها الأسية والقسمة على مفكوك $(١-س)$ نحصل على خارج القسمة ، والحدود الأربعة الأولى منه هى

$$١ + \left(\frac{١}{٢} \right) س + \left(\frac{١}{٦} \right) \frac{س^٢}{٢!} + \left(\frac{١}{٣٠} \right) \frac{س^٤}{٤!}$$

<p>كثيرات حدود "برنولي"</p> <p>Bernoulli's polynomials</p> <p>(١) كثيرات الحدود $B_n(x)$ المعرفة كالآتي:</p> $B_n(x) = \frac{1}{n!} \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} B_k(x) \right)$ <p>وكثيرات حدود برنولي الأربع الأولى هي:</p> $B_0(x) = 1, B_1(x) = x - \frac{1}{2}, B_2(x) = x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}, B_3(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{4}, B_4(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{30}$ <p>وينتج أن</p> $B_n(1) = B_n(0) = \begin{cases} 1 & \text{if } n=0 \\ 0 & \text{if } n \geq 1 \end{cases}$ <p>(٢) كثيرات الحدود $B_n(x)$ المعرفة كالتالي:</p>	<p>وكل الحدود الفردية بعد الحد $\frac{1}{2}$ (س) تختفى.</p> <p>سنرمز لأعداد برنولي بالرموز B_1, B_2, \dots</p> $B_1 = \frac{1}{6}, B_2 = \frac{1}{30}, B_3 = \frac{1}{42}, B_4 = \frac{1}{30}, B_5 = \frac{1}{42}, B_6 = \frac{1}{42}, B_7 = \frac{1}{42}, B_8 = \frac{1}{42}, B_9 = \frac{1}{42}, B_{10} = \frac{1}{42}$ <p>وبصفة عامة،</p> $B_n(x) = \frac{1}{n!} \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} B_k(x) \right)$ <p>(٢) الأعداد المعرفة بالعلاقة:</p> $B_n(x) = \frac{1}{n!} \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} B_k(x) \right)$ <p>ويلاحظ أن:</p> $B_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } n=0 \\ 0 & \text{if } n \geq 1 \end{cases}$ <p>وأن $B_n(x) = 0$ صفراً لجميع $n < 1$</p> $B_1(x) = x - \frac{1}{2}, B_2(x) = x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{6}, B_3(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{4}, B_4(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{30}$ <p>حيث $B_n(x)$ الحد النوني في كثيرة حدود "برنولي".</p>
--	---

<p>« جيمس برنولى » (١٧٠٥)</p> <p>محاولات « برنولى » Bernoulli's trials الحدثان المتنافيان في عملية عشوائية لا ينتج عنها إلا هذان الحدثان .</p>	$y = \frac{1 - y^{\infty}}{1 - y} = \frac{1 - y^{\infty}}{1 - y}$ <p>ويجب ملاحظة أن :</p> $\varphi_n(e) = \left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ ب } n(e) - 1 \text{ ب } n(e) \end{array} \right\}$ <p>φ (صفر) = صفرًا . وتنسب إلى عالم الرياضيات « دانييل برنولى » (١٧٨٢)</p>
<p>معادلة « برثلو » Berthelot equation معادلة تحدد العلاقة بين ضغط غاز وحجمه ودرجة حرارته ، والمصطلح منسوب إلى الفيزيقي « برثلو » .</p>	<p>نظرية « برنولى » (في الاحتمالات) Bernoulli's theorem (in probability) حالة خاصة من نظرية النهاية المركزية central limit theorem وذلك عندما يكون للمتغير قيمتان يسميان النجاح والفشل ، واحتمال النجاح p واحتمال الفشل $1 - p$.</p>
<p>منحنى « برتراند » Bertrand curve منحنى أعمدته الأساسية هي الأعمدة الأساسية لمنحنى آخر .</p>	<p>نظرية « برنولى » (في الإحصاء) Bernoulli's theorem (in statistics) إذا كان :</p>
<p>فرضية « برتراند » Bertrand postulate يوجد دائماً عدد أولي واحد على الأقل بين n ، $2n-2$ ، بشرط كون n عدداً صحيحاً أكبر من ٣ . مثال ذلك ، إذا كانت $n=4$ فإن $2n-2=6$ ، والعدد الأولي ٥ يقع بين ٤ ، ٦ . وقد ثبتت صحة فرضية « برتراند » وهي بذلك نظرية صحيحة .</p>	<p>(١) p احتمال وقوع الحدث A في محاولة ، (٢) $\frac{p}{n}$ النسبة المشاهدة للحدث A في n من المحاولات ، (٣) X_n احتمال أن يكون $\left \frac{X_n}{n} - p \right > \epsilon$ ، حيث ϵ عدد اختياري أكبر من الصفر ، فإن نهاية X_n عندما $n \rightarrow \infty$ هي الواحد الصحيح . والنظرية تنسب إلى الرياضى</p>

<p>دوال "بسل" من النوع الأول</p> <p>Bessel functions of the first kind</p> <p>الدالة</p> $J_\nu(x) = \frac{1}{\Gamma(\nu+1)} \left(\frac{x}{2} \right)^{\nu+1} - \frac{1}{2^{\nu+1} \Gamma(\nu+1)} \left(\frac{x}{2} \right)^{\nu+3} + \dots$ <p>تسمى دالة بسل من النوع الأول سعتها x ودرجتها ν ، وهي حل لمعادلة بسل التفاضلية</p> $x^2 y'' + x y' + (x^2 - \nu^2) y = 0$ <p>معاملات "بسل" Bessel's coefficients</p> <p>معاملات بسل التي سعتها x ومن الرتبة ν هي نفسها دالة بسل من النوع الأول $J_\nu(x)$.</p> <p>معادلة "بسل" التفاضلية</p> <p>Bessel's differential equation</p> <p>المعادلة التفاضلية</p> $x^2 y'' + x y' + (x^2 - \nu^2) y = 0$ <p>معادلة "بسل" التفاضلية في الصورة القياسية</p> <p>Bessel's differential equation in normal form</p>	<p>دوال "بسل" المعدلة</p> <p>Bessel functions, modified</p> <p>دوال "بسل" المعدلة من النوعين الأول والثاني هي :</p> <p>$I_\nu(x)$ و $K_\nu(x)$ حيث $I_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k! \Gamma(\nu+k+1)} \left(\frac{x}{2} \right)^{2k+\nu}$ و $K_\nu(x) = \frac{1}{2} \left(I_{-\nu}(x) - I_\nu(x) \right)$ حيث $J_\nu(x)$ دالة بسل من النوع الأول من درجة ν.</p> <p>هذه الدوال تكون حقيقية إذا كانت ν حقيقية ، x موجبة . أيضاً $I_\nu(x)$ حل لمعادلة "بسل" التفاضلية المعدلة .</p> <p>كما أن :</p> $I_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k! \Gamma(\nu+k+1)} \left(\frac{x}{2} \right)^{2k+\nu}$ <p>الدالتان I_ν ، $I_{-\nu}$ حلان مستقلان لمعادلة بسل التفاضلية المعدلة عندما لا تكون ν عدداً صحيحاً ، بينما تكون K_ν حلاً ثانياً إذا كانت ν عدداً صحيحاً . هذه الدوال تحقق عدداً من العلاقات التكرارية مثل :</p> $I_{\nu-1}(x) - I_{\nu+1}(x) = \left(\frac{\nu}{x} \right) I_\nu(x)$ $K_{\nu-1}(x) - K_{\nu+1}(x) = \left(\frac{\nu}{x} \right) K_\nu(x)$
--	--

$$\frac{1}{n} \left[\frac{1}{2} d(s) d(s) \right] \leq \frac{1}{n} [s(s)]$$

ولأى دوال ذات قيم مركبة

$$\frac{1}{n} \left[\frac{1}{2} d(s) d(s) \right] \leq \frac{1}{n} [s(s)]$$

$$\frac{1}{n} \left[\frac{1}{2} d(s) d(s) \right] \leq \frac{1}{n} [s(s)]$$

ومتباينة بسل صحيحة لجميع قيم له إذا افترض أن الدوال د، د، د، د، ... قابلة للتكامل بطريقة "ريمان" (أو بصفة عامة إذا كانت قابلة للقياس بطريقة "ليبيج" وكانت مربعاتها قابلة للتكامل أيضاً بطريقة "ليبيج").

(٢) لفراغ اتجاهى معرف عليه ضرب داخلى $\langle s, s \rangle$ ولفئة $s_1, s_2, s_3, \dots, s_n$ من المتجهيات المعيرة المتعامدة متباينة بسل هى:

$$\langle s, s \rangle = \left| \sum_{i=1}^n s_i \right|^2 \leq \sum_{i=1}^n |s_i|^2$$

$$\frac{1}{n} \left[\frac{1}{2} d(s) d(s) \right] \leq \frac{1}{n} [s(s)]$$

Beta

بيتا

الحرف الثانى من حروف الأبجدية اليونانية .

إذا وضعنا $v = e - \frac{1}{2} y$ فى معادلة بسل التفاضلية

$$e^2 \left(\frac{1}{2} v + \frac{1}{2} e \right) + \frac{1}{2} v = 0$$

نحصل على المعادلة

$$e^2 \left(\frac{1}{2} v + \frac{1}{2} e \right) + \frac{1}{2} v = 0$$

المسماة الصورة القياسية لمعادلة بسل

معادلة "بسل" التفاضلية المعدلة

Bessel's differential equation, modified

المعادلة التفاضلية

$$e^2 \left(\frac{1}{2} v + \frac{1}{2} e \right) + \frac{1}{2} v = 0$$

متباينة "بسل" Bessel's inequality


(١) لأى دالة حقيقية د (س) ولفئة معيرة متعامدة من الدوال الحقيقية د، د، د، ... على فترة (٢، ب) متباينة بسل هى:

$$\frac{1}{n} \left[\frac{1}{2} d(s) d(s) \right] \leq \frac{1}{n} [s(s)]$$

أفرض أن κ زمرة بيتي الرائية البعد لتبسيط
تركيبية κ ناشئة عن استخدام زمرة κ . إذا
كانت زمرة الأعداد الصحيحة معيار κ ،
حيث κ عدد أولي، فإن κ تكون حقلاً، κ
فراغاً (اتجاهياً) خطياً وبعد κ هو عدد بيتي
الرائي البعد (معيار κ) للتركيبية κ .

البينية betweenness

هي أن يكون المقدار (الشيء) بين
مقدارين (شيئين). فمثلاً على الخط المستقيم
المبين بالشكل تكون النقطة p بين b ، c



• ويكون العدد 5 بين العددين 2، 9. وفي
التحويلات الهندسية يكون التحويل محافظاً على
البينية إذا أبقى على صورة النقطة الواقعة بين
نقطتين أخريين واقعة بين صورتيهما.

متطابقة «بيزو» Bezout's Identity

• إذا كان κ مجالاً نموذجياً أساسياً
principal ideal domain فإن كلًا من العنصرين
غير الصفريين $a, b \in \kappa$ $\Rightarrow \kappa$ يكون أولياً

Beta function دالة بيتا

الدالة

$\beta(m, n) = \int_0^1 s^{m-1} (1-s)^{n-1} ds$ ،
 $m < \infty$ ، $n < \infty$.
وبدلالة دالة جاما Γ :

$$\beta(m, n) = \frac{\Gamma(m)\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)}$$

(انظر: دالة جاما Gamma function).

دالة بيتا غير التامة

Beta function, Incomplete

الدالة

$$\beta(m, n, s) = \int_0^s t^{m-1} (1-t)^{n-1} dt$$

وتساوي $\beta(m, n, 1) = \beta(m, n)$ ، $n > 1$ ، $m > 0$ ؛
س. حيث β الدالة فوق الهندسية

(انظر: الدالة فوق الهندسية
hypergeometric function).

Betti group زمرة «بيتتي»

(انظر: زمرة هومولوجية Homology group).

Betti number عدد «بيتتي»

(معدل $\hat{\theta} - \theta$) يسمى الانحياز في تقدير θ ،
وإذا كان الانحياز صفراً تسمى θ تقديراً غير
متحيز وإذا كان مختلفاً عن الصفر تسمى θ
تقديراً متحيزاً .

إحصاء منحاز **biased statistics**

إذا حصلنا على إحصاء من تصنيف
عشوائي ، وكانت قيمته المتوقعة θ لا تساوى
المتغير الوسيط (البارامتر parameter) أو الكمية
المقدرة (quantity being estimated) يقال
للإحصاء إنه منحاز . وبعبارة أدق ، إذا سحبت
عينات عشوائية حجم كل منها n من مجتمع دالة
توزيعه التكرارية $D(\theta)$ ، θ_1 ، θ_2 ، ... ، θ_r
حيث θ المتغير ، θ_1 ، ... ، θ_r المتغيرات
الوسيط للـ D ، وإذا حصلنا لكل من العينات
العشوائية الممكنة التى حجم كل منها n على
إحصاء $\bar{\theta}$ (θ) كتقدير للمتغير الوسيط θ
فإن الإحصاء $\bar{\theta}$ (θ) يكون منحازاً إذا كان
 $\bar{\theta} \neq \theta$ أما فى حالة التساوى
فإن التقدير يكون غير منحاز . فمثلاً الصيغة
$$\frac{(\bar{\theta} - \theta)^2}{n}$$
 ، تعطى تقديراً منحازاً للتباين ،

حيث n حجم العينة العشوائية من توزيع
طبيعى ، $\bar{\theta}$ متوسط θ من العناصر . ولكن إذا
وضعنا ($n - 1$) بدلاً من n فى نفس الصيغة

بالنسبة إلى الآخر إذا ، فقط إذا ، وجد
عنصران s ، t \exists s بحيث
 $s + t = 1$

متطابقة "بيزو" المعممة

Bezout's Identity, generalized

إذا كان s مجالاً نموذجياً أساسياً فإن
العناصر θ_1 ، ... ، θ_r غير الصفريّة من s
تكون أولية نسبياً (أى أن العامل المشترك الأعلى لها
يساوى الوحدة) إذا ، فقط إذا ، وجدت عناصر
 s_1 ، s_2 ، ... ، s_r \exists s بحيث
 $\theta_1 s_1 + \theta_2 s_2 + \dots + \theta_r s_r = 1$

نصف سنوى

bi-annual = semi annual

صفة لما يحدث مرتين فى السنة .

انحياز (فى الإحصاء)

bias (in statistics)

متحيز (فى الإحصاء)

biased (in statistics)

إذا كانت θ كمية مجهولة ، $\hat{\theta}$ متغيراً
عشوائياً أخذ كتقدير للكمية θ فإن المقدار

تقرير ثنائي الشرطية = التكافؤ

biconditional statement

= equivalence

تقرير مركب يتكون من تقريرين
بربطهما بأداة الربط « إذا وفقط إذا » .
ويكون التكافؤ صائباً إذا كان كل من
التقريرين صائباً أو خاطئاً . فالتقرير
« المثلث يكون متساوي الأضلاع إذا ،
وفقط إذا ، كان متساوي الزوايا » صائب
وذلك حيث أن أي مثلث إما أن يكون
متساوي الأضلاع ومتساوي الزوايا ،
أو غير متساوي الأضلاع وغير متساوي
الزوايا .

التكافؤ المركب من تقريرين P ، Q ، ب
يرمز له بالرمز $P \Leftrightarrow Q$ أو $P \equiv Q$. التكافؤ
« $P \Leftrightarrow Q$ » يماثل بالضبط التقرير « P شرط
ضروري وكاف لـ Q » أو « P إذا ، وفقط
إذا ، كان Q » . $P \Leftrightarrow Q$ ب يكافئ ربط
التقريرين الشرطيين $P \Rightarrow Q$ ، $Q \Rightarrow P$ بأداة
العطف « و » .

فراغ ثنائي الترافق dual space

الفراغ الاتجاهي V^* المرافق للفراغ
الاتجاهي V المرافق للفراغ الاتجاهي V .

فإن التقدير يكون غير منحاز .

كسور ثنائية bicimals

كسور في النظام الثنائي . ومثال ذلك الكسر
٧٥ ، في النظام العشري يساوي ١١ ، في النظام
الثنائي حيث المنزلة الثنائية الأولى $\frac{1}{2}$ والمنزلة
الثنائية الثانية $\frac{1}{4}$.

فئة محكمة (مكتنزة)

bicompact set = compact set

فئة من فراغ طوبولوجي X لكل غطاء لها
بفئات مفتوحة في X غطاء جزئي نهائي .

فراغ طوبولوجي محكم (مكتنز)

bicompact topological space

= compact topological space

ثنائي إحكام مقياسي

= bi-compactum = compactum

فراغ طوبولوجي محكم ومقياسي من
أمثله الفترات المغلقة المحدودة والكرات
المغلقة .

ي (س، ص، ع) ثنائية التوافقية على \mathbb{R} وتنطبق مشتقاتها الجزئية من الرتبة الأولى على \mathbb{R} مع دوال معلومة .
هذه المسألة ومسألة "درشليت" تظهران في دراسة ميكانيكا الأجسام القابلة للتشكل .

دالة ثنائية التوافقية

biharmonic function

حل للمعادلة التفاضلية الجزئية من الرتبة الرابعة $\Delta \Delta u = 0$ ، صفراً ، حيث Δ مؤثر "لابلاس" :

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \dots$$

أي أنها حل $u(x, y, z, \dots)$ للمعادلة :

$$\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial z^2} + \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2 \partial z^2} + \dots = 0$$

صفراً

هذا التعريف يصلح أيضاً بنفس الدرجة للدوال في متغيرين أو أربعة متغيرات أو أي عدد من المتغيرات المستقلة . وهذه الدوال تظهر عادة عند دراسة مسائل القيم الحدية في النظرية الكهرومغناطيسية وفي نظرية المرونة وفي مجالات أخرى من الرياضيات الفيزيائية .

متباينة "بيانيم وتشيبشيف" في الإحصاء .

Bienayme-Tchebycheff inequality
(in statistics)

إذا كان \bar{x} الوسط الحسابي لقيم العينة (x_1, x_2, \dots, x_n) للمتغير العشوائي x الذي وسطه الحسابي m وانحرافه المعياري σ ، فإن احتمال $(|\bar{x} - m| \geq \sigma)$

يكون مساوياً أو أكبر من $(1 - \frac{1}{n})$. يمكن

استبدال σ بـ σ^2 ، وبالتالي فإن

$(1 - \frac{1}{n})$ تستبدل بالمقدار $(1 - \frac{1}{n^2})$. تعرف

هذه المتباينة أيضاً باسم متباينة "تشيبشيف" **Tchebycheff's inequality**

biennial

كل سنتين

صفة للحدث مرة كل سنتين .

مسألة القيم الحدية الثنائية التوافقية

biharmonic boundary value problem

مسألة القيم الحدية الثنائية التوافقية لمنطقة D محدودة بسطح ∂D هي تعيين دالة

<p>ثنائي الخطية وذلك حيث أن</p> $\underline{س} \circ (\underline{ص} + \underline{ع}) = (\underline{ص} + \underline{ع}) \circ \underline{س} = \underline{ص} \circ \underline{س} + \underline{ع} \circ \underline{س}$ $(\underline{س} + \underline{ع}) \circ \underline{ص} = \underline{ص} \circ \underline{س} + \underline{ع} \circ \underline{ص}$ <p>كذلك الدالة د (ع، ي) التي قيمتها عند س تساوي</p> $D \underline{ص}^2 \underline{ع} (\underline{ص}, \underline{س}) \underline{ي} (\underline{ص}, \underline{س})$ <p>ثنائية الخطية في المتغيرين ع، ي، حيث كل من ع، ي دالة في متغيرين.</p>	<p>تناظر أحادي</p> <p>= تناظر واحد لواحد</p> <p>bijection = bijection mapping</p> <p>= 1-1 correspondence</p> <p>التناظر الأحادي من فئة سـ إلى فئة صـ هو تناظر واحد لواحد بين سـ، صـ، أى راسم أحادي وفوقى من سـ إلى صـ.</p>
<p>مرافق ثنائي الخطية</p> <p>billinear concomitant</p> <p>إذا كانت ل المعادلة التفاضلية المرافقة للمعادلة التفاضلية ل، فإن الدالة</p> $W(\underline{ر}(\underline{س}), \underline{ي}(\underline{س}))$ <p>الخطية والمتجانسة في</p> $\underline{ر}, \underline{ر}', \dots, \underline{ر}^{(n-1)}, \underline{ي}, \underline{ي}', \dots, \underline{ي}^{(n-1)}$ <p>والتي تحقق</p> $\underline{ي}(\underline{ل}(\underline{ر})) - \underline{ر}(\underline{ل}(\underline{ي})) = \frac{d}{ds} W(\underline{ر}, \underline{ي})$ <p>تسمى مرافقاً ثنائي الخطية.</p>	<p>ثنائي الخطية</p> <p>bilinear</p> <p>يقال لصيغة رياضية إنها ثنائية الخطية إذا كانت خطية بالنسبة لكل من متغيرين. فمثلاً الدالة</p> $D(\underline{س}, \underline{ص}) = \underline{س}^3 \underline{ص}$ <p>بالنسبة لكل من س، ص، وذلك حيث أن:</p> $D(\underline{س}_1 + \underline{س}_2, \underline{ص}) = \underline{س}_1^3 \underline{ص} + \underline{س}_2^3 \underline{ص}$ $D(\underline{س}, \underline{ص}_1 + \underline{ص}_2) = \underline{س}(\underline{ص}_1^3 + \underline{ص}_2^3)$ <p>تسمى ثنائية الخطية لأنها خطية بالنسبة لكل من س، ص، وذلك حيث أن:</p> $D(\underline{س}, \underline{ص}_1 + \underline{ص}_2) = \underline{س}(\underline{ص}_1^3 + \underline{ص}_2^3)$ $D(\underline{س}_1 + \underline{س}_2, \underline{ص}) = \underline{س}_1^3 \underline{ص} + \underline{س}_2^3 \underline{ص}$ <p>أيضاً، الضرب القياسي لمتجهين</p> $\underline{س} = (\underline{س}_1, \underline{س}_2, \underline{س}_3)$ $\underline{ص} = (\underline{ص}_1, \underline{ص}_2, \underline{ص}_3)$ <p>أى</p> $\underline{س} \circ \underline{ص} = \underline{س}_1 \underline{ص}_1 + \underline{س}_2 \underline{ص}_2 + \underline{س}_3 \underline{ص}_3$
<p>صيغة ثنائية الخطية</p> <p>billinear form</p> <p>تعبير على فراغ اتجاهى نونى البعد سـ</p> <p>أساسه ي على الصورة:</p> $B(\underline{م}, \underline{م}) = \underline{م}^T \underline{م}$ <p>(1)</p>	<p>صيغة ثنائية الخطية</p> <p>billinear form</p> <p>تعبير على فراغ اتجاهى نونى البعد سـ</p> <p>أساسه ي على الصورة:</p> $B(\underline{م}, \underline{م}) = \underline{م}^T \underline{م}$ <p>(1)</p>

<p>توزيع ثنائى المنوال (فى الإحصاء) bimodal distribution (in statistics) يكون التوزيع ثنائى المنوال إذا وجد للمتغير العشوائى فيه قيمتان احتمال كل منهما أكبر من احتمال أية قيمة أخرى مجاورة .</p>	<p>حيث $s_1, \dots, s_r, \dots, s_n$ مركبات أى متجهين بالنسبة للأساس s. ويمكن كتابة التعبير (١) على الصورة $s^{(n)} = (s_1, \dots, s_r, \dots, s_n)$ حيث</p> $s^{(n)} = (s_1, \dots, s_r, \dots, s_n) = \begin{bmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_r \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix}$
<p>ثنائى binary (١) خاصة لازمة لعملية اختيار شرط يتضمن احتمالين فقط . مثال ذلك نظام العد الثنائى إذ يحتوى على الرقمين صفر ، ١ فقط . (٢) صفة تطلق على الإشارات أو الرموز التى تتخذ إحدى قيمتين مميزتين وتطلق كذلك على النظم التى تتعامل بها .</p>	<p>$s^{(n)} = (s_1, \dots, s_r, \dots, s_n)$ حيث $s^{(n)} = \begin{bmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_r \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix}$. $(s^{(n)})^p = 2^p$ وتسمى المصفوفة 2^p مصفوفة الصيغة الثنائية الخطية بالنسبة للأساس s . وإذا كانت المصفوفة 2^p متماثلة فإنه يقال أن الصيغة الثنائية الخطية متماثلة .</p>
<p>تشفير ثنائى حرفى رقمى binary alphameric code تشفير كل من الأرقام من صفر إلى ٩ والحروف من أ إلى ي والرموز الخاصة (مثل +، -، /، %، ...) إلى النظام والشكل الذى يقبله الحاسب وذلك باستخدام أساس النظام الثنائى .</p>	<p>قسمة سداد bill قسيمة تبين مقدار المبلغ المطلوب سداده ، وتتضمن عادة بيانات بالبضائع أو الخدمات المطلوب سداد قيمتها .</p>
<p>عملية حساب ثنائية binary arithmetic operation عملية حساب تؤثر فى أعداد ثنائية .</p>	<p>بليون billion (١) فى الولايات المتحدة وفرنسا ألف مليون ، ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ . (٢) فى إنجلترا وألمانيا مليون مليون ، ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ .</p>

معجم الرياضيات

<p>رقم ثنائي التشفير</p> <p>binary coded digit</p> <p>رقم يمثل بمجموعة مشفرة من الأرقام الثنائية . مثال ذلك استخدام أربع بيتات لتمثيل رقم عشري ، أو استخدام ثلاث بيتات لتمثيل رقم في نظام العد الثنائي .</p>	<p>خلية ثنائية</p> <p>binary cell</p> <p>وحدة تخزين أساسية سعتها أحد الرقمين الثنائيين صفر أو واحد .</p>
<p>رقم ثنائي</p> <p>binary digit (BIT)</p> <p>أحد رقمي النظام الثنائي، أي الصفر والواحد .</p>	<p>شفرة ثنائية</p> <p>binary code</p> <p>نظام لتشفير الأعداد الطبيعية أو حروف لغة ما باستخدام الأرقام الثنائية صفر ، ١ فقط .</p>
<p>التمثيل الثنائي للأعداد</p> <p>binary notation</p> <p>(انظر : binary representation of numbers)</p>	<p>حرف ثنائي التشفير</p> <p>binary coded character</p> <p>حرف يمثل باستخدام الشفرة الثنائية .</p>
<p>عدد ثنائي</p> <p>binary number</p> <p>عدد معبر عنه باستخدام الأرقام الثنائية</p>	<p>تشفير ثنائي لأرقام النظام العشري</p> <p>binary coded decimal (BCD)</p> <p>شفرة لكتابة كل رقم من الأرقام من صفر إلى ٩ بمجموعة من أربعة أرقام ثنائية . فمثلاً العدد ٣٨ يمثل بالمجموعة ١٠٠٠ ١١٠٠ ($2^3 = 8$) أي ١٠٠٠ في نظام العد الثنائي ، $3 = 2 + 1$ أي $11 = 10 + 1$ في نظام العد الثنائي) . في حين أن العدد ٣٨ يمثل في نظام العد الثنائي الرمز ١٠٠١١٠ .</p>
<p>نظام العد الثنائي</p> <p>binary number system</p> <p>نظام عد أساسه ٢ وأرقامه الصفر والواحد فقط .</p>	

البرنامج بعد تحويله إلى هذه اللغة البرنامج
الثنائي أو برنامج الهدف .

التمثيل الثنائي للأعداد

binary representation of numbers

كتابة الأعداد بالنسبة للأساس ٢ .
فالعند ٦ فى النظام العشري يكتب ١١٠
فى النظام الثنائي والعدد $٥\frac{٥}{٨}$ فى النظام
العشري يكتب ١٠١,١٠١ فى النظام
الثنائي .

binary search عملية بحث ثنائي

عملية بحث تجرى على فئة لتحديد عناصرها
التي لها صفة معينة . وفى العملية تقسم عادة
عناصر الفئة إلى جزئين ، أحدهما يرفض لعدم
توافر الصفة ، والآخر تطبق عليه نفس العملية
إلى أن يتم التوصل إلى فئة تحوى العناصر ذات
الصفة المطلوبة .

binary variable متغير ثنائي

متغير يأخذ إحدى القيمتين الصفر
أو الواحد .

رقم ثنائي (بيت)

binary numeral = binary digit (BIT)

(انظر : رقم ثنائي binary digit) .

binary operation عملية ثنائية

العملية الثنائية على فئة سر ، راسم مجاله
سر × سر . فالجمع على فئة الأعداد
الصحيحة عملية ثنائية والطرح على فئة الأعداد
الطبيعية عملية ثنائية .

binary point فاصلة ثنائية

الفاصلة فى النظام الثنائي المناظرة للفاصلة
العشرية فى النظام العشري .
(انظر : فاصلة عشرية decimal point) .

برنامج ثنائي = برنامج الهدف

binary program = object program

تكتب البرامج عادة بإحدى اللغات الخاصة
التي تستعمل رموزاً معينة ، ولكن لا يمكن
للحاسب التعامل مع هذه البرامج فى صورتها
الرمزية ، ولذا يجب تحويلها إلى اللغة التي يقبلها
الحاسب (باستخدام الشفرة الثنائية التي تسمى
لغة الآلة (machine language) ويسمى

<p>تفاضلة ذات حدين</p>	<p>كلمة ثنائية</p>
<p>binomial differential</p> <p>تفاضلة على الصورة :</p> <p>س^٢ (٢ + ب س^٢)^٢ س^٢ ، حيث ٢ ، ب ثابتان اختياريان ، والأسس م ، ن ، م أعداد كسرية .</p>	<p>دليل يعبر عنه بأرقام ثنائية ويعطى معنى خاصاً .</p> <p>(انظر : رقم ثنائي (binary numeral) .</p>
<p>توزيع ذى الحدين (فى الاحتمالات)</p> <p>binomial distribution</p> <p>= binomial frequency distribution</p> <p>(in probability)</p>	<p>ذات الحدين</p> <p>كثيرة حدود تتكون من حدين ، مثل</p> <p>٢ س + ٥ ص أو ٢ - (٢ + ب) .</p>
<p>توزيع عدد مرات النجاح الممكنة فى عدد معين من محاولات " برنولى " المستقلة ، توزيع احتمالات النجاح البين بقسمة كل معامل من معاملات مفكوك ذى الحدين على مجموعها . فمثلاً ، إذا ألقيت قطعاً نقود فإن احتمال أن يكون الوجه الأعلى لكل منهما صورة يساوى $\frac{1}{4}$ ، واحتمال أن يكون الوجه الأعلى لإحدهما صورة وللأخرى كتابة يساوى $\frac{2}{4}$ ، واحتمال أن يكون الوجه الأعلى لكل منهما كتابة يساوى $\frac{1}{4}$.</p> <p>فإذا كانت س تعنى أن يكون الوجه الأعلى صورة فقط ، فإن ص تعنى أن يكون الوجه الأعلى كتابة فقط .</p>	<p>معاملات ذات الحدين</p> <p>binomial coefficients</p> <p>معاملات المتغيرات فى مفكوك (س + ص)^٢ . إذا كان ن عدداً صحيحاً موجباً فإن معامل الحد الذى رتبته (م + ١) فى مفكوك (س + ص)^٢ يساوى $\frac{n!}{m!(n-m)!}$</p> <p>ويمثل عدد توافيق م من الأشياء المأخوذة من ن من الأشياء ويرمز له بالرمز C_m^n أو $\binom{n}{m}$.</p> <p>ومجموع معاملات ذات الحدين يساوى 2^n ، ويمكن الحصول عليه بتعويض كل من س ، ص فى الصيغة (س + ص)^٢ بالواحد الصحيح وقد سمي العرب معاملات ذات الحدين أصول المنازل .</p>

في كل مرة . فمثلاً احتمال ظهور الصورة مرة واحدة في أربع رميات لقطعة نقود واحدة يساوي

$$P_1 = \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$$

وكلما ازداد عدد المحاولات يقترب توزيع

ذى الحدين من التوزيع الطبيعي إلا إذا كانت ل صغيرة جداً بحيث تكون له مقداراً ثابتاً تقريباً ، ففي هذه الحالة يقترب توزيع ذى الحدين من توزيع بواسون .

(انظر: التوزيع الطبيعي normal distribution) ،
وأيضاً

(توزيع بواسون Poisson's distribution) .

معادلة ذات حدين binomial equation
معادلة على الصورة $x^n - 2 = 0$ صفراً .

مفكوك ذات الحدين

binomial expansion

المفكوك المعطى بنظرية ذات الحدين
(انظر: نظرية ذات الحدين binomial theorem) .

صيغة ذات الحدين binomial formula

وبملاحظة أن (س + ص)²
= (س² + ٢س ص + ص²) ، وأن س² تدل على ظهور صورتين ، س ص تدل على ظهور صورة وكتابة ، ص² تدل على ظهور كتابتين ، وأن معاملات س² ، س ص ، ص² في المفكوك السابق هي ١ ، ٢ ، ١ ، وبقسمة هذه المعاملات على مجموعها (وهو ٤) ، نحصل على الاحتمالات السابق ذكرها وهي بالترتيب $\frac{1}{4}$ ، $\frac{2}{4}$ ، $\frac{1}{4}$. كذلك إذا ألقيت ثلاث قطع نقود فإن احتمال أن يكون الوجه الأعلى للقطع الثلاث كلها صورياً أو صورتين وكتابة أو صورة وكتابتين أو كلها كتابة هي معاملات الصيغة $\frac{1}{8} (س + ص)^3$

$\frac{1}{8} (س^3 + ٣س^٢ص + ٣س ص^٢ + ص^٣)$
أي $\frac{1}{8}$ ، $\frac{3}{8}$ ، $\frac{3}{8}$ ، $\frac{1}{8}$.

وإذا كانت دالة التكرار لتوزيع ذى الحدين هي $d(س) = (ل + له)^ن$. حيث س عدد مرات حدوث حدث معين في ن من المحاولات واحتمال حدوث هذا الحدث هو ل واحتمال عدم حدوثه له ، حيث $ل + له = ١$. فإن قيمة الدالة عندما $س = م$ هي الحد (م + ١) في مفكوك (ل + له)^ن ، أي $ف(ل، له)^ن$ حيث $ف(ل، له)^ن = له^ن$.
وهو عدد التوافيق لأشياء عددها ن مأخوذة

صحيحاً موجباً أو صفراً . وهي متسلسلة تحتوي على عدد لا نهائي من الحدود . وتكون هذه المتسلسلة تقاربية إذا كان $|ص| > |س|$. وتمثل هذه الحالة الدالة لجميع القوى فمثلاً ،

$$\sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \dots$$

$$+ \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^3 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^4 + \dots = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots = 1$$

ذات حدين صماء **binomial surd**

ذات حدين أحدهما على الأقل عدد

أصم ، مثل

$$\sqrt[3]{3} + 2, \sqrt[3]{3} - 2$$

نظرية ذات الحدين **binomial theorem**

نظرية لإيجاد مفكوك ذات حدين مرفوعة إلى أية قوة n . وإذا كان n عدداً صحيحاً موجباً تنص النظرية على أن :

$$(س + ص)^n = س^n + n س^{n-1} ص + \frac{n(n-1)}{2} س^{n-2} ص^2 + \dots + ص^n$$

$$+ \frac{n(n-1)(n-2)}{6} س^{n-3} ص^3 + \dots + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{24} س^{n-4} ص^4 + \dots + ص^n$$

فمثلاً

الصيغة المعطاة بنظرية ذات الحدين

(انظر : نظرية ذات الحدين
binomial theorem)

احتمالات ذات الحدين

binomial probabilities

إذا كان ل احتمال النجاح ، له احتمال الفشل في محاولة واحدة من محاولات " برنولي " فإن احتمال النجاح r من المرات في n من المحاولات المستقلة هو $(س)^n$ و $ص^n$ له $ص^n$ وتسمى $ح(س)$ ، حيث = صفر ، 1 ، 2 ، ... ، n احتمالات ذات الحدين .

متغير عشوائي لتوزيع ذات الحدين

binomial random variable

إذا أجريت تجربة عشوائية يتكون فراغها من حدثين فقط n من المرات ، وكانت $س$ تدل على عدد مرات حدوث أحد الحدثين فإن $س$ تسمى متغيراً عشوائياً للتوزيع الاحتمالي لذات الحدين .

متسلسلة ذات الحدين **binomial series**

مفكوك $(س + ص)^n$ حيث n ليست عدداً

osculating plane للمنحنى عند $و$. وجيوب
تمام اتجاه عمود اللثام هي
 $\rho (ص \text{ ع} - ع \text{ ص})$ ،
 $\rho (ع \text{ س} - س \text{ ع})$ ،
 $\rho (س \text{ ص} - ص \text{ س})$ ، حيث « $س$ » تعنى
التفاضل بالنسبة لطول القوس ، ρ نصف قطر
تقوس المنحنى عند $و$ ، ($س$ ، $ص$ ، $ع$)
الإحداثيات الديكارتية للنقطة $و$.

النمذجة الحيوية bionics
دراسة علاقات وخصائص مجموعات
الكائنات الحية عن طريق ارتباطها بتطور
المكونات المادية hardware المصممة لتعمل
بصورة مماثلة .

قانون "بيو وسافار"

Biot-Savart law

قانون يعطى شدة المجال المغنطيسى
بالقرب من سلك طويل مستقيم يمر فيه
تيار كهربائى مستمر منتظم الشدة . وقد
ثبتت صحة هذا القانون فيما بعد لأية دائرة
كهربائية .

$(س + ص)^3 = س^3 + 3س^2ص + 3سص^2 + ص^3$
والحد العام فى المفكوك أى الحد الذى رتبته
 $(1 + r)$ هو

$$\frac{r^n (1 - r) \dots (1 - r - n + 1)}{n!}$$

ومعامل هذا الحد هو

$$\frac{r^n}{n! (1 - r)^{n+1}}$$

ونظرية ذات الحدين صحيحة لأية قوة n
بقيود معينة على الحدين $س$ ، $ص$.

متغير حدانى binomial variate

متغير $س$ يأخذ القيم صفراً ، ١ ،
٢ ، ... ، n باحتمالات $و$ له $و$ ،
 $و$ له $و$ ، ... ، $و$ له $و$ على
الترتيب ، حيث له ، $ل$ احتمالات النجاح
والفشل ، أى له $ل + ١ = ١$

عمود اللثام binormal

الخط المستقيم المار بنقطة $و$ على منحنى
فى الفراغ والعمودى على مستوى اللثام

منحنى تكعبي ذو شقين

bipartite cubic

منحنى المعادلة

$$ص^2 = س (س - پ) (س - ب) ,$$

صفر $پ > 2 > ب$.

وهو متماثل بالنسبة لمحور السينات ويقطعه عند نقطة الأصل والنقطتين (٢ ، صفر) ، (ب ، صفر) . وقد سمي هذا المنحنى بذى الشقين لأن له فرعين منفصلين تماماً .

إحداثيات ثنائية القطبية

bipolar coordinates

إذا أعطيت معادلة منحنى مستوى على صورة علاقة بين البعدين (ر، ر') لأى نقطة عليه عن نقطتين ثابتتين فتكون (ر، ر') إحداثيات ثنائية القطبية . فمثلاً المعادلة $ر + ر' = ٢٢$ هى معادلة قطع ناقص بؤرتاه النقطتان الثابتتان ومحوره الأكبر ٢٢ .

إشارة ثنائية القطب bipolar signal

إشارة تتكون عناصرها من جهد موجب وجهد سالب تستخدم فى أنظمة تبادل البيانات .

معادلة ثنائية التربيع

biquadratic equation

معادلة من الدرجة الرابعة على الصورة

$$س^٤ + ب س^٢ + ح = صفرًا$$

ويمكن معالجتها كما تعالج المعادلة التربيعية .

شفرة ثنائية التخميس biquinary code

يمثل عدد (ن مثلاً) بزواج من الأعداد (س ، ص) حيث $ن = س + ص$ ،

$س =$ صفراً أو ٥ ، $ص =$ صفراً أو ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤ . الزوج (س ، ص) يمكن التعبير عنه فى شفرة ثنائية باستخدام الجدول التالى :

عشرى	ثنائية التخميس	تمثيل ثنائى
صفر	صفر + صفر	١ ٠ ٠ ٠
١	صفر + ١	٠ ٠ ٠ ١
٢	صفر + ٢	٠ ٠ ١ ٠
٣	صفر + ٣	٠ ٠ ١ ١
٤	صفر + ٤	٠ ١ ٠ ٠
٥	٥ + صفر	١ ٠ ٠ ٠
٦	١ + ٥	١ ٠ ٠ ١
٧	٢ + ٥	١ ٠ ١ ٠
٨	٣ + ٥	١ ٠ ١ ١
٩	٤ + ٥	١ ١ ٠ ٠

<p>(انظر : النقطة المنصفة لقطعة مستقيمة bisecting point of a line segment)</p>	<p>مثلث ثنائي القائمة birectangular triangle</p>
<p>ينصف الزاوية bisect an angle, to يرسم خطاً مستقيماً ماراً برأس الزاوية يقسمها إلى زاويتين متجاورتين لهما نفس المقياس .</p>	<p>مثلث كروى زاويتان من زواياه قائمتان . نظرية النقطة الثابتة لـ " بوانكاريه و بيركوف " Birkhoff fixed point theorem, Poincaré -</p>
<p>النقطة المنصفة لقطعة مستقيمة bisecting point of a line segment = نقطة منتصف قطعة مستقيمة = mid-point of a line segment النقطة على القطعة المستقيمة الواقعة على بعد متساوٍ من نهايتها .</p>	<p>إذا فرض أن تحويلاً أحادياً متصلًا يرسم الحلقة بين دائرتين متحدتي المركز بحيث تتحرك إحدى الدائرتين في الاتجاه الموجب والأخرى في الاتجاه السالب وبحيث تحفظ المساحات ، فإنه يوجد للتحويل نقطتان ثابتتان على الأقل . وقد خُمن " بوانكاريه " هذه النظرية وأثبتها " بيركوف " من بعده .</p>
<p>منصف bisector قاسم الشيء إلى نصفين متساويين .</p>	<p>ينصف bisect, to يقسم الشيء قسمين متساويين .</p>
<p>منصف قطعة مستقيمة bisector of a line segment أى خط مستقيم مار بالنقطة التى تنصف القطعة المستقيمة .</p>	<p>ينصف قطعة مستقيمة bisect a line segment, to إيجاد نقطة القطعة المستقيمة الواقعة على بعد متساوٍ من نهايتها .</p>

القطعة المستقيمة التي نقطتا نهايتها منتصفا الضلعين وهي توازي الضلع الثالث وطولها نصف طوله .

منصفا الزاويتين بين مستويين متقاطعين
bisectors of the angles between two intersecting planes

المحل الهندسى للنقط الواقعة على بعد متساوٍ من المستويين المتقاطعين ويتكون من مستويين متعامدين . ونحصل على معادلتى هذين المستويين بمساواة بعدى نقطة متغيرة عن المستويين ، أولاً بإعطاء البعدين نفس الإشارة ثم بإعطائهما إشارتين مختلفتين . فإذا كانت :

$$x + y + z = 0 \text{ صفراً ،}$$

$$x - y + z = 0 \text{ صفراً ،}$$

معادلتى المستويين باستخدام الإحداثيات الديكارتية فإن معادلتى منصفى الزاويتين بينهما هما :

$$\frac{x + y + z}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} \pm \frac{x - y + z}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = 0$$

منصفا الزاويتين بين خطين مستقيمين متقاطعين

bisectors of the angles between two intersecting straight lines

المنصف العمودى لقطعة مستقيمة

bisector of a line segment,
perpendicular

الخط المستقيم العمودى على القطعة المستقيمة ماراً بمنتصفها .

منصف زاوية
bisector of an angle
الخط المستقيم الذى يقسم الزاوية إلى زاويتين متجاورتين لهما نفس المقياس .

منصف زاوية مثلث
bisector of an angle of a triangle
القطعة المستقيمة من منتصف الزاوية ونقطتا نهايتها رأس الزاوية ونقطة تقاطع المنصف مع الضلع المقابل للرأس .

منصف قوس دائرة
bisector of an arc of a circle
خط مستقيم مار بالنقطة التي تنصف القوس .

منصف ضلعى مثلث
bisector of two sides of a triangle

<p>هذا المعامل يعطى بالعلاقة :</p> $\sigma^2 = \frac{(s_r - s_l)^2}{n}$ <p>حيث s_r ، s_l متوسطا المقاطع العليا والسفلى للمتغير المتفرع تفرعاً ثنائى الشعب ، له ، n نسبتا الحالات فى كل مقطع ، e ارتفاع توزيع طبيعى عند النقطة التى تقسمه بنسبة له إلى n ، σ الانحراف المعيارى لعينة من المتغير المتصل القياسى .</p>	<p>المحل الهندسى للنقط الواقعة فى مستوى المستقيمين وعلى بعد متساو منها ويتكون من مستقيمين متقاطعين متعامدين . ونحصل على معادلتى هذين المستقيمين بمساواة بعدى نقطة متغيرة عن المستقيمين ، أولاً بإعطاء البعدين نفس الإشارة ثم بإعطائهما إشارتين مختلفتين .</p>
<p>ثنائى الاستقرار bistable</p> <p>صفة تفيد إمكانية استقرار ائزان جهاز ما بافتراض وضعين ثابتين .</p>	<p>فإذا كانت</p> $A = B + C + D = 0 \text{ صفراً ،}$ $A' = B' + C' + D' = 0 \text{ صفراً ،}$ <p>معادلتى المستقيمين باستخدام الإحداثيات الديكارتية فإن معادلتى منصفى الزاويتين بينهما هما :</p> $\frac{A + B + C + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2 + D^2}} = \pm \frac{A' + B' + C' + D'}{\sqrt{A'^2 + B'^2 + C'^2 + D'^2}}$
<p>بيت bit</p> <p>كلمة انجليزية منحوتة من العبارة الانجليزية binary digit .</p> <p>(انظر : رقم ثنائى binary digit)</p>	<p>معامل ارتباط ثنائى التسلسل biserial correlation coefficient</p> <p>معامل ارتباط للمتغير الحداثى ملائم للحالة التى يكون فيها أحد المتغيرين قد رصد فى صورة تفرع ثنائى الشعب ، بالرغم من أن كلا من المتغيرين متصل . والمفترض أن المتغير المتفرع تفرعاً ثنائى الشعب يتبع التوزيع الطبيعى وعليه فإن</p>
<p>بيت فاحص bit, check</p> <p>رقم ثنائى يستخدم للمقارنة والتحقق .</p>	<p></p>

الموضع الرقمى لبيت فى كلمة .	bit density كثافة البيئات عدد البيئات المخزنة فى وحدة الأطوال أو وحدة المساحات من وسط مغنطيسى يستخدم للتسجيل .
bit rate معدل البيئات عدد البيئات المرسله أو المنقولة فى وحدة الزمن . وتؤخذ وحدة الزمن عادة على أنها ثانية واحدة .	bit location موقع بيت عنصر تخزين قادر على تخزين بيت واحد .
bit string سلكية بيتات متابعة متصلة من الأرقام الثنائية لتشفير البيانات كل بيت فيها له مدلول يتوقف على مكانه فى السلكية وعلاقته بعناصر السلكية الأخرى .	bit matrix مصفوفة بيت منظومة ثنائية البعد كل عنصر فيها يساوى الصفر أو الواحد . (قارن : مصفوفة بوليانية Boolean matrix)
bit track مسلك بيت مسلك فيزيقى على قرص أو أسطوانة تقرأ أو تسجل الرأس (أقرأ / أكتب) على امتداده البيانات تسلسلياً كأرقام ثنائية متتابعة .	bit pattern نمط ثنائى مجموعة متتالية من الأرقام الثنائية تعبر عن مفهوم ما .
Blackett relation علاقة " بلاكت " علاقة تربط بين العزم المغنطيسى لجسم وكمية الحركة الزاوية له . وينسب المصطلح إلى العالم الإنجليزى " لورد بلاكت " .	bit patterns أنماط البيئات متابعات من البيئات يمكن استخدامها لتمثيل الحروف فى شفرة ثنائية
	bit position موضع بيت

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>data block ، وحدة برنامج تجميعية أساسية basic program block .</p>	<p>قانون " بلاجدين " Blagden law قانون ينص على أن الانخفاض في نقطة تجمد محلول ما يتناسب مع تركيز المواد المذابة عند درجات التركيز الصغيرة .</p>
<p>مخططات تجميعية block diagrams مخططات لتوضيح وبيان المراحل والخطوات العامة التي يتم بمقتضاها التسلسل والتتابع المطلوب في تنفيذ عملية أو عمليات مختلفة .</p>	<p>(١) بياض blank حيز يفصل بين الكلمات . (٢) خال صفة للجزء غير المستغل .</p>
<p>سعة الوحدة التجميعية (في الحاسب) block-length (in computer) الرقم الكلى لعدد السجلات أو الكلمات أو الحروف التي تحتويها الوحدة التجميعية .</p>	<p>نظرية " بلوخ " Bloch theorem نظرية تعالج حل المعادلة الموجية لـ " شرودنجر " في المجال الدورى للتركيب البلورى .</p>
<p>وحدة تجميعية مساندة block, stand by مجموعة من أماكن التخزين في وحدة تخزين الحاسب ، معدة للتعامل مع أماكن التخزين الوسيلة ليتسنى استخدامها بسرعة وكفاءة عالية .</p>	<p>وحدة تجميعية block (١) مجموعة من أماكن التخزين في وحدة تخزين الحاسب يتم التعامل معها كوحدة واحدة طبقاً لوجودها في ترتيب متصل .</p>
<p>كتل عشوائية blocks, randomized طريقة لتحديد تجربة للحصول على عينة مشاهدات لتحليل التباين ، حيث يمكن</p>	<p>(٢) مجموعة من البيانات يتم تسجيلها على إحدى وسائل التخزين مثل الأشرطة أو الأقراص الممغنطة . ومن أمثلته : وحدة تجميعية لنقل transfer block ، وحدة تجميعية للبيانات</p>

body, convex جسم محدب
 فئة نقط لها نقطة داخلية وتحوى القطعة
 المستقيمة الواصلة بين أى نقطتين من نقطها ،
 ويشترط أحياناً أن يكون الجسم المحدب مغلقاً
 أو محكماً (compact) .

ثابت " بولتزمان "

Boltzmann constant

ثابت تتضمنه المعادلة العامة للغازات عند
 تطبيقها على جزيء .

مسألة " بولزا " **Bolza, problem of**
 المسألة العامة في حساب المتغيرات والتي
 تختص بتعيين القوس من بين منحنيات فصل
 تخضع لقيود على الصورة :

$$L = (s, \dot{s}, \ddot{s}) = 0 \text{ صفراً ،}$$

$$D = [s_1, \dot{s}_1, \ddot{s}_1] \text{ ، } [s_2, \dot{s}_2, \ddot{s}_2] \text{ صفراً ،}$$

$$D = [s_1, \dot{s}_1, \ddot{s}_1] \text{ ، } [s_2, \dot{s}_2, \ddot{s}_2] \text{ صفراً ،}$$

الذى يجعل دالة على الصورة :

$$D = [s_1, \dot{s}_1, \ddot{s}_1] \text{ ، } [s_2, \dot{s}_2, \ddot{s}_2] \text{ صفراً ،}$$

$$D = [s_1, \dot{s}_1, \ddot{s}_1] \text{ ، } [s_2, \dot{s}_2, \ddot{s}_2] \text{ صفراً ،}$$

نهاية صغرى

التحكم في عاملين يؤثران في المتغيرات محل
 الدراسة .

board measure القياس اللوحى
 نظام قياس الخشب الخام المقطوع من
 الغابات ووحدته القدم اللوحى board foot .

مسار مركز الدوران اللحظى في الجسم
 (سنرويد الجسم)

body centroid

إذا تحرك جسم جاسىء حركة مستوية ، وهى
 الحركة التى تقع فيها كل نقطة من نقط الجسم
 فى مستوى يوازي مستوياً ثابتاً ، فإن نقطة الجسم
 التى تتلاشى سرعتها لحظياً تسمى مركز الدوران
 اللحظى . وباعتبار هذه النقطة نقطة فى الجسم
 فإنها ترسم مساراً فيه يسمى سنرويد الجسم .
 أما إذا اعتبرناها إحدى نقط الفراغ فإن مسارها
 فيه يسمى مسار مركز الدوران اللحظى فى
 الفراغ (سنرويد الفراغ space centroid) .
 فمثلاً فى حالة دحرجة قرص دائرى على خط
 مستقيم ثابت فإن نقطة تماس القرص مع المستقيم
 هى مركز الدوران اللحظى وترسم هذه النقطة
 محيط القرص إذا اعتبرناها إحدى نقطه ، وترسم
 المستقيم الثابت فى الفراغ إذا اعتبرناها نقطة
 فيه .

وتنسب هذه النظرية إلى الرياضى الإيطالى
"بولزانو" (١٨٤٨) .

bond سند
اتفاق مكتوب تدفع بموجبه الفائدة
(الأرباح) المستحقة على مبلغ معين من المال
ويتضمن طريقة استرداد هذا المبلغ ، إلا إذا كان
السند مستديماً (perpetual bond) ، ففي هذه
الحالة تدفع الفائدة ولا تسترد أصوله أبداً .

bond annuity سند سنهوى
سند تسترد قيمته على دفعات متساوية تشمل
كل منها الفائدة على الرصيد غير المسترد وجزءاً
كافياً من قيمة أصل السند لكى يتم استرداد قيمة
السند كاملة عند نهاية فترة زمنية محددة .

سعر شراء سند بين تاريخين لاستحقاق
الأرباح

**bond between dividend dates, the
purchase price of a**
مجموع سعر السند عند آخر تاريخ
لاستحقاق الأرباح والفائدة المتجمعة
(accrued interest).

نظرية "بولزانو وفير شتراس"

Bolzano-Weirstrass theorem

إذا كانت S فئة محدودة تحوى عدداً لا نهائياً
من النقط ، فإنه توجد نقطة نهائية للفئة S .
وقد تكون الفئة S فئة من الأعداد الحقيقية ،
أو فئة من النقط فى المستوى الإقليدى ، أو فئة
من النقط فى الفراغ الإقليدى النونى البعد .
وبالتالى يمكن صياغة النظرية أيضاً كما يلى :
لأى فراغ إقليدى نهائى البعد يتكافأ مفهوم
الفئات المغلقة المحدودة ومفهوم الفئات المكتنزة
(compact) . وتنسب هذه النظرية عادة إلى
الرياضى الألمانى "فاير شتراس"
(١٨١٥ - ١٨٩٧) ، غير أنها أثبتت
بواسطة الرياضى الإيطالى "بولزانو"
(١٧٨١ - ١٨٤٨) فى سنة ١٨١٧ ، ويبدو
أيضاً أنها كانت معلومة للرياضى الفرنسى
"كوشى Cauchy" (١٧٨٩ - ١٨٥٧) .

نظرية "بولزانو"

Bolzano's theorem

الدالة الحقيقية القيمة D (س) فى المتغير
الحقيقى S والوحيدة القيمة تساوى الصفر
لقيمة واحدة على الأقل من قيم S على الفترة
[١ ، ب] إذا كانت متصلة على هذه الفترة وكان
للمقدارين D (١) ، D (ب) إشارتان مختلفتان .

معجم الرياضيات

<p style="text-align: center;">قيمة السند الاسمية</p> <p>bond, par value of a</p> <p>= bond, face value of a</p> <p>القيمة الإصدارية للسند وتحتسب الفوائد المستحقة على أساسها ، وتختلف غالباً عن ثمن شراء السند .</p> <p>bond, perpetual سند مستديم</p> <p>(انظر : سند bond) .</p> <p style="text-align: center;">المعدل الاسمي لسند</p> <p>bond rate = dividend rate</p> <p>معدل الفائدة المنصوص عليه في السند .</p> <p style="text-align: center;">سعر استرداد السند</p> <p>bond, redemption price of a</p> <p>السعر الواجب سداؤه لاستهلاك السند .</p> <p style="text-align: center;">القيمة الافتراضية لسعر شراء السند</p> <p>bond, theoretical value of purchase price of a</p> <p>قيمة سعر استرداد السند عند تاريخ</p>	<p style="text-align: center;">القيمة الدفترية لسند</p> <p>bond, book value of a</p> <p>سعر شراء السند مخصوماً منه القيمة المتراكمة لاستهلاك الزيادة في السعر ، أو مضافاً إليه مقدار القيمة المتراكمة لتغطية النقصان في السعر ، تبعاً لشراء السند بأزيد أو أقل من قيمته الاسمية .</p> <p style="text-align: center;">سعر السند عند طلب استرداده</p> <p>bond, call price of a</p> <p>السعر الذي يسترد السند به عند تاريخ معين سابق لموعد الاستهلاك النهائي للسند .</p> <p>bond, dividend on a إيراد السند</p> <p>الربح الدوري الذي يدفع على السند .</p> <p style="text-align: center;">سعر الشراء للسند</p> <p>bond, flat price of a</p> <p>= bond, purchase price of a</p> <p>جملة ما يدفع مقابل السند ويساوي القيمة الدفترية للسند مضافاً إليها الفائدة المتجمعة .</p>
--	--

سندات تدفع فائدتها بواسطة قسائم مؤرخة بتاريخ مؤجلة ومرفقة مع السند ، وتفصل منه لصرفها عند التاريخ المحدد لها .	استحقاق الأرباح (وتساوى عادة القيمة الاسمية للسند) مضافاً إليها القيمة الحالية لسنهية دفعاتها تساوى أرباح السند .
سندات صككية bonds, debenture سندات غير مكفولة تحمى برصيد ائتمان وإيرادات الشركة المصدرة لها .	المعدل الفعلي لسند bond, yield of a معدل الفائدة في المبالغ المستثمرة في السند ويتوقف أساساً على ثمن شراء السند .
سندات مكفولة bonds, guaranteed سندات تكفل شركات أخرى (بالإضافة إلى الشركة المصدرة لها) دفع أصولها وأرباحها أو كليهما .	سندات اختيارية bonds, callable = bonds, optional سندات تسترد قيمتها قبل حلول ميعاد استحقاقها بناءً على رغبة الشركة المصدرة وتبعاً لشروط محددة .
سندات رهنية bonds, mortgage سندات لها أولوية مطلقة في السداد في حالة تصفية الشركة ، وتنقسم إلى سندات رهنية أولى first mortgage bonds وسندات رهنية ثانية second mortgage bonds وهكذا .	سندات ائتمان تكميلي bonds, collateral trust سندات تصدرها شركات تتكون أصولها أساساً من كفالات المساهمين ومساهمات بعض الشركات الأخرى ، وتودع الكفالات لدى شركة ائتمان كضمان .
سندات متميزة bonds, premium سندات تباع بسعر أعلى من القيمة الاسمية لها .	سندات كوبونية (قسيمية) bonds, coupon

<p>حيث v قيمة السند ، s قيمته الاستردادية ، r قيمة كل دفعة ربحية ، n عدد الدفعات قبل تاريخ استحقاق الاسترداد ، i الفائدة لكل فترة زمنية .</p> <p>نظرية القيمة المتوسطة لـ "بونيت" Bonnet's mean value theorem (انظر : نظريات القيمة المتوسطة للتكاملات) mean value theorems for integrals أو (قوانين المتوسط للتكاملات) laws of the mean for integrals</p> <p>bonus منحة مبلغ من المال يدفع بالإضافة إلى المبالغ التي تدفع بصفة دورية ، مثل المضاف إلى الأرباح الموزعة ، والمرتببات ، . . .</p> <p>القيمة الدفترية لدين ما book value of a debt الفرق بين القيمة الاسمية للدين والمال الذي يجنب في فترات معينة ويوظف لتسديد الدين أو استهلاكه . إذا استهلك الدين فإن القيمة</p>	<p>bonds, registered سندات مسجلة سندات ملكيتها مسجلة لدى المدين ، وتدفع فوائدها بشيكات للمالك مباشرة .</p> <p>bonds, serial سندات متسلسلة سندات تصدر بحيث يكون جزء منها مستحقاً للسداد عند تاريخ معين وبقية الأجزاء يستحق سدادها عند تواريخ محددة لاحقة .</p> <p>bonds table جدول السندات جدول يبين قيمة السند إذا علم سعره الاسمي وسعر الاستثمار للمدد المختلفة . ويوضع الجدول عادة على أساس حساب الفائدة (الربح) كل نصف سنة وبفرض أن السند يسترده طبقاً لسعره الاسمي .</p> <p>bonds, valuation of تقييم السندات حساب القيمة الحالية للقيمة الاسمية للسند ودفعات الأرباح ، طبقاً لمعدل الفائدة المتفق عليه : $V = \frac{C}{s} + \frac{[V(s+1) - 1]r}{s}$</p>
---	--

<p>Boolean connective رابط بولياني</p> <p>رابط يستخدم لربط المؤثر عليه operands في تقرير لعملية بوليانية وبين نوع العملية .</p>	<p>الدفترية هي القيمة التي إذا أضيفت إليها الأرباح تساوى قيمة الدين من تاريخ الاستحقاق .</p>
<p>Boolean function دالة بوليانية</p> <p>= logic function = دالة منطقية</p> <p>دالة في الجبر البولياني تكتب على أنها صيغة مكونة من حدانيين (يأخذان قيمة الصفر أو الواحد) متحدين باستخدام العمليات الثنائية والأحادية للجبر البولياني . فمثلاً الدالة $D = (A \vee B) \wedge C$ تكون قيمتها صفراً أو واحداً لأى قيم للمتغيرات المكونة لها .</p>	<p>القيمة الدفترية للأصول المستهلكة</p> <p>book value of depreciating assets</p> <p>الفرق بين سعر التكلفة وقيم الاستهلاك المتراكمة عند تاريخ تقدير القيمة الدفترية .</p>
<p>Boolean logic منطق بولياني</p> <p>(انظر : جبر بولياني algebra, Boolean)</p>	<p>بولياني Boolean</p> <p>صفة تطلق على المتغيرات والدوال والعلاقات الجبرية التي تتعامل بالنظام الثنائي . والمصطلح مسوب إلى العالم الانجليزي " جورج بول " George Boole (١٨٦٥) .</p>
<p>Boolean matrix مصفوفة بوليانية</p> <p>منظومة ثنائية البعد كل عنصر فيها إما صواب وإما خطأ .</p>	<p>جبر بولياني Boolean algebra</p> <p>(انظر : جبر بولياني algebra, Boolean)</p>
<p>Boolean operation عملية بوليانية</p> <p>عملية تجرى طبقاً لقواعد الجبر البولياني .</p>	<p>النفى Boolean complementation</p> <p>= negation</p> <p>(انظر : النفى negation) .</p>

إحدى القيمتين الدالتين على الصواب أو الخطأ .

bootstrap البادئ

مجموعة من العمليات المحددة اللازمة لبدء تحميل نظام ما أو تشغيله . يستخدم اللفظ صفة بالمفهوم نفسه كما في :

- المحمل البادئ bootstrap loader ،
- الذاكرة البادئة bootstrap memory ،
- العملية البادئة bootstrap process .

إنقاص درجة المحدد

bordering a determinant

حذف صف وعمود في المحدد مشتركين في عنصر يساوى الوحدة بينما بقية عناصر الصف أو العمود تساوى الصفر . هذه العملية تنقص درجة المحدد درجة واحدة ولكنها لا تغير من قيمته . فمثلاً ،

$$\begin{vmatrix} 6 & 5 & \text{صفر} \\ 1 & \text{صفر} & \text{صفر} \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 & 1 \\ \text{صفر} & 5 & \text{صفر} & 6 \\ \text{صفر} & \text{صفر} & \text{صفر} & 1 \\ \text{صفر} & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & \text{صفر} \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 5 + =$$

جدول عملية بوليانية

Boolean operation table

جدول يبين القيم التي تنتج لتآلفات خاصة من الأرقام الثنائية (بيتات) نتيجة لتأثير عملية بوليانية . وعند تقسيم القيم على أنها صواب أو خطأ يعرف الجدول بجدول الصواب .

Boolean ring حلقة بوليانية

حلقة (س ، + ، ×) بحيث س × س = س ، س + س = صفرًا لكل س ∃ س .

Boolean σ-ring حلقة بوليانية

حلقة بوليانية (س ، + ، ×) لكل فئة جزئية قابلة للعد منها حد علوى أدنى بالنسبة للترتيب الطبيعي على الفئة س .

Boolean space فراغ بولياني

فراغ هاوسدورف Hausdorff تكون فيه عائلة كل الفئات المكتنزة المفتوحة أساساً لطوبولوجى هذا الفراغ .

Boolean value قيمة بوليانية
= logical value = قيمة منطقية

تكون كل نقطة تنتمي إلى فترة مغلقة ومحدودة \mathbb{R} نقطة داخلية لواحدة على الأقل من فترات الفئة \mathbb{R} ، فإنه يوجد عدد نهائى من فترات \mathbb{R} بحيث تكون كل نقطة من نقط \mathbb{R} نقطة داخلية لواحدة من فترات هذه الفئة النهائية . وبصورة مجردة (للفراغات المقياسية أو الطوبولوجية التى تحقق المسلمة الثانية لقابلية العد second axiom of countability) إذا كانت \mathbb{R} فئة مغلقة ومكتنزة وكانت \mathbb{R} منظومة من الفئات المفتوحة بحيث أن كل عنصر من عناصر \mathbb{R} ينتمى إلى واحدة على الأقل من فئات \mathbb{R} ، فإنه يوجد عدد محدود من فئات \mathbb{R} بحيث تنتمى كل نقطة من نقط \mathbb{R} إلى واحدة على الأقل من هذه الفئات . (وتعرف هذه الصورة الأخيرة للنظرية باسم نظرية بوريل - ليبيج Borel-Lebesgue theorem) .

تعريف " بوريل " الأول لمجموع متسلسلة تباعدية

Borel's first definition of the sum of a divergent series

إذا كانت مح $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ المتسلسلة المطلوب جمعها ، فإن مجموعها طبقاً للتعريف الأول لبوريل هو :

دالة " بوريل " القابلة للقياس

Borel measurable function

اسم آخر لدالة " بير " (انظر : دالة " بير " Baire function)

فئة " بوريل " **Borel set**

أى فئة يمكن الحصول عليها بالتطبيق المتكرر مرات قابلة للعد من عمليات الاتحاد والتقاطع والمكملات على الفئات المغلقة والمفتوحة على خط الأعداد الحقيقية . وفصل جميع فئات " بوريل " هو جبر σ المولد بفصل جميع الفئات المفتوحة ، أو فصل جميع الفئات المغلقة ، أو فصل جميع الفترات . ومن أمثلة فئات بوريل :
(١) اتحاد فئات مغلقة مرات قابلة للعد .
(٢) تقاطع فئات مفتوحة مرات قابلة للعد .
وكل فئات بوريل قابلة للقياس ، ولذلك تسمى فئة " بوريل " أحياناً فئة " بوريل " القابلة للقياس Borel measurable set .

نظرية " هاينى وبوريل "

Borel theorem, Heine-

= نظرية الغطاء لبوريل

= Borel covering theorem

إذا كانت \mathbb{R} فئة لا نهائية من الفترات بحيث

<p>من مجموعة جسيمات متطابقة .</p>	$\sum_{\alpha=0}^{\infty} \left(\frac{s_{\alpha}}{r^{\alpha}} \right) \quad \text{حيث } s_{\alpha} = \text{صفر} \quad \text{لـ } \alpha \geq 1$
<p>bound charge شحنة مقيدة</p> <p>شحنة كهربائية تتولد على الجانب القريب لموصل معزول موضوع قريباً من شحنة كهربائية مؤثرة . ونوع الشحنة المقيدة يخالف نوع الشحنة المؤثرة .</p>	<p>حيث $s_{\alpha} = \frac{\text{له}}{r^{\alpha}} \quad \text{صفر} \quad \text{لـ } \alpha \geq 1$</p> <p>(انظر : مجموع المتسلسلات التباعدية) (summation of divergent series)</p>
<p>أكبر حد أدنى (٢ ح د)</p> <p>bound, greatest lower (glb)</p> <p>يكون العدد ل أكبر حد أدنى لفئة s_r من الأعداد الحقيقية إذا كان ل حداً أدنى لها وأكبر من أى حد أدنى آخر لها . فمثلاً كل من الأعداد صفر ، - ٢ ، - ٥ ، ٥ حد أدنى لفئة الأعداد الحقيقية الموجبة ولكن الصفر أكبر حد أدنى لها ، كما أن الصفر هو أكبر حد أدنى لفئة الأعداد $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$</p> <p>(انظر : حد أدنى lower bound)</p>	<p>تعريف بوريل التكاملى لمجموع متسلسلة تباعدية</p> <p>Borel's integral definition of the sum of a divergent series</p> <p>مجموع المتسلسلة $\sum_{r=0}^{\infty} \frac{s_r}{r!}$ يعرف كالتالى :</p> $\lim_{s \rightarrow \infty} \left\{ \sum_{r=0}^{\infty} \frac{s_r}{r!} \left(\frac{s}{s+1} \right)^s \right\}$ <p>حيث s متغير حقيقى ، وذلك إذا تحقق وجود هذه النهاية .</p> <p>(انظر : مجموع المتسلسلات التباعدية) (summation of divergent series)</p>
<p>أصغر حد أعلى (٢ ح ع)</p> <p>bound, least upper (lub)</p> <p>يكون العدد ك أصغر حد أعلى لفئة s_r من</p>	<p>إحصاء " بوز و أينشتين "</p> <p>Bose — Einstein statistics</p> <p>ميكانيكا الكم الإحصائية التى يمكن أن تُشغل كل حالة كم فيها بأكثر من جسيم</p>

<p>= الحد الأعلى لمتتابعة = the upper bound of a sequence</p> <p>أكبر عنصر في المتتابعة إذا وجد ، وإلا فإنه يكون عدد له بحيث يوجد دائماً عناصر للمتتابعة بين له - \exists ، له لكل $\exists < \infty$ مع عدم وجود عناصر أكبر من له .</p>	<p>الأعداد الحقيقية إذا كان ك حداً أعلى لها وأصغر من أي حد أعلى آخر لها . فمثلاً كل من الأعداد صفر ، ٣ ، ٥ ، حداً أعلى لفئة الأعداد الحقيقية السالبة ، ولكن الصفر أصغر حد أعلى لها ، كما أن العدد $\frac{1}{3}$ هو أصغر حد أعلى لفئة الأعداد ٣ ، ٣٣ ، ٣٣٣ ، ... (انظر : حد أعلى upper bound)</p>
<p>حد أدنى لمتتابعة bound to a sequence, lower</p> <p>يكون العدد ل حداً أدنى لمتتابعة $\{a_n\}$ من الأعداد الحقيقية إذا كان $a_n \geq l$ لكل $n \in \mathbb{N}$.</p>	<p>حد أدنى bound, lower</p> <p>يكون العدد ل حداً أدنى لفئة S من الأعداد الحقيقية إذا كان $l \leq s$ لكل $s \in S$.</p>
<p>حد أعلى لمتتابعة bound to a sequence, upper</p> <p>يكون العدد له حداً أعلى لمتتابعة $\{a_n\}$ من الأعداد الحقيقية إذا كان $a_n \leq M$ لكل $n \in \mathbb{N}$.</p>	<p>أكبر حد أدنى لمتتابعة bound of a sequence, greatest lower</p> <p>= الحد الأدنى لمتتابعة = the lower bound of a sequence</p> <p>أصغر عنصر في المتتابعة إذا وجد ، وإلا فإنه يكون عدد ل بحيث توجد دائماً عناصر للمتتابعة بين $l + \epsilon$ ، ل لكل $\epsilon < \infty$ مع عدم وجود عناصر أصغر من ل .</p>
<p>حد أعلى bound, upper</p> <p>يكون العدد له حداً أعلى لفئة S من الأعداد الحقيقية إذا كان $s \leq M$ له لكل $s \in S$.</p>	<p>أصغر حد أعلى لمتتابعة bound of a sequence, least upper</p>

معجم الرياضيات

$\Delta (\Delta \text{ ي }) = \text{صفرًا لأي سلسلة ي .}$	<p>boundary condition شرط حدى</p> <p>إذا كانت المجموعة التفاضلية</p> <p>$\Delta (\text{س}) = \text{ر} (\text{س})$ ، $\Delta (\text{ف}) = \text{ب}$ لها حل فإن هذا الحل يكون وحيداً وفي هذه الحالة تسمى المعادلة $\Delta (\text{ف}) = \text{ب}$ شرطاً حدياً للمعادلة التفاضلية $\Delta (\text{س}) = \text{ر} (\text{س})$.</p>
<p>boundary of a set حد فئة</p> <p>= frontier of a set</p> <p>فئة جميع النقط التى تنتمى لمغلقة الفئة ولمغلقة متمماتها .</p> <p>(انظر : مغلقة فئة closure of a set)</p>	<p>boundary layer طبقة حدية</p> <p>طبقة رقيقة للغاية تلامس جسماً يعترض السريان النسبى لمائع منخفض اللزوجة كالهواء أو الماء ، أو طبقة رقيقة جداً تلى مباشرة جدران أنبوبة ثابتة يسرى فيها مائع . وفي هذه المنطقة الحدية تقترب سرعة المائع من الصفر .</p>
<p>boundary of a simplex حد تبسيطة</p> <p>حد التبسيطة الرائية البعدى ر ، هو السلسلة التى بعدها $(1 - \text{ر})$ والمعروفة كالتالى :</p> $\Delta (\text{ي}) = \text{ب}_1^{1-\text{ر}} + \text{ب}_2^{1-\text{ر}} + \dots + \text{ب}_\text{ن}^{1-\text{ر}}$ <p>حيث $\text{ب}_1^{1-\text{ر}} , \dots , \text{ب}_\text{ن}^{1-\text{ر}}$ فئة جميع أوجه ي التى بعدها $(1 - \text{ر})$ ، $\text{ب}_\text{ن}^{1-\text{ر}}$ تساوى $1 +$ أو $1 -$ حسب ما إذا كانت ي ، $\text{ب}_\text{ن}^{1-\text{ر}}$ مترابطة التوجيه coherently oriented أو غير مترابطة التوجيه noncoherently oriented ، ويفترض أن الحد $\Delta (\text{ي})$ يساوى الصفر .</p>	<p>boundary of a chain حد سلسلة</p> <p>حد السلسلة الرائية البعد</p> <p>$\text{ي} = \text{ب}_1^{1-\text{ر}} + \text{ب}_2^{1-\text{ر}} + \dots + \text{ب}_\text{ن}^{1-\text{ر}}$ حيث $\text{ب}_1^{1-\text{ر}} , \dots , \text{ب}_\text{ن}^{1-\text{ر}}$ تبسيطات موجهة رائية البعد لتبسيطة مركبة ي هو</p> $\Delta (\text{ي}) = \Delta (\text{ب}_1^{1-\text{ر}}) + \Delta (\text{ب}_2^{1-\text{ر}}) + \dots + \Delta (\text{ب}_\text{ن}^{1-\text{ر}})$ <p>ومن هذا ينتج أن حد الحد يساوى صفرًا ، أى أن</p>
<p>boundary point نقطة حدية</p> <p>يقال لنقطة س أنها نقطة حدية لفئة ي فى</p>	


مسألة قيم حدية (معادلات تفاضلية)
boundary value problem
(differential equations)
 إيجاد حل لمعادلة تفاضلية أو لمجموعة
 من المعادلات التفاضلية المعطاة يحقق
 بعضاً من الشروط المحددة لفئة معلومة
 من قيم المتغير المستقل (النقط الحدية) .
 وكثير من مسائل الرياضيات الفيزيائية من
 هذا النوع .

مسألة الشروط الحدية الأولى في نظرية
 الجهد (مسألة " دريشلت ")

boundary value problem of potential
theory, first (the Dirichlet problem)

إذا كانت γ منطقة يحدها السطح S_γ ،
 وكانت دالة معرفة ومتصلة على S_γ فإن المسألة
 تكون تعيين الحل $\Delta u = 0$ لمعادلة لابلاس
 $\Delta u = 0$ صفراً بحيث :
 (١) تكون Δu منتظمة على γ ،
 (٢) تكون Δu متصلة على $\gamma + S_\gamma$ ،
 (٣) تتحقق المعادلة $\Delta u = 0$ د على الحد . وهذه
 المسألة تظهر في الكهرباء الساكنة
 (الاستاتيكية) وفي سريان الحرارة وغيرها ، ولها
 حل واحد على الأكثر . وتنسب هذه المسألة إلى
 العالم " دريشلت " .

فراغ S_γ إذا كان كل جوار للنقطة S_γ
 يحوى نقطاً تنتمى إلى γ ونقطاً لا تنتمى
 إليها ، وليس من الضروري أن تنتمى S_γ
 إلى γ . فمثلاً S_γ نقطة حدية للفئة γ
 المبينة بالشكل (١) ، وكل نقطة من نقط الدائرة
 $S_\gamma = \gamma + \gamma$ تكون نقطة
 حدية للفئة $\{ (S, \gamma) : S_\gamma + \gamma > \gamma \}$
 المظللة بالشكل (٢)



مسألة قيم حدية ثنائية التوافقية

boundary value problem, biharmonic

تعيين دالة $\Delta^2 u = 0$ (S, γ, γ) ثنائية
 التوافقية على منطقة γ محدودة بـ S_γ
 بحيث تنطبق مشتقات γ الجزئية من
 الرتبة الأولى على قيم دوال معطاة على الحد
 S_γ . وتظهر هذه المسألة مع مسألة " دريشلت "
 فى بعض الدراسات المتعلقة بالأجسام
 المرنة .

<p>محدودة من أعلى</p> <p>bounded from above</p> <p>تكون الفئة s محدودة من أعلى إذا كان لها حد أعلى .</p>	<p>مسألة الشروط الحدية الثانية في نظرية الجهد (مسألة " نويمان ")</p> <p>boundary value problem of potential theory, second (the Neumann problem)</p>
<p>محدود من أسفل</p> <p>bounded from below</p> <p>تكون الفئة s محدودة من أسفل إذا كان لها حد أدنى .</p>	<p>إذا كانت s منطقة يحدها السطح s وكانت دالة معرفة ومتصلة على s بحيث ينعدم $\nabla^2 \Psi = 0$ فإن المسألة تكون إيجاد حل لمعادلة لابلاس $\nabla^2 \Psi = 0$ صفراً بحيث :</p>
<p>دالة محدودة أساسياً</p> <p>bounded function, essentially</p> <p>يقال لدالة d أنها محدودة أساسياً إذا وجد عدد له بحيث يكون مقياس فئة جميع النقاط s التي تحقق $d(s) < \epsilon$ له مساوياً للصفر . وأكبر حد أدنى للأعداد له هو الحد الأعلى الأساسي essential supremum للدالة $d(s)$.</p>	<p>(١) تكون Ψ منتظمة على s ، (٢) تكون Ψ ومشتقتها في الاتجاه العمودي على s متصلة على s ، (٣) تكون مشتقة Ψ في الاتجاه العمودي على الحد s مساوية للدالة d . وهذه المسألة تظهر في ديناميكا الموائع وفي غيرها ، وأي حلين لها لا يختلفان إلا بثابت وتنسب هذه المسألة إلى العالم " نويمان " .</p> <p>(انظر : دالة " نويمان " (نظرية الجهد)) (Neumann function (potential theory))</p>
<p>تحويل خطي محدود</p> <p>bounded linear transformation</p> <p>يقال لتحويل خطي T من فراغ اتجاهي</p>	<p>إلكترون مقيد bounded electron</p> <p>إلكترون . تربطه بنواة الذرة قوة جذب كهربائية .</p>

<p>bounded region منطقة محدودة</p> <p>يقال لمنطقة مستوية (مفتوحة أو مغلقة أو غير مفتوحة أو غير مغلقة) إنها محدودة إذا كانت كل نقطة من نقطها نقطة داخلية لمستطيل ما . فمثلاً التمثيل الهندسي للفئة</p> $\{ (s, v) : s^2 + v^2 > 25 \}$ <p>منطقة مفتوحة محدودة .</p>	<p>معياري إلى فراغ اتجاہی معیاری آخر إنه محدود إذا وجد ثابت له بحيث أن</p> $\ r(s)\ \geq \ s\ \text{ لكل } s \text{ في الفراغ الأول .}$
<p>والمنطقة المكونة من نقط قطع ناقص ونقط داخلية منطقة مغلقة محدودة .</p> <p>وقد تكون المنطقة مغلقة وليست محدودة ، فمثلاً التمثيل الهندسي للفئة</p> $\{ (s, v) : v \leq 3 \}$ <p>منطقة مغلقة وليست محدودة .</p>	<p>bounded mapping راسم محدود</p> <p>يكون الراسم د من فئة س_{هـ} إلى ح_{هـ} محدوداً إذا وجد عدد حقيقي له بحيث أن</p> $ d(s) \geq \ s\ \text{ لكل } s \in S.$
<p>bounded sequence متتابة محدودة</p> <p>متتابة لها حد أعلى وحد أدنى .</p>	<p>كمية أو دالة محدودة</p> <p>bounded quantity or function</p> <p>كمية أو دالة قيمتها العددية دائماً أقل من أو تساوى ثابتاً مختاراً اختياراً جيداً .</p> <p>فمثلاً النسبة بين طول أى من ساقى مثلث قائم الزاوية إلى طول الوتر كمية محدودة وذلك لأن هذه النسبة تكون دائماً أقل من أو تساوى واحداً .</p>
<p>bounded set فئة محدودة</p> <p>فئة محدودة من أسفل ومن أعلى .</p> <p>فئة محدودة من فراغ مقياسي</p> <p>bounded set of a metric space</p>	<p>الدالتان ح_ا س ، جتاس محدودتان لأن كلا منهما دائماً أصغر من أو تساوى واحداً .</p> <p>أما الدالة ظاس فليست محدودة في الفترة</p> $\left[\frac{p}{q}, \infty \right) .$

وجدت لكل \in أكبر من الصفر فئة نهائية s_n من نقط s_n بحيث تكون كل نقطة من نقط s_n على بعد أقل من \in من نقطة واحدة على الأقل من نقط s_n .

دالة محدودة التغير

bounded (limited) variation, function of

يقال لدالة D من $[a, b]$ إلى \mathbb{R} أنها محدودة التغير على الفترة $[a, b]$ إذا كان أصغر حد أعلى للمقدار

$$\sum_{r=1}^n \left| \Delta D_r \right| \text{ أصغر من } +\infty ,$$

حيث $\Delta D_r = D(s_r) - D(s_{r-1})$ والفئة $\{s_0, s_1, \dots, s_n\}$ تجزئ الفترة $[a, b]$ ، مع حساب أصغر حد أعلى لهذا المجموع على جميع تجزئات الفترة $[a, b]$. فمثلاً إذا كانت الدالة D مطردة الزيادة (أو النقصان) على الفترة $[a, b]$ فإنها تكون محدودة التغير على الفترة $[a, b]$ وذلك لأن أصغر حد أعلى للمقدار

$$\sum_{r=1}^n \left| \Delta D_r \right| \text{ يساوي } |D(b) - D(a)| .$$

يقال لفئة s_n من فراغ مقياسي (M, μ) إنها محدودة إذا وجد عدد حقيقي له ، ووجدت $y \in s_n$ بحيث يكون $\mu(y, s) > 0$ لكل $s \in s_n$.

فئة محدودة من الأعداد

bounded set of numbers

فئة من الأعداد يقع كل منها بين عددين محددين ، أي أنه يوجد عددان a, b بحيث $a \leq x \leq b$ لكل عدد x في الفئة .

فئة محدودة من النقط

bounded set of points

فئة من النقط فئة الأبعاد بين كل نقطتين منها محدودة ، ويسمى أصغر حد أعلى لهذه الأبعاد قطر الفئة diameter .

فئة محدودة تماماً

bounded set, totally

يقال لفئة s_n من النقط إنها محدودة تماماً إذا

مباراة فيها ثلاثة صناديق مرقمة بالأرقام ١ ، ٢ ، ٣ للعبة معينة في المباراة ، يزيل اللاعب ٢ قاع أحد الصناديق دون أن يعلم اللاعب ب أى هذه الصناديق أزيل قاعه . اللاعب ب يضع قادراً من النقود في صندوقين من الصناديق الثلاثة مساوياً للرقم المسجل على كل منهما .

يخسر اللاعب ب النقود التي يكون قد وضعها في الصندوق المزال قاعه ويكسب ما يوازي النقود التي يكون قد وضعها في صندوق غير مزال قاعه . وهذه المباراة هي مباراة مجموع صفري zero-sum game مع معلومات غير تامة imperfect information . مصفوفة الربح pay-off matrix ليس لها نقطة سرجية saddle point والحلول هي استراتيجيات مختلطة mixed strategies . والحلول هي (صفر ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{4}$) بالنسبة إلى ٢ ، ($\frac{3}{5}$ ، $\frac{2}{5}$ ، صفر) بالنسبة إلى ١ ، بمعنى أن ٢ يزيح قاع الصندوق ١ أو ٢ أو ٣ باحتمالات صفر ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{4}$ على الترتيب واللاعب ب يضع نقوداً في

الصناديق ١ ، ٢ أو ١ ، ٣ أو ٢ ، ٣ باحتمالات $\frac{3}{5}$ ، $\frac{2}{5}$ ، صفر على الترتيب . وقيمة هذه المباراة تساوى ١ مع اعتبار أن ب هو اللاعب المعظم maximizing player .

متتابعة محدودة التقارب

boundedly convergent sequence

متتابعة محدودة بانتظام uniformly bounded وتقاربية .

حدا الفصل (في الإحصاء)

bounds, class (in statistics) = limits of a class interval

النهايتان العليا والسفلى لفصل من قيم موزعة على فترة .

حدا التكامل bounds of integration في التكامل المحدد

أ د (س) د س

٢ ، ب حدا التكامل ، ويسمى ٢ الحد السفلى للتكامل lower bound of integration ، ب الحد العلوى للتكامل upper bound of integration.

مباراة الصناديق الثلاثة

boxes game, the three

مسألة المسار الأقصر زمناً

brachistrone (brachistochrone)

problem

مسألة في حساب المتغيرات تختص بإيجاد معادلة المسار الذي يتخذه جسيم هابط من نقطة إلى أخرى في أقصر وقت . وقد اقترح "جون برنولي" John Bernoulli هذه المسألة في سنة ١٦٩٦ . ومن السهل إثبات أن الزمن اللازم لهبوط جسيم بسرعة ابتدائية ع على امتداد منحني ص = د (س) من النقطة (س_١ ، صفر) إلى النقطة (س_٢ ، ص) هو

$$= \int_{s_1}^{s_2} \frac{1}{\sqrt{2g}} \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{ds}{dx} \right)^2}{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{ds}{dx} \right)^2}} dx$$

حيث g عجلة الجاذبية الأرضية ،

$$= \frac{2g}{\sqrt{2g}} \cdot \text{وحل هذه المسألة يتطلب إيجاد}$$

دالة ص (س) تجعل قيمة هذا التكامل أصغر ما يمكن .

brackett

قوس

(انظر : علامات التجميع
aggregation, signs of)

قانون "بويل وتشارلز"

Boyle- Charles law

قانون ينص على أن حاصل ضرب حجم كمية معينة من الغاز في ضغطها يتناسب مع درجة حرارة الغاز . ويسمى هذا القانون كذلك القانون العام للغازات . general law of gases

قانون "بويل" Boyle's law

قانون ينص على أن حاصل ضرب حجم غاز في ضغطه يساوي مقداراً ثابتاً وذلك عند ثبات درجة حرارة الغاز . ويسمى هذا القانون أيضاً قانون "بويل" و"ماريوت" Boyle and Mariott's law وهو صحيح إلى درجة كبيرة للضغوط العادية .

حاصران braces

{ القوسان } يستخدمان لتجميع الكميات . وتعتبر الحدود المحتواة بينهما حداً مستقلاً ، ويستخدم الحاصران بصورة خاصة مع الفئات .

(انظر : علامات التجميع
aggregation, signs of)

أو نقط النهايات العظمى والصغرى . ومثال ذلك فرعاً القطع الزائد $1 = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$

فرع لا نهائى من منحنى

branch of a curve, infinite

جزء المنحنى الذى لا يمكن احتواؤه فى أى دائرة نهائية .

فرع لدالة تحليلية متعددة القيم

branch of a multiple-valued analytic function

الدالة التحليلية الوحيدة القيمة $y = f(x)$ المناظرة لقيم x على طية واحدة من سطح ريمان المعروف بهذه الدالة .

نقطة تفرع (فى الحاسب)

branch point (in computer)

نقطة فى برنامج أو فى جزء منه (routine) يتم عندها اختيار واحد أو أكثر من الاتجاهات التى يمكن أن توجه إليها العمليات عند التفرع .

تفرع مشروط branch, conditional
أمر يؤدي إلى تحويل تتابع العمليات فى اتجاه معين عند تحقق شرط أو أكثر من الشروط التى يتضمنها هذا الأمر .

فرع قاطع لسطح " ريمان "

branch cut of a Riemann surface

خط مستقيم أو منحنى على سطح " ريمان " مكون من نقط شاذة ويستخدم لتحديد فرع لدالة متعددة القيم. وعند عبور فرع قاطع لسطح ريمان يمكن اعتبار أى نقطة متغيرة كما لو كانت مارة من طية للسطح إلى أخرى .

أمر تفرع branch instruction
إجراء يؤدي إلى انقطاع التتابع المتصل فى تنفيذ التعليقات التى يتضمنها البرنامج وتوجيه العمليات فى اتجاه آخر لتنفيذ الأوامر التى يشير الإجراء إليها .

فرع منحنى branch of a curve

جزء من المنحنى تفصله عن الأجزاء الأخرى نقط انفصال أو نقط خاصة كنقط الرؤوس ،

نقطة القطع في بدء الخطأ .	نقطة تفرع لسطح " ريمان "
رمز نقطة القطع break-point symbol	branch point of a Riemann surface
رمز متضمن أحد الأوامر الموجودة في برنامج معين يؤدي إلى توقف البرنامج عند استخدامه .	نقطة على سطح ريمان تتساند عندها طيتان أو أكثر من طيات السطح .
نظرية "براينكون"	تفرع غير مشروط
Brianchon's theorem	branch, unconditional
إذا أحاط مسدس بقطع مخروطي فإن الخطوط المستقيمة الواصلة بين أزواج رؤوس المسدس المتقابلة تتلاقى في نقطة واحدة .	إجراء يؤدي إلى تحويل العمليات في اتجاه معين تشير إليه .
كوبري إقليدس	عرض شكلٍ مستوٍ
bridge of fools (Pons Asinorum)	breadth of a plane figure = width of a plane figure
النظرية التي تنص على أن زاويتي قاعدة المثلث المتساوي الساقين متساويتان . وقد سميت كذلك لأن الشكل الذي استخدمه إقليدس لإثباتها كان يشبه قاعدة truss كوبري .	طول مقطع من شكل مستوٍ جميع مقاطعه متساوية في الطول .
الحمل (في عملية الجمع)	إذا لم تكن جميع مقاطع الشكل المستوي متساوية في الطول فإن العرض يأخذ على أنه المقطع الأكبر طولاً .
bridging (in addition)	break-point switch مفتاح نقطة القطع
	مفتاح يدوي يستخدم في إصلاح أخطاء البرنامج ، ويتحكم في الشروط المختلفة عند

<p>وحدة الحرارة البريطانية British thermal unit (B.T.U) كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل واحد من الماء درجة واحدة فاهرنهيت عندما يبلغ الماء كثافته العظمى ، أى عند درجة حرارة $4^{\circ}\text{م} = 39,2^{\circ}\text{ف}$.</p>	<p>عند جمع الأعداد نقوم بجمع أرقام المنزلة الواحدة في كل منها ، وإذا زاد حاصل هذا الجمع عن التسعة (في النظام العشري) فإننا نقوم بعملية الحمل للمنزلة التالية . فمثلاً في عملية الجمع $9 + 15 = 24$ قمنا بحمل عشرة واحدة إلى منزلة العشرات (التي تلي منزلة الآحاد) ، بينما في عملية الجمع $3 + 14 = 17$ لم يحدث ذلك .</p>
<p>خط منكسر broken line اتحاد قطع مستقيمة متصلة نهاية بنهاية بحيث : (أ) لا تقع كل قطعتين مستقيمتين متتاليتين على خط مستقيم واحد . (ب) لا تشترك أكثر من قطعتين مستقيمتين في نفس نقطة النهاية .</p>	<p>الاستعارة (الاستلاف في عملية الطرح) bridging (in subtraction) عند طرح عدد من آخر ، وتضمن العدد الأول منزلة فيها رقم أكبر من الرقم الموجود في نفس المنزلة بالعدد الثاني فإننا نقوم بعملية الاستعارة . ففي عمليتي الطرح التاليتين : $8 - 65 = 57$ ، $200 - 110 = 90$ قمنا بالاستعارة، بينما في عملية الطرح $11 - 52 = 52$ لم تدع الحاجة إليها .</p>
<p>سمسار broker الشخص الذى يتوسط في بيع وشراء السندات والأوراق المالية لقاء نسبة معينة من هذه السندات أو هذه الأوراق المالية .</p>	<p>لوغاريتمات "برجز" Brigg's logarithms = اللوغاريتمات الاعتيادية = common logarithms اللوغاريتمات التي أساسها العشرة .</p>
<p>سمسرة brokerage المبلغ الذى يدفع للسمسار عند بيع أو شراء السندات والأسهم والعقود المالية الأخرى .</p>	

<p>حاس كهربائي (في الحاسب) brush (in computer) موصل كهربى يستخدم فى بعض الأنظمة كوسيلة حس للتيقن من وجود ثقب فى بطاقة تثقيب .</p>	<p>نظرية " براور " للاختزال Brouwer reduction theorem نظرية تنص على أنه إذا كانت γ فئة جزئية مغلقة من فراغ طوبولوجى S يحقق مسلمة العد الثانية وكانت γ لها خاصية حانة inductive γ ، فإنه يوجد فئة جزئية مغلقة غير مختزلة من γ لها الخاصية γ .</p>
<p>الضغط الفقاعى bubble pressure ضغط الغاز داخل فقاعة فى سائل ، ويزيد هذا الضغط من ضغط السائل المحيط بالفقاعة بمقدار يساوى ضغط التوتر السطحي للسائل مقسوماً على نصف قطر الفقاعة .</p>	<p>نظرية النقطة الثابتة لـ " براور " Brouwer's fixed point theorem نظرية تنص على أنه إذا كان γ قرصاً مكوناً من دائرة وداخليتها فإنه لـ γ تحويل متصل يرسم كل نقطة من γ إلى نقطة من γ . توجد نقطة تظل ثابتة تحت تأثير هذا التحويل . ولا يفترض أن يكون التحويل أحادياً . وهذه النظرية صحيحة للخلايا المغلقة النونية البعد ($n \leq 1$) ، أى مثلاً لفترة مغلقة أولكرة مع داخليتها .</p>
<p>خانة bucket جزء من المسار الدائرى للقرص المغنطيسى يمثل وحدة فعلية لتخزين البيانات .</p>	<p>حركة براونية Brownian movement حركة عشوائية غير منتظمة للجسيمات الدقيقة المعلقة فى مائع .</p>
<p>انبعاث buckling التحذب تحت تأثير قوة ضاغطة .</p>	<p>حركة براونية Brownian movement حركة عشوائية غير منتظمة للجسيمات الدقيقة المعلقة فى مائع .</p>
<p>انفعال الانبعاج buckling strain الانفعال الناشء عن الانبعاج .</p>	<p>حركة براونية Brownian movement حركة عشوائية غير منتظمة للجسيمات الدقيقة المعلقة فى مائع .</p>

<p>والمتابعة - ٣ ، - ٢ ، ٦ ، ٦ . ت (صفر) - ت (١) = ١ - ٢ = ١ وإذن يوجد جذر حقيقى واحد بين صفر وواحد . بالمثل يقع جذر حقيقى واحد بين ٢ ، ٣ وآخر بين - ٣ ، - ٢ .</p>	<p>شدة الانبعاج buckling strength المقاومة الناشئة عن الانبعاج . إجهاد الانبعاج buckling stress الإجهاد الناشئ عن الانبعاج .</p>
<p>وسيط (فى الحاسب) buffer (in computer) = inverse gate بوابة عكسية (١) مخزن لتبادل البيانات بين مرحلتين مختلفتين فى السرعة أو فى طريقة الأداء . (٢) مفتاح يعطى إشارة إذا استقبل أى واحدة من عدة إشارات معينة ، وبالتالي فإن الوسيط هو المكافئ الآلى لأداة الربط المنطقية « أو » .</p>	<p>نظرية " بودان " Budan's theorem نظرية تنص على أن عدد الجذور الحقيقية للمعادلة د (س) = صفراً الواقعة بين ٢ ، ب ، حيث د (س) كثيرة حدود من الدرجة النونية ، ٢ > ب ، يساوى ت (٢) - ت (ب) أو أقل بعدد زوجى ، حيث ت (٢) ، ت (ب) عدد التغيرات فى إشارة المتتابعة : د (س) ، د (س) ، د (س) ، ... ، د (س) عندما س = ٢ ، س = ب على الترتيب .</p>
<p>منطقة تخزين وسيطة buffer, storage جزء من أماكن التخزين الداخلية يتم حجزها لتستخدم : (١) كمنطقة وسيطة بين منطقتين من مناطق التخزين الداخلية . (٢) فى نظم تداول البيانات التى تختلف فيها طريقة أوزمن التداول الخاص بالوحدات</p>	<p>ويراعى استبعاد الحدود المنعدمة فى هذه المتابعة واعتبار الجذر المكرر م من المرات على أنه م من الجذور . فمثلاً ، لإيجاد عدد الجذور الحقيقية للمعادلة س^٣ - ٥س + ١ = صفراً الواقعة بين صفر ، وواحد ، نحصل على المتابعة المذكورة وهى : س^٣ - ٥س + ١ ، س^٢ - ٥ ، ٦س ، ٦ ، ثم نضع س = صفراً ، س = ١ على التوالى لنحصل على المتابعة ١ ، - ٥ ، صفراً ، ٦ ،</p>

معامل المرونة الحجمية
bulk modulus = modulus of volume elasticity = compression modulus
 النسبة بين الإجهاد الضغطى (الضغط الهيدروستاتيكي) الذى يتعرض له وسط مادي وبين الانفعال الحجمى الناتج عن هذا الإجهاد . وهى ترتبط مع معامل " يونج " Young's modulus ومع نسبة " بواسون " Poisson's ratio بالعلاقة :

$$\text{له} = \frac{\gamma}{3(1 - \nu)}$$

حيث ك معامل المرونة الحجمية (ويكون موجبا لجميع المواد الطبيعية) ، γ معامل يونج ، ν نسبة بواسون .

bulk storage خازنة مساعدة
 (انظر : خازنة مساندة backing storage)

bundle of circles حزمة من الدوائر
= net of circles = شبكة من الدوائر
 إذا كانت S_1 ، S_2 ، S_3 أى ثلاث دوائر فى مستوى واحد ومراكزها ليست على استقامة واحدة فإن المعادلة :

المستخدمة فى النظام عندما يتم التعامل بين وحدات الإدخال والإخراج من جهة وبين أماكن التخزين الداخلية من جهة أخرى .

buffer technique تقنية وسيطة
 أسلوب لاختصار الزمن بالعمليات الآنية simultaneous operations وذلك بالمشاركة بين الزمن الذى تستغرقه الوحدات المساعدة وبين الزمن الخاص بوحدة التشغيل المركزى .

bug عيب
 تصرف غير متوقع لبرنامج أولنظام تشغيل ناشئ عن خطأ فى تصميم الحاسب أو فى الوظيفة التى يؤديها أو فى جزء معين من البرنامج .

ميكانيكية ضبط الأخطاء

built-in check

جزء من الحاسب لا يحتاج إلى برامج خاصة أو تدخل من المشتغل على الحاسب ويبدأ عمله عند ظهور الأخطاء .

أنها تسمى متباينة "كوشى وشفارتز" Cauchy-Schwarz inequality ولكن بونياكوفسكى أثار الانتباه إليها قبل شفارتز .

دفع المائع buoyancy
النقص الظاهرى فى وزن جسم مغمور كلياً
أوجزئياً فى مائع .

مركز دفع المائع buoyancy, centre of
مركز ثقل المائع المزاح بجسم يطفو فى حالة
اتزان فى مائع متجانس ساكن فى مجال ثاقل
منتظم .

متناقضة "بورالى وفورتى"

Burali-Forti paradox

المتناقضة التى تنص على أن فئة جميع الأعداد
الترتيبية ordinal numbers ، التى يكون كل
منها نوعاً ترتيبياً order type لفئة مرتبة كلية
well-ordered set ، تكون فئة مرتبة كلية .
وذلك لأن النوع الترتيبى صر لهذه الفئة المرتبة
كلية يكون العدد الترتيبى الأكبر ، وهذا
مستحيل ، لأن النوع الترتيبى صر + ١ للفئة

سر_١ + له سر_٢ + ل سر_٣ = صفراً حيث
له ، ل متغيرات وسيطة تمثل دائرة تنتمى إلى
مجموعة ذات درجتين من درجات الحرية .

متباينة "بونياكوفسكى"

Buniakowski's inequality

مربع تكامل حاصل ضرب دالتين حقيقيتين
على فترة معطاة أو منطقة أقل من أويساوى
حاصل ضرب تكاملى مربعى الدالتين على نفس
الفترة أو المناطق بشرط تحقق وجود جميع هذه
التكاملات . وفى حالة الدوال المركبة تنص هذه
المتباينة على :

$$\left| \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx \right|^2 \leq \int_a^b |f(x)|^2 dx \int_a^b |g(x)|^2 dx$$

$$\left[\begin{matrix} f_1 & f_2 & \dots & f_n \\ g_1 & g_2 & \dots & g_n \end{matrix} \right]$$

حيث د ، مر دالتان مركبتان ، د ، تر الدالتان
المرافقتان لهما .

وهذه المتباينة يمكن استنباطها بسهولة من متباينة
"كوشى" Cauchy's inequality . وتسمى أيضاً
متباينة "شفارتز" Schwarz's inequality كما

معجم الرياضيات

المرتبة كلية والتي نحصل عليها بتقديم عنصر جديد وحيد ليلي كل عنصر من عناصر هذه الفئة يكون عدداً ترتيبياً أكبر .	بين عدد من الوحدات المتصلة بها .
مسار تجميعي bus حزمة من الخطوط تستخدم لتبادل البيانات	بايت (مجموعة أرقام ثنائية) byte سلسلة من الأرقام الثنائية تكون عادة أقصر من الكلمة وتعامل كوحدة مستقلة وتتألف من ثمانية أرقام ثنائية bits .

(C)

<p>كاش = ذاكرة سريعة</p> <p>cache = cache memory</p> <p>ذاكرة ذات سعة محدودة وسرعة عالية في تداول البيانات تستخدم وسيطاً للتنسيق بين سرعتي دوائر التشغيل والذاكرة الرئيسية .</p>	<p>سى (لغة برمجة) C</p> <p>إحدى لغات المستوى الراقى للبرمجة فى الحاسبات ، وقد صممت للحصول على أعلى مستوى وأفضل أسلوب للتشغيل .</p> <p>وهى لغة مشتقة من لغة أيجول ٦٨ ALGOL ، وتستخدم أحياناً لبرمجة بعض التطبيقات فى إطار نظام يونكس UNIX .</p>
<p>ك أ ل</p> <p>CAL</p> <p>لغة ذات مستوى رفيع صممت خصيصاً لأغراض مشاركة الوقت وفيها يستخدم المبرمج آلة كاتبة كونصول عن بعد (Remote console typewriter) موصلة مباشرة بالحاسب ، وبهذه اللغة يتمكن المبرمج من حل المسائل بمساعدة كبيرة من الحاسب . والمصطلح اختزال للتعبير « لغة محادثة جبرية » (conversational algebraic language) .</p>	<p>التأخير الكبلى cable delay</p> <p>الزمن اللازم لمرور بيت واحدة من البيانات خلال الكبل .</p>
<p>عنوان مُولّد</p> <p>calculated address = generated address</p> <p>address</p> <p>(انظر : generated address) .</p>	<p>كبل مكافئى cable, parabolic</p> <p>كبل معلق من طرفيه ويدعم أثقالاً متساوية على أبعاد أفقية متساوية ، ويكون منحني الكبل قطعاً مكافئاً تماماً إذا كانت الأثقال متصلة وموزعة بانتظام على امتداد الخط الأفقى مع إهمال وزن الكبل .</p> <p>ويتدلى الكبل الحامل لكوبرى معلق على شكل قطع مكافئ تقريباً وذلك لعدم إهمال وزن الكبل والحقيقة أن الأثقال مثبتة على فترات وليست موزعة توزيعاً متصلاً .</p>
<p>آلة حاسبة</p> <p>calculating machine = computing machine</p>	

ويستخدم في دراسة السرعات والعجلات والقوى والتقريبات لقيم الدالة ، والقيم العظمى والصغرى وميول المنحنيات وغيرها .
(انظر : مشتقة derivative) .

النظرية الأساسية لحساب التكامل
calculus, fundamental theorem of the integral

إذا كان \bar{d} د (س) د س معرّفاً على أنه
ق (ب) - ق (أ) ، حيث ق (س) دالة بحيث
في (س) $\frac{d}{ds} = \frac{d}{ds}$.

فإن النظرية الأساسية لحساب التكامل تنص على أنه إذا كانت د (س) متصلة ووحيدة القيمة ، فإن

$$\begin{aligned} & \text{نهاية} \left[\bar{d} (س_1) \Delta_1 س + \bar{d} (س_2) \Delta_2 س + \dots + \bar{d} (س_n) \Delta_n س \right] \\ & = \text{نهاية} \sum_{r=1}^n \bar{d} (س_r) \Delta_r س = \bar{d} (س_r) \Delta_r س \\ & = \bar{d} (س) \Delta س \end{aligned}$$

حيث $\Delta_1 س$ ، $\Delta_2 س$ ، $\Delta_3 س$ ، ... ،
 $\Delta_n س$ فترات جزئية غير متراكمة للفتره (ب ، ب)
عددها n ومجموع أطوالها $b - a$ ، وأكبر طول
للفترات الجزئية يقترب من الصفر عندما تقترب

آلة لتنفيذ العمليات الحسابية (مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة) على الأعداد أوتوماتياً ، وتعمل يدوياً أو كهربائياً .

ثاقبة حاسبة
calculating punch
آلة حاسبة ذات قارئة وثاقبة بطاقات .

حساب
calculation
إجراء العمليات الرياضية بتطبيق القوانين والنظريات لإيجاد الصيغ أو النواتج العددية مثل حساب حجم أسطوانة دائرية قائمة معلوم قطر قاعدتها وارتفاعها ، ومثل إيجاد المشتقات الأولى للدوال .

حساب التفاضل والتكامل
calculus
(انظر : حساب التفاضل differential calculus
وحساب التكامل integral calculus) .

حساب التفاضل
calculus, differential
دراسة التغير الناشئ في دالة عن تغيرات في المتغير المستقل (أو المتغيرات المستقلة) باستخدام مفاهيم المشتقة والتفاضلة ،

حساب التغيرات calculus of variations

دراسة نظرية النهايات العظمى والصغرى للتكاملات المحددة التي مكاملها (دالة تكاملها integrand) دالة معلومة في متغير مستقل واحد أو أكثر وفي متغير تابع واحد أو أكثر ومشتقاتها . والمسألة الرئيسية هي تعيين المتغيرات التابعة بحيث يكون التكامل نهاية عظمى أو نهاية صغرى .

أبسط تكامل من هذا النوع يكون على الصورة :

$$L = \int_a^b D(s, v, \dot{v}) ds$$

والمطلوب تعيين الدالة $v(s)$ التي تجعل L نهاية عظمى أو صغرى . وقد نشأ اسم « حساب التغيرات » كنتيجة للمفاهيم التي وضعها « لاجرانج » Lagrange سنة ١٧٦٠ تقريباً .

(انظر : التغير variation) .

وقد درست تكاملات أخرى على الصورة

$$L = \int_a^b D(s, v_1, \dot{v}_1, \dots, v_n, \dot{v}_n) ds$$

حيث v_1, \dots, v_n دوال غير معلومة في المتغير s ، $\dot{v}_1, \dots, \dot{v}_n$ المشتقات الأولى لهذه الدوال بالنسبة للمتغير s . كما درست التكاملات المضاعفة مثل

$$L = \int_a^b \int_a^b D(s, v, \dot{v}, \ddot{v}) ds dv$$

من اللانهاية وحيث s قيمة ما للمتغير s في الفترة Δs .

إذا كان $\int_a^b D(s) ds$ يعرف على أنه النهاية

المذكورة أعلاه ، فإن النظرية الأساسية لحساب التفاضل والتكامل ننص على أنه إذا كان $\int_a^b D(s) ds$ موجوداً ، وكانت $D(s)$ متصلة

عند النقطة الداخلية s للفترة (a, b) ،

فإن مشتقة $\int_a^s D(s) ds$ تساوي $D(s)$.

حساب المتناهيات في الصغر

calculus, infinitesimal

يطلق المصطلح على حساب التفاضل والتكامل العادى بسبب استخدامه للكميات المتناهية في الصغر .

حساب التكامل calculus, integral

دراسة التكامل (integration) وتطبيقاته لإيجاد المساحات والحجوم ، ومراكز الثقل ، ومعادلات المنحنيات وحل المعادلات التفاضلية وغيرها .

النظرية الأساسية لحساب التفاضل والتكامل

calculus, the fundamental theorem of

(انظر : النظرية الأساسية لحساب التكامل
the fundamental theorem of the integral
calculus)

الزمن المتاح (في الحاسبات)

calendar time (in computer)

الزمن الكلى لتشغيل الحاسب في فترة زمنية محددة .

استدعاء (في الحاسب)

call (in computer)

أمر من البرنامج الرئيسى لاستدعاء برنامج فرعى مستقل (closed subroutine) .

أمر نداء بالموقع call by location

طريقة لنقل المجادلات (arguments) من برنامج نداء إلى برنامج جزئى وفيها يمد البرنامج المرجع البرنامج الجزئى بموقع الذاكرة التى يمكن أن توجد عندها القيمة الرمزية للمجادلة .

حيث ع دالة غير معلومة فى المتغيرين س ، ص ، وكذلك تكاملات مضاعفة من رتبة أعلى أو فى عدد أكبر من المتغيرات التابعة .

وقد يكون المكامل أيضاً دالة فى المشتقات من رتب أعلى من الأولى .

{ انظر : مسألة المسار الأقصر زمنياً (مسألة براكتوكرون Brachistochrone problem)
ومسألة تساوى المحيط فى حساب التغيرات isoperimetric problem in the calculus of variations

ومعادلة "أويلر" Euler's equation .

التمهيدية الأساسية لحساب التغيرات
calculus of variations, fundamental lemma of the

تمهيدية تنص على أنه إذا كانت الدالة د (س) متصلة لكل س $\exists [p, b]$

وكان \bar{p} د (س) ر (س) \bar{p} = صفراً ، لكل الدوال ر (س) التى لها مشتقات أولى متصلة لكل س $\exists [p, b]$ ، ر (p) = ر (b) = صفراً فإن د (س) = صفراً على طول الفترة (p, b)

(انظر : حساب التغيرات
calculus of variations)

معجم الرياضيات

مجموعة من الأرقام ترمز إلى برنامج فرعى وتحتوى المعلومات المتعلقة بالمتغيرات الوسيطة التى تدخل فيه ، أو المعلومات التى تستخدم لتصميمه ، أو أية معلومات تتعلق بعمليات أخرى للحاسب .	call by name أمر نداء بالاسم طريقة لنقل المجادلات من برنامج نداء إلى برنامج جزئى وفيها تمرر الصيغة الفعلية إلى البرنامج الجزئى .
callable bonds سندات اختيارية (انظر : bonds, callable)	call by value أمر نداء بالقيمة طريقة لنقل المجادلات من برنامج نداء إلى برنامج جزئى وفيها يمد البرنامج الجزئى بالقيم الرمزية للمجادلة ، بطريق العودة مرة أخرى إلى البرنامج المرجع .
calling sequence متتابة نداءات مجموعة محددة من التعليقات لتصميم ونداء برنامج فرعى وإتاحة البيانات المطلوبة له ، ثم أمر الحاسب بالعودة إلى البرنامج الأسمى بعد تنفيذ البرنامج الفرعى .	call indicator دليل أمر نداء أداة لاستقبال النبضات من نظام تشغيل مفاتيح أوتوماتى وإظهار الرقم المستدعى المناظر أمام المشغل لنظام تشغيل غير أوتوماتى .
calorie (calory) سُعر (كالورى) وحدة كمية الحرارة وهى كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء درجة مئوية واحدة .	call instruction أمر نداء توجيه يوفر مكونات البرنامج العاد (Program counter) قبل التفرع إلى برنامج فرعى .
cancellation الحذف عملية قسمة كل من بسط ومقام كسر على	call number رقم أمر نداء

الجذرين ويجعله مساوياً للصفر ولكن يمكن حساب هذا الجذر بطريقة أخرى من حقيقة أن حاصل ضرب الجذرين يساوى $\frac{c}{p}$.

خاصية الحذف (قانون الحذف)

cancellation property (Law)

العملية الثنائية * لنظام رياضى تحقق خاصية الحذف إذا كان

$$a * b = a * c \text{ أو } a * b = c * a \Rightarrow b = c$$

يؤدى إلى أن $b = c$ لكل a, b, c فى النظام الرياضى . فمثلاً عملية الجمع والضرب على فئة الأعداد الحقيقية تحقق خاصية الحذف بينما عملية الضرب القياسى للمتجهات لا تحقق هذه الخاصية .

برنامج معلب canned program

برنامج أعد لحل مسألة معينة يوضع عادة فى صيغة محددة قابلة للتعديل الطفيف .

ارتباط مقنن (قويم)

canonical correlation

الارتباط المقنن بين فئتين متغيرات عشوائية

العوامل المشتركة أو عملية جمع كميتين لهما إشارتان مختلفتان ولكنها متساويتان عددياً . كذلك عملية التخلص من c عند إحلال المتطابقة $s + c = s + c$ بالتطابقة $s = s$ أو إحلال المتطابقة $s + c = s + c$ بالتطابقة $s = s$ (إذا كانت $c \neq 0$ صفراً) .

دائرة حذف cancellation circuit

دائرة تستخدم لحذف نبضات هدف غير متحرك ثابت السعة .

الحذف (فى التحليل العددي)

cancellation (in numerical analysis)

فقد أرقام ذات دلالة خاصة عند طرح عددين متساويين تقريباً ، مما ينشأ عنه عدم الدقة فى النتائج الحسابية ويمكن فى الغالب تجنب ذلك بإجراء العملية الحسابية بطريقة أخرى . فمثلاً ، المعادلة التربيعية $ax^2 + bx + c = 0$ صفراً لها جذران هما :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

فإذا كانت b^2 كبيرة بالنسبة للمقدار $4ac$ فإن حذف $4ac$ يؤثر بدرجة كبيرة على أحد

<p>cantiléver كابول دعامة (أو قضيب) مثبتة من أحد طرفيها .</p>	<p>هو الارتباط الأعظم بين دالتين كل منهما دالة خطية في هاتين الفئتين ، مع وضع قيود معينة على معاملات الدالتين الخطيتين .</p>
<p>Cantor set فئة " كانتور" فئة النقط المكونة من الفترة المغلقة [صفر ، ١] بإزالة الثلث الأوسط من الفترة ، ثم الثلث الأوسط من كل من الفترتين المتبقيتين ، وهكذا بدون حدود ، حيث الفترات المزالة فترات مفتوحة . وفئة " كانتور " فئة متقنة perfect وغير كثيفة non-dense وجميع نقطها نقط حدود frontier points ويطلق عليها أيضاً اسم لا متصلة " كانتور " Cantor discontinuum ، وفئة " كانتور " التلثية Cantor ternary set .</p>	<p>الصورة المقتنة للمصفوفة canonical form of a matrix الصورة التي يمكن أن تختزل إليها المصفوفة المربعة من فصل معين بنوع معين من التحويلات وهي الصورة التي يمكن اعتبارها الأبسط والأكثر ملاءمة . فمثلاً كل مصفوفة مربعة يمكن اختزالها بعمليات أولية أو بتحويلة مكافئة إلى الصورة المقتنة التي تكون فيها جميع عناصر المصفوفة أصفاراً عدا عناصر القطر الرئيسي . (انظر : normal matrix) .</p>
<p>القدرة على البناء (في الحاسب) capability architecture (in computer) = capability- based addressing القدرة على الربط بين العتاد (hardware) والبرامجيات (soft ware) في نظام الحاسب .</p>	<p>التمثيل القويم لمنحنى فراغى canonical representation of a space curve طريقة لتمثيل المنحنى في جوار لنقطة م بدلالة طول القوس من النقطة م كمتغير وسيط وباعتبار محاور ثلاثى السطوح المتحرك كمحاور للإحداثيات .</p>
<p>capability list قائمة القدرات قائمة بالعمليات المسموح بها في نظام ما .</p>	

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>capital, circulating رأس المال الدائر</p> <p>المبلغ الذى يدور متحولاً إلى صور أخرى أثناء عملية الإنتاج أو إدارة العمل ، مثل المبلغ الذى يستخدم لشراء المواد الخام اللازمة .</p>	<p>capacitor store خازنة المكثفات</p> <p>نوع من وحدات التخزين استخدمت فى الجيل الأول من الحاسبات ذات البطاقات المثقبة تمثل فيها كل بيت (BIT) بواسطة مكثف .</p>
<p>capital, fixed رأس المال الثابت</p> <p>المبلغ المستثمر على المدى الطويل ، مثل المبالغ المستغلة فى إقامة الأبنية وفى شراء المعدات المعمرة .</p>	<p>capacity سعة</p> <p>كمية الكهرباء اللازمة لرفع جهد موصل أو مكثف كهربائى بمقدار الوحدة .</p>
<p>capital stock رأس المال المسهم به</p> <p>المبلغ الذى تستثمره المؤسسة فى أعمالها دون أن يستهلك ، مثل المبالغ المستثمرة فى الصناعات وفى الأعمال التجارية . وقد تتعرض هذه المبالغ للخسارة ، ولكنها لا تستهلك فى الأعمال الروتينية .</p>	<p>سعة (فى الحاسب الآلى)</p> <p>capacity (in computer)</p> <p>كمية الحروف أو الأرقام التى يمكن أن تستوعبها وحدة تخزين أو تسجيل معينة مثل الذاكرة الرئيسية أو وحدة الأقراص المغنطة وغيرها . وتقاس السعة بإحدى الوحدات التالية :</p>
<p>التكلفة الرأس مالية الزائدة</p> <p>capitalized cost</p> <p>مجموع التكلفة الأولى للأصول والقيمة الحالية للإحلال التى تجرى دوماً عند نهايات فترات محددة .</p>	<p>١ - الحرف character</p> <p>٢ - الرقم digit</p> <p>٣ - الكلمة ثابتة الطول fixed length word</p> <p>٤ - البايت byte</p>

<p>تمثيل الحروف والأرقام على بطاقة مثقبة بواسطة عمل ثقب أو أكثر لكل عمود .</p>	<p>مقياس "كاراثيودوري" Caratheodory measure</p>
<p>وجه البطاقة card face الوجه المطبوع من بطاقة مثقبة ، أو الوجه الأكثر أهمية إذا كانت البطاقة مطبوعة على كلا الوجهين .</p>	<p>الدالة التي تعين عدداً غير سالب $\mu^*(S)$ لكل فئة جزئية من فئة S تسمى مقياس "كاراثيودوري" الخارجى Caratheodory outer measure إذا كان :</p> <p>١ - $\mu^*(S) \geq \mu^*(E)$ إذا كانت S فئة جزئية من E ،</p>
<p>مجال البطاقة card field مجموعة محددة من أعمدة البطاقة تستخدم لنسق معين من البيانات .</p>	<p>٢ - $\mu^*(U(S)) \geq \mu^*(S)$ لكل متتابعة من الفئات $\{S_n\}$</p> <p>٣ - $\mu^*(S \cup E) = \mu^*(S) + \mu^*(E)$ إذا كان البعد بين S ، E موجباً .</p>
<p>الترجمة الرقمية للبطاقة (فى الحاسب) card image (in computer) قراءة البطاقات المثقبة المستخدمة فى الحاسب ، وفيها يؤدي وجود الثقب إلى تخزين القيمة « واحد » فى الذاكرة بينما يؤدي عدم وجود الثقب إلى تخزين القيمة « صفر » .</p>	<p>بطاقة card إحدى وسائل تخزين المعلومات مثل البطاقات المثقبة punched cards والبطاقات المغناطيسية magnetic cards .</p> <p>مراجعة البطاقة card checking تحقق الحاسب من أن كل البيانات المسجلة على بطاقة مثقبة قد سجلت صحيحة فى الذاكرة .</p>
<p>حمل البطاقات card loader برنامج يسمح بتحميل مجموعة بطاقات</p>	<p>شفرة البطاقات card code</p>

<p>card reader قارئة بطاقات جهاز لتحويل المعلومات المشفرة على بطاقات إلى الشفرة الداخلية للحاسب .</p>	<p>وقراءتها في الذاكرة .</p>
<p>card reproducer وحدة نسخ البطاقات آلة لنسخ الثقوب الموجودة على بطاقة معينة وتثقيبها على بطاقة أخرى للحصول على صورة طبق الأصل من الأولى وتعتبر هذه الآلة من الآلات التقليدية التي تعمل منفصلة عن الحاسب الآلى ، وتستخدم فى التجهيز الأولى للبيانات .</p>	<p>card machine آلة بطاقات (١) أى نوع من الأجهزة الخارجية التى تقرأ أو تثقب البطاقات . (٢) أى حاسبة صغيرة تؤدى ، بناء على أمر نداء من بطاقات تعليمات ، عمليات خاصة متزامنة مع قراءة بطاقات البيانات .</p>
<p>card row صف البطاقة أى صف من مواضع الثقوب موازٍ للحافة الطويلة من البطاقة .</p>	<p>ثاقب بطاقات إضافي card punch buffer جهاز للتخزين المؤقت تنقل إليه نواتج الحاسب قبل تسجيلها لاستخدامها إذا تعطل ثاقب البطاقات .</p>
<p>card sorter مصنف البطاقات آلة تستخدم لترتيب البطاقات المثقبة فى متتابعة .</p>	<p>وحدة تثقيب البطاقات card punch unit آلة لتثقيب البطاقات فى المواضع المطلوبة ، لتخزين البيانات بها وإعادة استخدامها بقراءة الثقوب بواسطة الوحدة المناسبة فى الحاسب .</p>
<p>card system نظام بطاقات حاسب وحدة إدخاله الوحيدة قارئ</p>	

حل المعادلة التكعيبة باختزالها إلى الصورة :

$$x^3 + px + q = 0 \text{ ، صفرًا ،}$$

ثم استخدام التعويض $x = y + z$ ،

حيث y جذر تكعيبي للمقدار

$$y = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} \text{ ، } z = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

الجذور الثلاثة للمعادلة التكعيبة المختزلة هي .

$$x_1 = y + z \text{ ، } x_2 = \omega y + \omega^2 z \text{ ، } x_3 = \omega^2 y + \omega z$$

حيث ω جذر تكعيبي للواحد .

عدد كاردينالي **cardinal number**

عدد يدل على مرات التعدد في مجموعة من الأشياء أو على عدد الوحدات فيها وبغض النظر عن ترتيبها . ويقال لمجموعتين أن لهما نفس العدد الكاردينالي إذا وجد تناظر واحد لواحد بين عناصرهما .

المنحني القلبي (الكارديود) **cardioid**

المحل الهندسي في المستوى لنقطة ثابتة على دائرة معطاة تتدحرج على دائرة أخرى ثابتة لها نفس نصف القطر . إذا كان p نصف قطر الدائرة ، (r, θ) الإحداثيان

بطاقات ووحدتا إخراج مثنى وطابعة .

النسخ من بطاقة إلى بطاقة

card-to-card transceiving

نظام يُمكن من النسخ الفوري الدقيق للبطاقات المثقبة عبر شبكات التليفون والتلغراف .

التحويل من البطاقات إلى القرص

card-to-disk conversion

عملية مباشرة يتم فيها نقل البيانات من مجموعة من البطاقات إلى القرص باستخدام برنامج خاص .

مراجع بطاقات **card verifier**

جهاز كهروميكانيكي يستخدم للتحقق من أن البطاقة قد ثبتت كما هو مطلوب .

حل " كاردان " لمعادلة الدرجة الثالثة (المعادلة التكعيبة)

Cardan solution of the cubic equation

الإحداثيات الديكارتية (الكارتيزية)
في المستوى

Cartesian coordinates in the plane

يمكن تحديد موقع أى نقطة فى مستوى
ببعديها عن مستقيمين متقاطعين ، ويقاس
البعد عن أحد هذين المستقيمين على
امتداد خط مستقيم مواز للمستقيم الآخر .
ويقال للمستقيمين المتقاطعين محورا الإحداثيات
(محور السينات x-axis ، ومحور الصادات
y-axis) .

وإذا كانت الزاوية بين المحورين تساوى $\frac{\pi}{4}$


فيقال لهما محوران متعامدان (rectangular axes)
وإذا لم يكن المحوران متعامدين فيقال لهما محوران
مائلان (oblique axes) ، وتسمى الإحداثيات
فى الحالة الأولى إحداثيات متعامدة (rectangular
coordinates) وتسمى فى الحالة الثانية إحداثيات
مائلة (oblique coordinates) ويسمى الإحداثى
المقيس من محور الصادات موازياً لمحور السينات
الإحداثى السينى (abscissa) أو (x-coordinate)
ويسمى الإحداثى الآخر المقيس من محور
السينات موازياً لمحور الصادات الإحداثى
الصادى . (ordinate أو y-coordinate) وتنسب
هذه الإحداثيات إلى الرياضى والفيلسوف
الفرنسى "ديكارت" "Descartes"
(١٥٩٦ - ١٦٥٠) .

القطبان لنقطة فى المستوى حيث القطب
نقطة على الدائرة الثابتة والمحور القطبى قطر من
أقطارها ، فإن المعادلة القطبية للمنحنى القلبي

هى

$$r = (1 - \cos \theta)$$

(انظر الشكل)



الترحيل (فى الحساب)


carry (in arithmetic)

ترحيل الأرقام فى العمليات الحسابية
إلى المنزلة الأعلى (المنزلة التالية إلى
اليسار) .

المحاور الديكارتية Cartesian axes


(انظر : الإحداثيات الديكارتية
Cartesian coordinates)

مثنى محاور الإحداثيات "axes of coordinates" . ويرمز لها عادة بالرمز محور س (x-axis) ، محور ص (y-axis) ومحور ع (z-axis) . وتسمى نقطة تقاطع هذه المستقيمت الثلاث نقطة الأصل ، كما تسمى المحاور الثلاثة ثلاثي سطوح إحداثيات coordinate trihedral ، وتسمى المستويات الثلاثة مستويات الإسناد planes of reference أو مستويات الإحداثيات coordinate planes وتقسم الفراغ إلى ثمانية أقسام . ويمكن النظر عموماً لإحداثي نقطة في نظام إحداثي متعامد في الفراغ على أنه مسقط القطعة المستقيمة من نقطة الأصل للنقطة على المحور العمودي على المستوى الذي يقاس منه الإحداثي فمثلاً $s = u$ ، $v = w$ ، $e =$ وح إحداثيات النقطة م في الشكل (انظر الشكل) .



حاصل الضرب الديكارتي لزمريتين
Cartesian product of two groups

انظر الشكل :



الإحداثيات الديكارتية (الكارتيزية) في الفراغ

Cartesian coordinates in the space

إذا كانت س و ص ، ص و ع ، ع و س ثلاثة مستويات متقاطعة في نقطة و ، فإن الإحداثيات الديكارتية لأي نقطة في الفراغ تتحدد بأبعاد هذه النقطة عن كل من المستويات الثلاثة على أن يقاس كل بعد على امتداد خط مستقيم مواز لخط تقاطع المستويين الآخرين . وإذا كانت المستويات الثلاثة متعامدة مثنى مثنى ، فإن هذه الأبعاد تسمى الإحداثيات الديكارتية المتعامدة rectangular Cartesian coordinates للنقطة في الفراغ ، وتسمى المستقيمت الثلاث الناشئة عن تقاطع هذه المستويات الثلاثة مثنى

(س، بعد_١) ، (ص، بعد_٢) هو الفراغ
المقياسى (س × ص، بعد) حيث دالة البعد
معرفة كالتالى :

بعد_١ (س_١ ، ص_١) ، (س_٢ ، ص_٢)
= [بعد_١ (س_١ ، ص_١) + بعد_٢ (س_٢ ، ص_٢)]^١
طبفاً لهذا التعريف يكون حاصل الضرب
الديكارتى ح × ح حيث ح فراغ الأعداد
الحقيقية هو الفراغ الثنائى البعد المكون من كل
النقط (س ، ص) مع تعريف البعد كما فى
الهندسة المستوية .

حاصل الضرب الديكارتى لفراغين
اتجاهيين معياريين

Cartesian product of two normed spaces

إذا كان كل من س ، ص فراغاً اتجاهياً
معيارياً ، فإن س × ص يكون فراغاً اتجاهياً
معيارياً ، مع تعريف المعيار كالتالى :
 $\| (س، ص) \| = [\| س \| + \| ص \|]$ ^٢
وأحياناً نستخدم تعريفات أخرى ، مثل
 $\| (س، ص) \| = \| س \| + \| ص \|$.

حاصل الضرب الديكارتى للحقتين

Cartesian product of two rings

حاصل الضرب الديكارتى للحقتين

حاصل الضرب الديكارتى لزمرتين (س، *) ،
(ص، ٥) هو الزمرة (س × ص، ٥) التى
فئتها حاصل الضرب الديكارتى للفئتين س،
ص، وعمليتها الثنائية «٥» معرفة كالتالى :
(س_١ ، ص_١) ٥ (س_٢ ، ص_٢)
= (س_١ * س_٢ ، ص_١ ٥ ص_٢) .

حاصل الضرب الديكارتى لفراغى
«هلبرت»

Cartesian product of two Hilbert spaces

إذا كان س، ص فراغين من فراغات
«هلبرت» فإن س × ص يكون فراغ
«هلبرت» إذا عرف الضرب الداخلى فيه
كالتالى :

$\langle (س١، ص١) ، (س٢، ص٢) \rangle =$
 $\langle س١، ص١ \rangle + \langle س٢، ص٢ \rangle$
حيث (س_١ ، ص_١) ∈ س × ص ،
(س_٢ ، ص_٢) ∈ س × ص .

حاصل الضرب الديكارتى لفراغين
مقياسيين


**Cartesian product of two metric
spaces**

الضرب الديكارتى لفراغين مقياسيين

<p>$(S, S) = (S^1, S^1)$</p> <p>حاصل الضرب الديكارتي لزميرتين طوبولوجيتين</p> <p>Cartesian product of two topological groups</p> <p>حاصل الضرب الديكارتي لزميرتين طوبولوجيتين (س، ص)، (س، ص) هو الزمرة الطوبولوجية (س × ص، ص) حيث (س × ص، ص) حاصل الضرب الديكارتي للزميرتين (س، ص)، (ص، ص)، (س × ص، ص) حاصل الضرب الديكارتي للفراغين الطوبولوجيين (س، ص)، (ص، ص).</p>	<p>(س، ص، +، ٠)، (ص، ص، *، ٠) هو الحلاقة (س × ص، ص، □، *) التي فئتها حاصل الضرب الديكارتي للفئتين س، ص وعملياتها الثنائيتان □، × معرفتان كالتالي :</p> $(S_1, S_2) \square (S_1, S_2) = (S_1 + S_2, S_1 * S_2)$ $(S_1, S_2) \times (S_1, S_2) = (S_1 \times S_2, S_1 \cup S_2)$
<p>حاصل الضرب الديكارتي لفراغين طوبولوجيين</p> <p>Cartesian product of two topological spaces</p> <p>إذا كانت كل من س، ص فراغاً طوبولوجياً فإن س × ص يكون فراغاً طوبولوجياً مع تعريف الفئة الجزئية من س × ص على أنها مفتوحة إذا كانت هذه الفئة حاصل الضرب الديكارتي لفئتين مفتوحتين في</p>	<p>حاصل الضرب الديكارتي لفئتين</p> <p>Cartesian product of two sets</p> <p>الضرب الديكارتي لفئتين س، ص هو فئة جميع الأزواج المرتبة (س، ص) بحيث أن $S \ni S, S \ni V$ ويرمز لها بالرمز $S \times V$ أي أن $S \times V = \{(S, S), (S, V)\}$ $S \ni S, V \ni V$ إذا كانت أي عملية من عمليات الضرب، أو الجمع، أو الضرب في عدد قياسي معرفة على عناصر كل من الفئتين س، ص، فإن نفس العملية يمكن تعريفها على س × ص كما يلي :</p> $(S_1, S_2) + (S_1, S_2) = (S_1 + S_1, S_2 + S_2)$ $(S_1, S_2) \times (S_1, S_2) = (S_1 \times S_1, S_2 \times S_2)$

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>(س_٢ × ص_٢ ، □ ، ×) فوق الحقل و الذي تكون فئته حاصل الضرب الديكارتي للفئتين س_٢ ، ص_٢ ، والذي تعرف عملياته الثنائية □ كالتالي : (س_١ ، ص_١) □ (س_٢ ، ص_٢) = (س_١ * س_٢ ، ص_١ ∪ ص_٢) والذي تعرف فيه عملية الضرب × بعناصر من و كالتالي : $^2 (س ، ص) = (س^2 ، ص^2)$.</p>	<p>س_٢ ، ص_٢ على الترتيب ، أو اتحاد لفئات من مثل هذا النوع .</p> <p>حاصل الضرب الديكارتي لفراغين طوبولوجيين اتجاهيين</p> <p>Cartesian product of two topological vector spaces</p>
<p>الفراغ الديكارتي Cartesian space = الفراغ الإقليدي = Euclidean space (انظر : الفراغ الإقليدي Euclidean space) .</p>	<p>حاصل الضرب الديكارتي لفراغين طوبولوجيين اتجاهيين (س_٢ ، + ، ٠ ، -) ، (ص_٢ ، * ، ∅ ،) هو الفراغ الاتجاهي الطوبولوجي (س_٢ × ص_٢ ، □ ، × ، -) حيث (س_٢ × ص_٢ ، □ ، ×) حاصل الضرب الديكارتي للفراغين الاتجاهيين (س_٢ ، + ، ٠ ، -) ، (ص_٢ ، * ، ∅ ،) حاصل الضرب الديكارتي للزميتين الطوبولوجيتين (س_٢ ، + ، -) ، (ص_٢ ، * ، ∅ ،) .</p>
<p>الحمل المتسلسل cascaded carry عملية حمل يؤدي فيها جمع رقمين إلى رقم جمع ورقم حمل يجمعان معاً ، وتكرر هذه العملية حتى يتوقف تولد أرقام حمل جديدة .</p>	<p>حاصل الضرب الديكارتي لفراغين اتجاهيين</p>
<p>علبة (في الحاسب) case (in computer) مجموعة من البيانات تستخدم في برنامج معين .</p>	<p>Cartesian product of two vector spaces</p> <p>حاصل الضرب الديكارتي لفراغين اتجاهيين (س_٢ ، * ، ×) ، (ص_٢ ، ∅ ، ×) معرفين فوق نفس الحقل و هو الفراغ الاتجاهي</p>
<p>cash نقد</p>	



نقود من أى نوع . وهى عادة عملة معدنية أو ورقية ، وقد تتضمن شيكات أو حوالات ، أو كمبيالات أو أى أنواع أخرى من الأوراق التجارية التى يمكن تحويلها إلى عملة فوراً .

استبعاد التسعات casting out nines

طريقة تستخدم للتيقن من صحة ناتج الضرب (وأحياناً من صحة خارج القسمة وناتج الجمع أو الطرح) والأساس الرياضى لهذا المبدأ هو تطبيق العلاقة :

$$a \equiv b \pmod{9} \iff a - b \text{ مضروب (مقياس } s) \text{ ب (مقياس } s) \text{ هو } 9 \text{ .}$$

كتالوج catalogue

(١) فهرس مجموعات البيانات أو الملفات فى نظام ما .

(٢) الفهرس الرئيسى لمجموعات الفهارس .

طريقة فهرسة catalogued procedure

طريقة إضافة مجموعة بطاقات تحكم لنظام بيانات مفهرس طبقاً له .

القيمة الحالية لسنهية

cash equivalent of an annuity


(انظر : present value of an annuity) .

بيضوى "كاسينى" Cassini, oval of

المحل الهندسى للرأس ل مثلث ل م ن رأساه م ، ن ثابتان وحاصل ضرب طولى الضلعين ل م ، ل ن ثابت (يساوى ك^٢) . إذا كان طول الضلع الثابت م ن يساوى ٢ ٢ فإن المعادلة الديكارتية للمنحنى تكون على الصورة :

$$[(x+a)^2 + y^2 - c^2][(x-a)^2 + y^2 - c^2] = k^4$$

إذا كانت ك^٢ أصغر من ٢ ٢ فإن المنحنى يتكون من بيضويين مختلفين ، وإذا كانت ك^٢ أكبر من ٢ ٢ فإن المنحنى يتكون من بيضوى واحد ، وإذا كانت ك^٢ تساوى ٢ ٢ فإن المنحنى يسمى ذا العروتين lemniscate . والشكل يمثل الحالة له^٢ < ٢ ٢ .

<p>نظرية النسق لـ "بناخ"</p> <p>category theorem, Banach's</p> <p>(انظر : Banach's category theorem) .</p>	<p>نسق من الفئات category of sets</p> <p>يقال لفئة S أنها من النسق الأول</p> <p>first category في فئة S إذا أمكن تمثيلها</p> <p>كاتحاد قابيل للعد من فئات كل منها ليست</p> <p>كثيفة في أي مكان في S . وأي فئة ليست</p> <p>من النسق الأول تكون من النسق الثاني</p> <p>second category . يقال لفئة S أنها من</p>
<p>catena</p> <p>سلسلة</p> <p>مفردات من البيانات تظهر في قائمة</p> <p>مسلسلة .</p> <p>(انظر : قائمة مسلسلة chained list) .</p>	<p>النسق الأول عند نقطة s إذا وجد جوار s</p> <p>لنقطة s بحيث يكون تقاطع s مع S من</p> <p>النسق الأول . وتسمى مكملة فئة من النسق</p> <p>الأول في S فئة متبقية residual set من S</p> <p>(وأحياناً يسدس اسم فئة متبقية على مكملات</p>
<p>catenary</p> <p>منحنى الكتينة</p> <p>المنحنى المستوي الذي يتشكل عليه كبل</p> <p>منتظم عندما يعلق من طرفيه تعليقاً حراً ،</p> <p>ومعادلته بدلالة الإحداثيات الديكارتية المتعامدة</p> <p>هي :</p>	<p>فئات من النسق الأول في فئات S التي لها</p> <p>خاصية أن كل فئة مفتوحة غير خالية منها</p> <p>تكون من النسق الثاني) . وتكون الفئة</p> <p>الجزئية S من خط الأعداد من النسق</p> <p>الأول إذا ، وفقط إذا ، وجد تحويل من نوع</p> <p>واحد لواحد من خط الأعداد فوق نفسه</p> <p>بحيث تناظر S بهذا التحويل فئة مقياسها</p> <p>صفر .</p>
<p>$y = \frac{1}{2} (x^2 + a^2)$</p> <p>حيث a مقطوعته الصادية</p> <p>(انظر الشكل)</p>	<p>(انظر : فئة " بوريل " Borel set)</p>
	<p>نظرية النسق لـ "باير"</p> <p>category theorem, Baire's</p> <p>(انظر : Baire's category theorem) .</p>

وعندما تكون $1 = 0$ صفراً ، $1 = 0$ ، فإن توزيع كوشى يكون من نوع توزيع ت أحادى درجة الحرية .

نظرية " كوشى وهادامار "

Cauchy-Hadamard theorem

نصف قطر تقارب متسلسلة تايلور
 $1 + a_1x + a_2x^2 + \dots$ للمتغير المركب x هو:

$$r = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

معادلتا " كوشى وريمان " التفاضليتان الجزئيتان

Cauchy-Riemann partial differential equations

معادلتا " كوشى وريمان " للدالتين

$u = u(x, y)$ ، $v = v(x, y)$ هما

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad , \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

هاتان المعادلتان تميزان الدوال التحليلية

يسلسل
 يرتب مجموعة من المفردات فى قائمة
 متسلسلة .

مجسم منحنى الكتينة
 السطح الدورانى المولد بدوران منحنى
 الكتينة حول محوره .
 (انظر : منحنى الكتينة catenary) .

توزيع " كوشى "

Cauchy distribution

التوزيع الاحتمالى لمجتمع بدلالة دالة كثافة
 توزيع " كوشى "

frequency function of Cauchy distribution

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{b}{(x-a)^2 + b^2}$$

حيث a, b ثابتان ، $b > 0$.

وهو توزيع وحيد المنوال ، ومتماثل حول
 القيمة $x = a$ ، والتي تمثل كلاً من وسيط
 ومنوال التوزيع ، ولكن ليس الوسط حيث أن
 هذا التوزيع ليس له عزوم نهائية موجبة على
 الإطلاق . ويكون لأوساط العينات العشوائية
 لتوزيع " كوشى " نفس توزيع المجتمع .

شرط "كوشي" لتقارب متسلسلة
Cauchy's condition for convergence
of a series

تكون المتسلسلة تقاربية إذا ، فقط إذا ،
وجد لكل $\epsilon > 0$ صفر عدد طبيعي N يعتمد على
و بحيث أن

$| \sum_{k=n}^m a_k | < \epsilon$ لكل $n > N$ ولكل $m > n$ ،
حيث ترمز $\sum_{k=n}^m a_k$ لمجموع a_k حداً الأولى من
المتسلسلة .

صورة "كوشي" للباقي في نظرية
"تايلور"

Cauchy's form of the remainder for
Taylor's theorem

تنص نظرية "تايلور" على أنه إذا كانت
ص = د (س) دالة في متغير واحد فإن ،
د (س) = د (س) + د (س - س) + د (س - س) + ...

$$\dots + \frac{d^{(p-1)}(s)}{(p-1)!} + \frac{d^{(p)}(s)}{p!} (s-s_0)^p + \dots$$

حيث s_0 الباقي بعد s حد ، وصورة كوشي
لهذا الباقي هي :

ي + ت و في المتغير المركب ع = س + ت ص
وتحققان إذا ، فقط إذا ، كان الراسم حافظاً
للزوايا الموجهة فيما عدا النقط التي تنعدم عندها
جميع المشتقات الجزئية الأربع .

اختبار التكثف للتقارب لـ "كوشي"
Cauchy's condensation test for
convergence

إذا كان $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ متسلسلة مطردة الزيادة
حدودها موجبة وكان k أى عدد صحيح
موجب ، فإن المتسلسلتين

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{و} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_{n^k}$$

تكونان متساويتين معاً أو متباعدتين
معاً .

شرط "كوشي" لتقارب متتابعة
Cauchy's condition for convergence
of a sequence

تكون المتتابعة اللانهائية a_1, a_2, a_3, \dots
تقاربية إذا ، فقط
إذا ، وجد لكل $\epsilon > 0$ صفر عدد طبيعي N

بحيث أن $|a_m - a_n| < \epsilon$ لكل $m, n > N$ ولكل $\epsilon > 0$ صفر .

$$d^{(n)}(e) = \int_m^n \frac{f(x)}{(x-a)^{n+1}} dx$$

اختبار التكامل لـ "كوشي" لتقارب المتسلسلة اللانهائية

Cauchy's integral test for convergence of an infinite series

إذا كانت د (س) دالة موجبة ومطرودة النقصان في س لقيم س الأكبر من عدد موجب ، د (س) = $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ لجميع قيم س الكبيرة ، فإن الشرط الكافي واللازم لتقارب المتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ هو أن يوجد عدد ϵ بحيث يكون التكامل :

$$\int_m^{\infty} \frac{f(x)}{(x-a)^{n+1}} dx$$

تقاربياً .
فمثلاً في المتسلسلة الميمية

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{p-1} \quad , \quad d(s) = \frac{1}{s^p} = \frac{1}{s^p}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1} \quad \text{إذا كانت } p \neq 1$$

$$= \frac{1}{p-1} \quad \text{إذا كانت } p = 1$$

$$\frac{1}{s^p} = \frac{1}{s^p} \quad \text{صفرًا إذا كانت } p < 1$$

$$= \infty \quad \text{إذا كانت } p > 1$$

$$\frac{(1-0)^n}{1-n} = \frac{(1-0)^n}{1-n}$$

حيث 0 عدد يقع بين صفر وواحد ،
و = س - ٢ .

متباينة "كوشي" Cauchy's inequality المتباينة

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \right| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 \right)^{1/2}$$

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \right| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 \right)^{1/2}$$

صيغة كوشي التكاملية

Cauchy's integral formula

الصيغة

$$d^{(n)}(e) = \int_m^n \frac{f(x)}{(x-a)^{n+1}} dx$$

حيث د (ع) دالة تحليلية في المتغير المركب ع في مجال نهائي بسيط الترابط γ ، γ منحني بسيط مغلق يمكن تقويمه rectifiable في γ ، ع نقطة في المجال النهائي المحدود بالمنحنى γ .
ويمكن تعميم هذه الصيغة لأي عدد صحيح موجب n كالتالي :

نهي ∞ لو $\infty =$

وبالتالى فإن المتسلسلة الميمية تكون تقاربية عندما تكون $m < 1$ وتباعدية عندما تكون $m \geq 1$.

نظرية "كوشى" للتكامل

Cauchy's integral theorem

إذا كانت d (ع) دالة تحليلية في مجال γ نهائى وبسيط الترابط من المستوى المركب ، وكان γ منحنيًا مغلقًا يمكن تقويمه في γ فإن :

$$\int_{\gamma} d(ع) = 0 \text{ صفرًا .}$$

نظرية "كوشى" للقيمة المتوسطة

Cauchy's mean value theorem

= النظرية الثانية للقيمة المتوسطة.
= Second mean value theorem
= القانون المزدوج للقيمة المتوسطة
= double law of the mean value
= النظرية المعممة للقيمة المتوسطة
= generalized (or extended) mean value theorem

إذا كانت الدالتان $d(س)$ ، $r(س)$ متصلتين على الفترة المغلقة $[a, b]$ ولهما مشتقات من الرتبة الأولى على الفترة المفتوحة

(a, b) ، وإذا كان $r(ب) - r(أ) \neq 0$ صفرًا ، $d(س)$ ، $r(س)$ لا تنعدمان آنياً عند أى نقطة من نقط الفترة المفتوحة (a, b) ، فإنه توجد قيمة واحدة على الأقل ξ للمتغير $س$ بحيث أن

$$\frac{d(ب) - d(أ)}{r(ب) - r(أ)} = \frac{d(\xi) - d(أ)}{r(\xi) - r(أ)}$$

حيث $a < \xi < b$.

اختبار "كوشى" الجذرى للتقارب

Cauchy's radical test for convergence

إذا كانت نهاية الجذر النونى للحد النونى من متسلسلة حدودها موجبة أقل من عدد ما أقل من الواحد ، فإن المتسلسلة تكون تقاربية . وإذا كانت النهاية أكبر من أو تساوى الواحد ، فإن المتسلسلة تكون تباعدية . مثال ذلك فى المتسلسلة :

$$1 + س + ٢س^٢ + ٣س^٣ + \dots$$

الجذر النونى للحد النونى يساوى $\sqrt[n]{٣س}$ ، ونهي ∞ لو $\sqrt[n]{٣س} = 1$ ،

فلأى عدد $س$ أصغر عدديًا من ١ يمكن اختيار عدد n بحيث تكون $\sqrt[n]{٣س} < 1$ لكل $n > n$ وبالتالى فإن المتسلسلة تكون تقاربية عندما $|س| < 1$.

اختبار النسبة لـ "كوشي"

Cauchy's ratio test

= اختبار النسبة العادي

= The ordinary ratio test

واحد من العديد من اختبارات التقارب (أو التباعد) لمتسلسلة لا نهائية ويعتمد على النسبة بين حدين متعاقبين من المتسلسلة . وهو ينص على أن المتسلسلة تكون تقاربية أو تباعدية حسبما كانت القيمة المطلقة للنهائية عندما $n \rightarrow \infty$ للنسبة بين الحد النوني والحد السابق له أقل من أو أكبر من 1 . وإذا كانت القيمة المطلقة للنهائية تساوي 1 فإن الاختبار لا يصلح . فمثلاً في المتسلسلة

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

النسبة بين الحد النوني والحد السابق له هي

$$\frac{1}{n} \setminus \frac{1}{n-1} = \frac{1}{n} \setminus \frac{1}{n-1} = \frac{1}{n} \setminus \frac{1}{n-1}$$

$$\frac{1}{n} \setminus \frac{1}{n-1} = \frac{1}{n} \setminus \frac{1}{n-1} = \frac{1}{n} \setminus \frac{1}{n-1}$$

وبالتالي تكون المتسلسلة تقاربية .

أما في المتسلسلة التوافقية

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

فإن النسبة هي

$$= \left(\frac{1}{n} \right) \setminus \left(\frac{1}{n-1} \right)$$

$$1 = \frac{1-n}{n} \setminus \frac{1-n}{n-1} \rightarrow \infty$$

وبالتالي فإن هذا الاختبار يفشل (وفي الحقيقة هذه المتسلسلة تباعدية) .

متتابة "كوشي"

Cauchy's sequence

متتابة من النقط s_1, s_2, s_3, \dots بحيث يوجد لكل $\epsilon > 0$ صفر عدد N بحيث يكون البعد بين s_r, s_m أصغر من ϵ إذا كانت $r < N, m < N$.

وإذا كانت النقط من فراغ إقليدي ، فإن هذا يكفي أن تكون المتتابة تقاربية . وإذا كانت النقط أعداداً حقيقية (أو مركبة) ، فإن البعد بين (s_m, s_r) يساوي $|s_r - s_m|$ وتكون المتتابة تقاربية إذا ، فقط إذا ، كانت متتابة كوشي .

نظرية "كافالييري"

Cavalieri's theorem

نظرية تنص على أنه إذا كان لمجسمين نفس الارتفاع وكانت المقاطع المستوية الموازية

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>(انظر : altitude of a celestial point) .</p>	<p>لقاعدتيهما وعلى أبعاد متساوية منها متساوية فإن حجمي الجسمين يتساويان .</p>
<p>celestial sphere الكرة السماوية الكرة الافتراضية التي يبدو أن كل الأجرام السماوية تقع عليها .</p>	<p>celestial سماوى صفة لما يتعلق أو يرتبط بالسما .</p>
<p>قطبا الكرة السماوية celestial sphere, poles of the نقطتا تقاطع محور الأرض مع الكرة السماوية ، وتسميان القطب السماوى الشمالى north celestial pole</p>	<p>خط الاستواء السماوى celestial equator دائرة تقاطع مستوى الدائرة الأرضية العظمى المارة بالراصد مع الكرة السماوية .</p>
<p>والقطب السماوى الجنوبي south celestial pole</p>	<p>الأفق السماوى celestial horizon دائرة تقاطع مستوى أفق الراصد مع الكرة السماوية .</p>
<p>cell, magnetic خلية مغناطيسية وحدة تخزين ثنائية فى الذاكرة المغناطيسية للحاسب يمكن تخزين رقم ثنائى واحد (بيت) فيها .</p>	<p>celestial meridian خط الزوال السماوى الدائرة العظمى التى تمر بالراصد وسمته والقطب الشمالى السماوى .</p>
<p>census الإحصاء السكانى التعداد العام للسكان .</p>	<p>ارتفاع نقطة سماوية celestial point, altitude of a</p>

<p>زاوية مركزية في دائرة central angle in a circle زاوية رأسها مركز الدائرة .</p>	<p>النظام المئوي لقياس الزوايا centesimal system of measuring angles</p>
<p>القطاعات المركزية central conics القطاعات المخروطية التي لها مركز وهي القطع الناقص والقطع الزائد والدائرة .</p>	<p>نظام تقسم فيه الزاوية القائمة إلى مائة قسم متساوية كل قسم منها يسمى درجة ، وتقسم الدرجة إلى مائة قسم كل منها يسمى دويقة ، وتقسم الدويقة إلى مائة قسم كل منها يسمى ثانية ، وهكذا . ويندر استخدام هذا النظام في الوقت الحاضر .</p>
<p>معدل الوفيات المركزي central death rate معدل الوفيات المركزي هو النسبة بين عدد الموتى وعدد الأحياء في عام . إذا كان M المعدل المركزي للوفيات خلال العام S فإن $M = \frac{1}{\frac{1}{2}(C_S + C_{S+1})}$</p>	<p>الترمومتر المئوي centigrade thermometer ترمومتر زئبقى تدل درجة الصفر فيه على نقطة تجمد الماء ودرجة المائة على نقطة غليان الماء النقي عند الضغط الجوى القياسى .</p>
<p>حيث S عدد الوفيات خلال العام S ، C_S عدد الأحياء عند بداية العام ، C_{S+1} عدد الأحياء عند نهاية العام .</p>	<p>الستيجرام centigram جزء من مائة من الجرام .</p>
<p>قوة مركزية central force</p>	<p>السنتمتر centimeter جزء من مائة من المتر .</p>

بالنسبة لعمليتها . وهى زمرة جزئية لا متغيرة وقد تكون محتواة فعلياً فى زمرة جزئية لا متغيرة .

المستوى المركزى لمسطر على سطح مسطر
central plane of a ruling on a ruled surface

المستوى المركزى لمسطر ثابت ل على سطح مسطر s_r هو المستوى المماس للسطح s_r عند النقطة المركزية للخط ل .

وهذا المستوى يحوى الخط ل لأن كل مستوى مماس لسطح مسطر s_r عند أى نقطة لمسطر ل على s_r يحوى بالضرورة ل .

النقطة المركزية لمسطر على سطح مسطر
central point of a ruling on a ruled surface

النقطة المركزية لمسطر ثابت ل على سطح مسطر s_r هى الوضع النهائى لنقطة تقاطع العمود المشترك للخط ل ومسطر متغير s_r على s_r مع ل عندما ل \leftarrow ل .

الجهد المركزى
central potential
جهد قوة مركزية .

قوة تتجه دائماً نحو مركز ثابت .

نظرية النهاية المركزية (فى الإحصاء)
central limit theorem (in statistics)

النظرية التى تنص على أنه لأى صورة من صور توزيع ل من المتغيرات العشوائية المستقلة s_1, s_2, \dots, s_r وتخضع لبعض الشروط العامة للغاية يقترّب المجموع $s_r = \sum_{i=1}^r s_i$ من توزيع طبيعى عندما تزداد ل بدون حد . ومتوسط التوزيع الطبيعى هو $m = \mu_r$ وتباينه $\sigma^2 = \sigma_r^2$ ، حيث m, σ_r^2 متوسطات وتباينات المتغيرات العشوائية .

وإذا كان للمتغيرات العشوائية جميعها نفس دالة التوزيع ، فإن الشرط الكافى لصحة النظرية هو أن يكون التباين محدوداً ، وبالتالى يكون المتوسط الحسابى للمتغيرات موزعاً توزيعاً طبيعياً وتقريباً بمتوسط حسابى يساوى المتوسط المنتظم للتوزيعات وتباين يساوى $\frac{\sigma^2}{r}$.

مركزية زمرة
central of a group
مجموعه عناصر الزمرة التى يحقق كل عنصر منها خاصية الإبدال مع كل عنصر من عناصر الزمرة

فيلم فوتوغرافى هى إسقاط للشكل الذى يصور مع اعتبار أن العدسة نقطة . وتسمى النقطة مركز الإسقاط centre of projection وتسمى الخطوط المستقيمة (أو الأشعة) المسقطات projectors . وعندما يكون مركز الإسقاط نقطة فى اللانهاية (أى عندما تكون الأشعة متوازية) ، فإن الإسقاط يسمى إسقاطاً متوازياً (parallel projection) .

سطوح ثنائية مركزية central quadrics
سطوح ثنائية كل منها له مركز وهى السطوح الناقصية والسطوح الزائدية .

مقاييس النزعة المركزية (فى الإحصاء)
central tendency, measures of
(in statistics)
هى المتوسط الحسابى والوسيط والمنوال وأحياناً المتوسط الهندسى أيضاً .

مركز الدائرة centre of a circle
نقطة داخل الدائرة تساوى أطوال القطع المستقيمة الواصلة بينها وبين كل نقطة من نقاط الدائرة .

وحدة التشغيل المركزية


central processing unit (C. P. U)

الوحدة الرئيسية فى الحاسب وتتكون من ثلاثة أجزاء هى :

- ١ - الذاكرة الرئيسية main memory
- ٢ - وحدة الحساب arithmetic unit
- ٣ - وحدة التحكم أو الضبط control unit

إسقاط مركزى central projection

إسقاط لشكل هندسى (الشكل الذى يحوى النقط P ، B ، C ، S فى الشكل مثلاً)



على مستوى معطى يسمى مستوى الإسقاط (plane of projection) وتكون مساقط النقط على هذا المستوى (أى P ، B ، C ، S) هى تقاطعات جميع الخطوط المستقيمة المارة بنقطة ثابتة ليست على المستوى والنقط المختلفة للشكل الهندسى مع المستوى . مثال ذلك الصورة على

<p>centre of a sphere مركز الكرة</p> <p>نقطة تماثل الكرة وتقع في داخلها ويتساوى بعدها عن جميع نقط سطح الكرة وهى ملتقى أقطارها .</p> <p>centre of an ellipse مركز القطع الناقص</p> <p>نقطة تقاطع المحورين الأكبر والأصغر للقطع .</p>	<p>مركز منحنى = مركز التماثل</p> <p>centre of a curve = centre of symmetry</p> <p>النقطة (إذا وجدت) التى يكون المنحنى متماثلاً بالنسبة لها ، فمثلاً نقطة الأصل هى مركز المنحنى ص = س³ . ويرتبط الاصطلاح « مركز » عادة بالمنحنيات المغلقة كالدائرة والقطع الناقص . ويقال للمنحنيات غير المغلقة (كالقطع الزائد) المتماثلة بالنسبة لنقطة ما إنها منحنيات مركزية مركزها نقطة التماثل .</p>
<p>centre of any four spheres, radical المركز الأساسى لأية أربع كرات</p> <p>نقطة تقاطع المستويات الأساسية الستة للكرات الأربع مأخوذة مشنى مشنى . وتقع هذه النقطة فى اللانهاية إذا ، وفقط إذا ، وقعت مراكز الكرات الأربع فى مستوى واحد .</p>	<p>مركز سطح ثنائى</p> <p>centre of a quadric</p> <p>نقطة تماثل السطح الثنائى .</p> <p>مركز مضلع منتظم</p> <p>centre of a regular polygon</p> <p>مركز الدائرة المرسومة داخل المضلع أو المرسومة خارجه .</p>
<p>centre of any three circles, radical المركز الأساسى لأية ثلاث دوائر</p> <p>نقطة تقاطع المحاور الأساسية الثلاث للدوائر الثلاثة مأخوذة مشنى مشنى . وتقع هذه النقطة فى اللانهاية إذا ، وفقط إذا ،</p>	<p>مركز حزمة</p> <p>centre of a sheaf</p> <p>النقطة التى تمر بها جميع مستويات الحزمة .</p>

معجم الرياضيات

<p>بموجبه تكبير الجسم أو تصغيره بنسبة معينة تسمى معامل التمدد (coefficient of dilatation) .</p>	<p>وقعت مراكز الدوائر الثلاثة على استقامة واحدة .</p>
<p>مركز التقوس الجيوديسي centre of geodesic curvature</p> <p>مركز التقوس الجيوديسي لمنحنى γ على سطح S عند نقطة M من نقط γ هو مركز تقوس المنحنى γ بالنسبة إلى M حيث γ هو الإسقاط العمودي للمنحنى γ على المستوى المماس للسطح S عند M .</p>	<p>مركز الطفو centre of buoyancy = مركز الإزاحة = centre of displacement</p> <p>النقطة الافتراضية في الجسم الطافي التي تؤثر فيها محصلة قوى الطفو .</p>
<p>مركز الثقل centre of gravity = مركز الكتلة = centre of mass</p> <p>النقطة التي يعتبر أن وزن الجسم مؤثر عندها .</p>	<p>مركز تقوس لمنحنٍ مستوٍ عند نقطة centre of curvature of a plane curve at a point (انظر : تقوس curvature) .</p>
<p>مركز التعاكس بالنسبة لدائرة centre of inversion with respect to a circle</p> <p>مركز الدائرة التي يؤخذ التعاكس بالنسبة لها .</p>	<p>مركز تقوس منحنى فراغى عند نقطة centre of curvature of a space curve at a point</p> <p>مركز دائرة اللثام للمنحنى عند النقطة . (انظر : دائرة اللثام osculating circle) .</p>
<p>نظام إحداثيات مركز الكتلة centre of mass system</p>	<p>مركز التمدد centre of dilatation</p> <p>نقطة في الفراغ تؤخذ مركزاً لتناظر أحادي يتم</p>

الواصل بين مركز التعليق ومركز الثقل وعلى بعد من نقطة التعليق يساوى طول البندول البسيط المكافئ .

مركز النقر **centre of percussion**
نقطة على سطح الجسم المعلق إذا ما تعرض عندها الجسم لدفع فى اتجاه عمودى على خط تعليقه لا ينشأ عند نقطة تعليقه رد فعل دفعى .

مركز ضغط سطح مغمور فى سائل
centre of pressure of a surface submerged in a liquid
النقطة التى تؤثر عندها قوة الضغط المحصل على السطح المغمور .

مركز التشابه (أو المحاكاة) لشكلين
centre of similarity (or similitude) of two configurations
نقطة ثابتة إذا رسم منها أى مستقيم ليقطع شكلين متشابهين فى نقطتين فإن النسبة بين بعدى هاتين النقطتين عن النقطة الثابتة تكون ثابتة .

نظام إحداثيات نقطة الأصل فيه هى مركز الكتلة لمجموعة ميكانيكية .

مركز العزوم **centre of moments**
النقطة التى تؤخذ العزوم حولها .

مركز التقوس العمودى لسطح عند نقطة معلومة وفى اتجاه معين

centre of normal curvature of a surface for a given point and direction

مركز تقوس المقطع العمودى المار بالنقطة المعلومة فى الاتجاه المعين . وإذا كانت (س ، ص ، ع) إحداثيات النقطة م على السطح س، وكانت (ل ، م ، ن) جيوب تمام اتجاه العمودى على السطح س عند م ، وكان ر نصف قطر التقوس العمودى للسطح س عند م فى الاتجاه المعطى فإن إحداثيات مركز التقوس العمودى تكون
(س + ل ر ، ص + م ر ، ع + ن ر) .

مركز الذبذبة **centre of oscillation**
نقطة فى البندول المركب تقع على الخط

<p>القوة الطاردة المركزية</p> <p>centrifugal force</p> <p>القوة الافتراضية التى تساوى فى المقدار وتضاد فى الاتجاه قوة الجذب المركزى .</p>	<p>مركز التعليق centre of suspension</p> <p>نقطة تقاطع المحور الذى يتذبذب حوله جسم مع المستوى الرأسى المار بمركز كتلة هذا الجسم .</p>
<p>التسارع العمودى (العجلة العمودية)</p> <p>centripetal acceleration</p> <p>(انظر : acceleration, centripetal) .</p>	<p>مركز التماثل centre of symmetry</p> <p>نقطة م فى شكل هندسى بحيث يوجد لكل نقطة ٢ من نقط الشكل نقطة أخرى ب فى الشكل متماثلة مع ٢ بالنسبة للنقطة م .</p>
<p>قوة مركزية centripetal force</p> <p>قوة تؤثر على جسم يتحرك فى منحنى وتعمل فى الاتجاه نحو مركز ثابت .</p>	<p>مركز تماثل بلورة centre of symmetry of a crystal</p> <p>نقطة يقطع أى مستقيم يمر بها سطح البلورة فى نقطتين على بعدين متساويين من النقطة نفسها .</p>
<p>مركز الشكل</p> <p>centroid of a configuration</p> <p>النقطة التى إحداثياتها القيم المتوسطة لإحداثيات نقط الشكل .</p> <p>وللأشكال التى يمكن إجراء التكامل عليها تكون إحداثيات المركز \bar{x} ، \bar{y} ، \bar{z} هى :</p> $\bar{x} = \frac{\int x \, dV}{V}$	<p>مركزا التقوس الأساسى لسطح عند نقطة centres of principal curvature of a surface at a point</p> <p>مركزا التقوس العمودى عند النقطة فى الاتجاهين الأساسيين .</p>

$$\begin{aligned} & \binom{n+l}{n} \cdot C + \binom{n+l-1}{n-1} \cdot C + \dots + \binom{n+l-r}{n-r} \cdot C + \dots + \binom{n+l-1}{n-1} \cdot C + \binom{n+l}{n} \cdot C \\ & \binom{n+l}{n} \cdot C = \binom{n+l}{n} \cdot C \end{aligned}$$

($\frac{n}{r}$) هو معامل مفكوك ذى الحدين الرائى من رتبة n .

إذا كان للمتتابعة $\{C_n\}$ نهاية تكون المتسلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} C_n$ قابلة للجمع حـه أو (حـ، له) لهذه النهاية . وبدلالة حدود المتسلسلة الأصلية يكون :

$$\begin{aligned} & C_n \setminus \setminus L_n \\ & \frac{(1-n) \cdot n}{(n+l)(1-n+l)} + \frac{n}{n+l} + \dots + \frac{n}{(n+l)(1+l)} + \dots + \frac{n}{(n+l)(1+l)} \end{aligned}$$

وصيغة شيزارو للجمع منتظمة .

(انظر : جمع المتسلسلات المتباعدة
summation of divergent series)

نظرية "تشيفا" Cevas theorem

النظرية التى تنص على إنه إذا كانت م أى نقطة فى مستوى المثلث ا ب ح ، وكانت د ، هـ ، ونقط تقاطع المستقيمات \overleftrightarrow{AM} ، \overleftrightarrow{BN} ، \overleftrightarrow{CP} مع الأضلاع ب ح ، حـا ، ا ب ، \overleftrightarrow{BC} ، \overleftrightarrow{CA} ، \overleftrightarrow{AB} ،

$$\bar{C} = \frac{\sum C_n}{n}$$

$$\bar{C} = \frac{\sum C_n}{n}$$

حيث $\{C_n\}$ يرمز للتكامل على الشكل ، ح ترمز

لقياس (طول أو مساحة أو حجم) الشكل ، وينطبق مركز الشكل على مركز كتلة الشكل (إذا كان الشكل منتظم الكثافة) .

سنيية مؤكدة certain annuity
(انظر : سنيية مؤكدة annuity, certain)

الحدث المؤكد (فى الاحتمالات)
certain event (in probability)
حدث احتمال وقوعه يساوى الواحد الصحيح .

صيغة "شيزارو" للجمع
Cesaro's summation formula

طريقة تنسب مجموعاً لمتسلسلة تباعدية معينة . تستبدل متتابعة المجاميع الجزئية بالمتتابعة $\{C_n\} \setminus \setminus L_n$ ، حيث

أحد مفردات متتابعة أوامر إدخال /
إخراج ، مثل أكتب ، اقرأ ، ...

سلسلة تخفيضات chain discounts
= discount series

متتابعة من التخفيضات تتكون من تخفيض
للقيمة الاسمية ، وتخفيض للقيمة الاسمية
المخفضة ، وتخفيض لهذه الأخيرة ، وهكذا .
وقد تكون معدلات التخفيض المتتالية
متساوية أو غير متساوية . فمثلاً إذا خفضت
مائة جنيه بمعدل قدره ١٠٪ ، فإن رأس المال
الجديد يكون تسعين جنيهاً ، وإذا خفض رأس
المال هذا بمعدل ٥٪ ، فإن رأس المال الناتج
يكون خمسة وثمانين جنيهاً ونصفاً . وسلسلة
التخفيضات هي قيمتا التخفيض ، أي عشرة
جنيهاً وأربعة جنيهاً ونصف على الترتيب .

سلسلة إبسلون


chain, ε - (epsilon chain)

تتابع نهائي من النقط p_1, p_2, \dots, p_n
والبعد بين كل نقطتين متتاليتين منها أصغر
من عدد حقيقي موجب ϵ .

كل نقطتين من نقط أية فئة مترابطة يمكن
وصلهما بمثل هذه السلسلة لكل ϵ . الفئة

أو امتداداتها على الترتيب فإن

$$1 = \frac{p}{q} \times \frac{r}{s} \times \frac{t}{u}$$



وحدات س-ج-ث C. G. S. units
نظام لوحدات القياس أساسه الستيمتر
للطول والجرام للكتلة والثانية للزمن .

سلسلة chain
فئة مرتبة ترتيباً بسيطاً طبقاً لنسق معين .

سلسلة (في الحاسب)

chain (in computer)

متتابعة من الأرقام الثنائية تستخدم لتصميم
شفرة .

أمر مسلسل chain command

<p>وبصفة عامة ■</p> $\frac{ds}{ds} = \left(\frac{v}{u} \right) \frac{du}{ds} \cdot \frac{ds}{ds} = \frac{ds}{ds}$	<p>المكتنزة تكون مترابطة إذا أمكن توصيل كل عنصرين من عناصرها بمثل هذه السلسلة لكل ϵ.</p>
<p>قاعدة السلسلة للتفاضل الجزئي chain rule for partial differentiation</p> <p>إذا كانت د دالة في المتغيرات x_1, x_2, \dots, x_n ، وكل من هذه المتغيرات دالة في متغير أو أكثر من المتغيرات s_1, s_2, \dots, s_m ، فإن قاعدة السلسلة للتفاضل الجزئي تكون على الوجه الآتى :</p> $\frac{ds}{ds} = \frac{ds}{ds} \cdot \frac{ds}{ds} = \frac{ds}{ds}$ <p>..... ، ٢ ، ١ = م</p>	<p>سلسلة تبسيطات chain of simplexes</p> <p>إذا كانت و زمرة إبدالية عمليتها الجمع ، وكانت</p> <p>له١ ، له٢ ، ... له٣</p> <p>تبسيطات رائية البعد موجهة من مركب تبسيطى له ، فإن</p> <p>س = له١ + له٢ + ... له٣</p> <p>حيث ١ ، ٢ ، ... ، ٣ = م و تسمى سلسلة تبسيطات رائية البعد .</p>
<p>إذا كانت كل المتغيرات x_1, x_2, \dots, x_n دالة في متغير وحيد س ، فإن هذه الصيغة تصبح :</p> $\frac{ds}{ds} = \frac{ds}{ds} \cdot \frac{ds}{ds} = \frac{ds}{ds}$ <p>ونسمة هذه الصيغة التفاضل التام للدالة د بالنسبة إلى س . فمثلاً إذا كانت</p> <p>ع = د (س) ، ص = س = φ (س) ، ص = θ (س) ،</p>	<p>قاعدة السلسلة للتفاضل العادى chain rule for ordinary differentiation</p> <p>قاعدة التفاضل التى تنص على أنه إذا كانت د (ع) دالة فى ع ، ع دالة فى س فإن :</p> $\frac{ds}{ds} = \left(\frac{ds}{ds} \right) \frac{ds}{ds}$ $\left[\frac{ds}{ds} \right] \cdot \left[\frac{ds}{ds} \right]$

<p>character رمز</p> <p>أى شكل على لوحة مفاتيح الحاسب أو الآلة الكتابة مثل الأرقام من صفر إلى ٩ والحروف الهجائية من أ إلى ي والرموز الخاصة مثل + ، = ، % ، ...</p>	<p>فإن التفاضل التام للدالة د بالنسبة للمتغيرى يكون :</p> $\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial y}$
<p>character density كثافة الرموز</p> <p>عدد الرموز التى يمكن تخزينها بكل وحدة من وحدات التخزين . فمثلاً كثافة الرموز على الأشرطة المغنطة يمكن أن تكون ٢٠٠ أو ٥٥٦ أو ٨٠٠ أو ١٦٠٠ رمز للبوصة . وتتوقف كثافة الرموز على نوع وحدة التخزين المستخدمة .</p>	<p>سلسلة (جنزير) المساح</p> <p>chain, surveyor's</p> <p>سلسلة طولها ٦٦ قدماً تستخدم مقياساً للطول فى أعمال المسح ، وهى تحتوى على مائة وصلة طول كل منها ٧,٩٢ بوصة .</p>
<p>character reader قارئة الحروف</p> <p>وحدة خاصة فى الحاسب تتعرف على الحروف المطبوعة وتحولها إلى لغة الآلة .</p>	<p>قائمة مسلسلة</p> <p>chained list</p> <p>مفردات بيانات مرتبة فى متتابعة بحيث يشتمل كل مفرد منها على عنوان يعطى موقع المفرد التالى فى وحدة تخزين الحاسب .</p>
<p>character word كلمة حرفية</p> <p>كلمة تستخدم لتخزين عدد من الحروف التى يتكون كل منها من عدد معين من البتات ، ويتوقف عدد الحروف فى الكلمة الواحدة على عدد البتات التى تحتويها الكلمة .</p>	<p>قناة</p> <p>channel</p> <p>مسار تسجل البيانات عليه بطوله حرفاً حرفاً أو رقماً رقماً . فمثلاً فى حالة الأشرطة المغنطة يتم التسجيل عادة على سبع قنوات متوازية ممتدة بطول الشريط وتسجل عليها البتات (bits) التى تحمل البيانات .</p>

<p> $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \text{سر}$ </p> <p>هي</p> <p> $\text{صفرًا} = \begin{vmatrix} 1- & 2- \lambda \\ 3- \lambda & 2- \end{vmatrix}$ </p> <p> $\text{أي } \lambda^2 - 5\lambda + 4 = \text{صفرًا}$ </p> <p>وتنص نظرية "هاملتون كايلى" على أن كل مصفوفة تحقق معادلتها المميزة ، أى أنه بالنسبة للمصفوفة سر المعطاة أعلاه يكون :</p> <p> $\text{سر}^2 - 5\text{سر} + 4 = \text{صفرًا} .$ </p> <p> مميز "أويلر وبوانكاريه" characteristic, : Euler-Poincaré اسم آخر لمميز "أويلر" (انظر : مميز أويلر Euler characteristic) . </p> <p> الدالة المميزة (فى الإحصاء) characteristic function (in statistics) إذا كانت د (س) دالة تكرار متغير عشوائى س فإن دالته المميزة هي : </p> <p> $\varphi(y) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{iys} dF(s)$ </p> <p>حيث ي عدد حقيقى</p>	<p> المنحنيات المميزة (الذاتية) لسطح characteristic curves of a surface مجموعة المنحنيات المترافقة على سطح سر التى يكون اتجاهها المماسين لمنحنيين منها مارين بنقطة م من نقط سر هما الاتجاهان المميزان للسطح سر عند م . </p> <p> الاتجاهان المميزان (الذاتيان) على سطح characteristic directions on a surface الاتجاهان المترافقان على سطح سر عند نقطة م من نقطه والمتماثلان بالنسبة لاتجاهات خطوط التقوس على سر عند م . والاتجاهان المميزان لسطح سر عند نقطة ما يكونان وحيدين إلا عند النقطة السُرّية . وهذان الاتجاهان يجعلان الزاوية بين الاتجاهين المترافقين للسطح عند النقطة أصغر ما يمكن . </p> <p> المعادلة المميزة (الذاتية) لمصفوفة characteristic equation of a matrix المعادلة المميزة لمصفوفة مربعة سر من درجة ن هي </p> <p> $\lambda I_n - \text{سر} = \text{صفرًا}$ </p> <p>حيث I ن مصفوفة الوحدة من نفس الدرجة ن ،</p> <p> $\lambda I_n - \text{سر}$ محدد المصفوفة (I ن - سر) . فمثلاً المعادلة المميزة للمصفوفة : </p>
---	---

(انظر : القيم والدوال الذاتية
eigenvalues and eigenfunctions)

مميز "أويلر" لمنحنى

characteristic of a curve, Euler

عند تقسيم منحنى ما إلى قطع بحيث تكون كل قطعة مع نقطتي نهايتها مكافئة طوبولوجياً لقطعة مستقيمة مغلقة فإن الفرق بين عدد رؤوس (نقط) المنحنى وعدد القطع يسمى مميز "أويلر" للمنحنى .

مميز "سيجر" لمصفوفة

characteristic of a matrix, Segre

(انظر : الصورة المقتنة لمصفوفة
canonical form of a matrix)

مميز عائلة من السطوح ذات البارامتر الواحد

characteristic of a one parameter

family of surfaces

الوضع النهائي لمنحنى تقاطع سطحين متجاورين من سطوح العائلة عندما يقتربان من الانطباق ، أى عندما تقترب قيمتا البارامتر

الدالة المميزة (الذاتية) لمصفوفة

characteristic function of a matrix

الدالة المميزة لمصفوفة مربعة S_n من درجة

n هي

$$|\lambda I_n - S_n|$$

حيث I_n مصفوفة الوحدة من نفس درجة S_n ،

$$|\lambda I_n - S_n| \text{ محدد المصفوفة } (\lambda I_n - S_n).$$

الدالة المميزة لفئة

characteristic function of a set

هي الدالة :

$$d(s) = \begin{cases} 1 & \text{لكل } s \text{ في الفئة} \\ 0 & \text{صفرًا إذا كانت } s \text{ لا تنتمي للفئة.} \end{cases}$$

العدد المميز (الذاتى) لمصفوفة

characteristic number of a matrix

(انظر : الجذر المميز (الذاتى) لمصفوفة
characteristic root of a matrix)

الأعداد والدوال المميزة للمعادلات التكاملية

characteristic numbers and functions

for integral equations

مكافئاً طوبولوجياً لأسطوانة أو لسطح كعكى أولشريط "موبيسى" أو لقنينة "كلاين".

مميز "أويلر" لمركب تبسيطات نونى البعد
characteristic of an n-dimensional
simplicial complex, Euler

العدد

$$\chi = \sum_{i=0}^n (-1)^i f_i$$

حيث f_i عدد التبسيطات الراهية البعد في
مركب التبسيطات النونى البعد .

العدد المميز للوغاريتم عدد

characteristic of the logarithm of a
number

(انظر : لوغاريتم logarithm) .

جذر مميز (ذاتى) لمصفوفة

characteristic root of a matrix
(eigenvalue)

جذر للمعادلة المميزة للمصفوفة ، ويطلق
عليه أيضاً قيمة ذاتية للمصفوفة .

اللتان تعيينان السطحين من قيمة معينة واحدة .
ومعادلتا منحنى مميز معين هما معادلة العائلة
والمعادلة الناتجة بأخذ التفاضل الجزئى لمعادلة
العائلة بالنسبة للبارامتر مع إعطاء البارامتر قيمة
محددة . المحل الهندسى للمنحنيات المميزة
عندما يتغير البارامتر هو مغلف عائلة السطوح .
فمثلاً إذا كانت عائلة السطوح هى الكرات
التي لها نفس نصف القطر وتقع مراكزها على
خط مستقيم واحد فإن المنحنيات المميزة تكون
دوائر تقع مراكزها على هذا الخط المستقيم
ويكون السطح المغلف هو الأسطوانة المولدة بهذه
الدوائر .

مميز "أويلر" لسطح

characteristic of a surface, Euler

إذا قسم سطح إلى أوجه بواسطة رؤوس
(نقط) وحواف بحيث يكون كل وجه مكافئاً
طوبولوجياً لمضلع مستوي ، فإن عدد رؤوس
السطح مطروحاً منه عدد حوافه ومضافاً إليه عدد
أوجهه يسمى مميز "أويلر" للسطح .

ومميز "أويلر" للسطح يساوى ٢ إذا ، وفقط
إذا ، كان السطح مكافئاً طوبولوجياً لكرة ،
ويساوى ١ إذا ، وفقط إذا ، كان السطح مكافئاً
طوبولوجياً للمستوى الإسقاطى أو لقرص ،
ويساوى صفراً إذا ، وفقط إذا ، كان السطح

شحنة كهربائية مركزة عند نقطة .	الصفة المميزة لفئة
الكثافة السطحية للشحنة	characterizing property of a set
charge, surface density of	تعرف الفئة إما بحصر عناصرها وإما بالصفة المميزة لهذه العناصر . وهذه الصفة تحدد ما إذا كان عنصر ما ينتمى للفئة أم لا . فمثلاً :
الشحنة الكهربائية لكل وحدة مساحة من السطح المشحون .	س = { س : س بلد عربى }
	معرفة بالصفة المميزة التى تمكنا من القول أن اليابان مثلاً لا ينتمى للفئة س .
قيمة الخصم (فى التأمين)	شحنة
charge, surrender (in insurance)	كمية من الكهرباء .
مقدار الخصم من القيمة النهائية للتأمين ، وتعين به القيمة المستحقة .	
(انظر : surrender value) .	الوحدة الكهرستاتيكية للشحنة
الكثافة الحجمية للشحنة	charge, electrostatic unit of
charge, volume density of	مقدار الشحنة الكهربائية التى إذا وضعت على بعد سنتيمتر واحد من شحنة مساوية لها فإنها تؤثر عليها بقوة مقدارها دايين واحد . وبالتالي إذا قيست القوة ، المسافة ، الشحنة بوحدات الداين ، السنتيمتر ، الوحدة الكهرستاتيكية على الترتيب فإن الثابت ك فى قانون كولوم للشحنات النقطية يساوى الواحد .
قانون " كولوم " للشحنات النقطية	شحنة نقطية
charges, Coulomb's law for point	charge, point
(انظر : Coulomb's law for point charges) .	

<p>خريطة السريان المنطقى chart, logical flow</p> <p>حل مفصل لمشكلة أو لعملية معينة باستخدام علم المنطق وأساليبه .</p>	<p>مجموعة شحنات نقطية charges, set (or complex) of point</p> <p>مجموعة شحنات موجودة عند نقط محددة في الفراغ .</p>
<p>اختبار - تحقق check</p> <p>مصطلح عام يعنى إجراء اختبار للتأكد من عدم وجود نوع من الأخطاء أو عدم وجود مستوى معين من الأخطاء أو للتأكد من صحة تنفيذ عمليات معينة .</p>	<p>اختبار " شارلييه " Charlier check</p> <p>اختبار لدقة الحسابات يتضمن قوى القيم الملاحظة ، ويعتمد على علاقة من النوع التالى :</p> $\frac{u}{1=r} \text{ لـ } s_r = (1+r) \frac{u}{1=r} \text{ لـ } s_{r+1}$ $+ 2 \frac{u}{1=r} \text{ لـ } s_r + \frac{u}{1=r} \text{ لـ } s_{r+1}$
<p>شيك check (cheque)</p> <p>أمر صادر إلى مصرف من شخص له حساب فيه ، يكلفه عند التقدم به بدفع مبلغ من النقود لشخص معين ، أو لأمر شخص معين ، أو لحامله .</p>	<p>حيث لـ تكرار القيمة الملاحظة s_r . ويمكن استخدام هذا الاختبار لقوى أعلى من الدرجة الثانية باستخدام مفكوكات مناسبة .</p>
<p>ضبط آلى check, automatic</p> <p>طريقة لاكتشاف الأخطاء تكون جزءاً متمماً للعمل العادى للألة .</p> <p>فمثلاً عند إجراء عملية الضرب بالحاسب ، إذا كان عدد أرقام حاصل الضرب كبيراً لا تستوعبه سعة الحاسب تظهر إشارة على</p>	<p>خريطة سير العمليات chart, flow</p> <p>تمثيل للخطوات الرئيسية لسير عمليات معينة . وكيفية تتابع هذه العمليات عند تنفيذها ، ويتم تمثيل هذه الخطوات باستخدام أشكال وخطوط هندسية ورموز متفق عليها تمثل عادة المستندات والوحدات الآلية المستخدمة ونوع العمليات وطريقة اختيارها وما إلى ذلك .</p>

<p>check parity اختبار النِّدْيَة</p> <p>اختبار يستخدم للتأكد من تطابق الأرقام الثنائية قبل التخزين أو التسجيل أو القراءة وبعدها .</p>	<p>صورة فيضان over flow تدل على وجود خطأ .</p> <p>ميكانيكية ضبط الأخطاء</p>
<p>check point نقطة اختبار</p> <p>١ - مكان في برنامج الحاسب يتم عنده اختبار أو أكثر على صحة النتائج .</p> <p>٢ - مكان في البرنامج تسجل عنده حالة الحاسب في خازنة مساعدة ويمكن عنده إعادة البرنامج للحاسب وتشغيله .</p>	<p>check, built-in</p> <p>جزء يزود به الحاسب يعمل عند ظهور الأخطاء ولا يحتاج إلى برامج خاصة ولا يتدخل في عمل الحاسب .</p> <p>check number رقم الاختبار</p> <p>رقم يوضع عند موضع أو أكثر من مواضع البيانات ويستخدم لاختبار الأخطاء التي تحدث عند تنفيذ عمليات تحويل هذه البيانات .</p>
<p>check problem مسألة اختبار</p> <p>مسألة قياسية standard problem تنفذ على الحاسب للتأكد من أنه يعمل بطريقة عملية . ويعتبر برنامج تنفيذ هذه المسألة من البرامج الجاهزة التي تعد لهذا الغرض .</p>	<p>اختبار لصحة حل معادلة</p> <p>check on a solution of an equation</p> <p>أى طريقة تستخدم لزيادة احتمال صحة الحل ، وإحدى هذه الطرق هى التعويض المباشر بالجذر المحسوب فى المعادلة الأصلية .</p> <p>وإذا كان الجذر صحيحاً ، فإن نتيجة هذا التعويض لابد أن تكون متطابقة تأخذ الصورة صفر = صفر بعد نقل جميع الحدود إلى نفس الجانب واختزالها .</p>
<p>check transfer اختبار التحويل</p> <p>اختبار للتأكد من صحة تحويل البيانات من مكان إلى آخر .</p>	

مستقلة موزعة توزيعاً طبيعياً بمتوسطات μ_r وتباينات σ_r^2 يكون

$$\chi^2 = \sum_{r=1}^m \frac{(\sum_{i=1}^n (y_i - \mu_r)^2)}{\sigma_r^2}$$

بدرجات حرية $\sum_{r=1}^m (n_r - 1)$ إذا علمت μ_r ، σ_r^2 .

اختبار كاي تربيع chi-square test
اختبار توافق التكرارات المشاهدة مع التكرارات المتوقعة ، ويبنى على المقدار

$$\chi^2 = \sum_{r=1}^m \frac{(n_r - \mu_r)^2}{\mu_r}$$

حيث n_r عدد التكرارات ، μ_r ، σ_r^2 الزوج الرائي للتكرارات الملاحظة والمتوقعة على الترتيب ، $\mu_r = \sum_{i=1}^n y_i$ ، $\sigma_r^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2$. إذا كانت n كبيرة بدرجة كافية فإن دالة التكرار χ^2 تكون تقريباً هي دالة تكرار دالة χ^2 بأخذ $n + 1 = \text{له}$

مسلمة الاختيار choice, axiom of
مسلمة تنص على أنه إذا كانت K تجمعاً من الفئات غير الخالية المتباعدة ، فإنه توجد فئة S بحيث تحوى الفئة $S \cap V$

كاي تربيع (χ^2)

chi-square (χ^2)

مجموع مربعات متغيرات عشوائية مستقلة μ_r ، حيث $r = 1, 2, \dots, k$ ، كل منها موزع توزيعاً طبيعياً بمتوسط هو الصفر وتباين هو الواحد . أى أن :

$$\chi^2 = \sum_{r=1}^k \frac{y_r^2}{\sigma_r^2}$$

دالة تكرار توزيع هذه الدالة هي :

$$D(\chi^2) = \frac{(2\chi^2)^{n/2} e^{-\chi^2/2}}{(2\pi)^{n/2}}$$

حيث n عدد المتغيرات الطبيعية وتسمى درجات الحرية لكاي تربيع . وقد اكتشفت بواسطة " هلمت " Helmet سنة ١٨٧٦ . عندما تكون $n < 30$ فإن توزيع $\sqrt{2\chi^2}$ يكون تقريباً توزيعاً طبيعياً بمتوسط قدره $\sqrt{2n}$ وتباين قدره ١ . إذا كانت χ^2 ، μ_r ، σ_r^2 ، $1, 2, \dots, k$ ، مستقلة التوزيع بدرجات حرية μ_r ، σ_r^2 ، $1, 2, \dots, k$

فإن $\sum_{r=1}^k \frac{y_r^2}{\sigma_r^2}$ توزيع مثل χ^2

بدرجات حرية $\sum_{r=1}^k (n_r - 1)$. ولتغيرات عشوائية

نقطة واحدة فقط لكل فئة ص $\exists K$.

مسلمة الاختيار المحدود.

choice, finite axiom of

مسلمة الاختيار للحالة الخاصة التي يكون فيها تجمع الفئات محدوداً .

chord

وتر


الوتر لمنحنى (أو لسطح) هو القطعة المستقيمة الواصلة بين نقطتين من نقط المنحنى (أو السطح) .



chord of a circle

وتر دائرة

القطعة المستقيمة المقطوعة بمحيط الدائرة لقاطع لها .



وتر بؤرى لقطع مخروطي


chord of a conic, focal

أى وتر للقطع المخروطي يمر ببؤرة له .

chord of a sphere

وتر كرة


القطعة المستقيمة المقطوعة بسطح الكرة لقاطع لها .



وتر التماس لنقطة خارج دائرة

chord of contact of a point outside of a circle

الوتر الواصل بين نقطتي تماس المماسين المرسومين للدائرة من نقطة خارجها .



<p style="text-align: center;"> $\frac{\{\tilde{\alpha}\sigma\}}{\beta\sigma} - \frac{\{\beta\alpha\sigma\}}{\beta\sigma}$ </p> <p> $\{\beta\sigma\}\{\alpha\sigma\} - \{\alpha\sigma\}\{\beta\sigma\} +$ </p> <p>حيث استخدم اصطلاح الجمع الدليلي ، $\{L\}$ معاملات كريستوفل من النوع الثانى لفراغ ريمان نونى البعد صيغته التفاضلية الأساسية الأولى $\gamma_{\alpha\beta}^{\sigma}$ $\gamma_{\alpha\beta}^{\sigma}$ $\gamma_{\alpha\beta}^{\sigma}$. وممتد تقوس ريمان و كريستوفل مجال ممتدى من الرتبة الأولى للدليل العلوى ومن الرتبة الثالثة للأدلة السفلية وبالتالي فهو من الرتبة الرابعة .</p> <p style="text-align: center;">رموز " كريستوفل "</p> <p>Christoffel symbols</p> <p>معاملات معينة تمثل دوال خاصة والمشتقات الأولى لها . وهذه الدوال الخاصة هى معاملات الصيغة التربيعية التفاضلية التى تمثل الصيغة الأساسية التربيعية التفاضلية الأولى للفراغ الهندسى . فمثلاً إذا كانت</p> <p style="text-align: center;"> $\gamma_{\alpha\beta}^{\sigma} = \gamma_{\beta\alpha}^{\sigma} + \gamma_{\alpha\gamma}^{\sigma} \gamma_{\beta\delta}^{\sigma} + \gamma_{\alpha\delta}^{\sigma} \gamma_{\beta\gamma}^{\sigma}$ </p> <p>هى الصيغة التربيعية التفاضلية لسطح فإن رموز كريستوفل من النوع الأول هى :</p>	<p style="text-align: center;">وتران ملحقان فى دائرة</p> <p>chords in a circle, supplemental</p> <p>الوتران الواصلان من نقطة على محيط الدائرة إلى نهايتى قطر فيها .</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p>ممتد تقوس " ريمان و كريستوفل " سفلى الأدلة</p> <p>Christoffel curvature tensor, covariant Riemann</p> <p>المجال الممتدى السفلى الأدلة من الرتبة الرابعة</p> <p style="text-align: center;"> $\gamma_{\beta\alpha}^{\sigma} (\sigma^1, \sigma^2, \dots, \sigma^n)$ </p> <p style="text-align: center;"> $= \gamma_{\beta\alpha}^{\sigma} (\sigma^1, \sigma^2, \dots, \sigma^n)$ </p> <p style="text-align: center;">(انظر : ممتد تقوس " ريمان - كريستوفل ") Christoffel curvature tensor, Riemann</p> <p style="text-align: center;">ممتد تقوس " ريمان و كريستوفل "</p> <p>Christoffel curvature tensor, Riemann</p> <p>المجال الممتدى</p> <p style="text-align: center;"> $\gamma_{\beta\alpha}^{\sigma} (\sigma^1, \sigma^2, \dots, \sigma^n)$ </p>
---	--

وجميع رموز كريستوفل الإقليدية بالنسبة لهذه الإحداثيات تساوى الصفر . ولكن رموز كريستوفل الإقليدية لا تكون كلها أصفاراً بالنسبة للإحداثيات المعممة وتعطى بالعلاقة :

$$\left\{ \begin{matrix} \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \\ \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \end{matrix} \right\} = \frac{\partial^2 x^{\lambda}}{\partial x^{\mu} \partial x^{\nu}}$$

حيث $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ ، $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ ، $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ ، ... ، $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ الإحداثيات المعممة معطاة بدلالة دوال التحويل $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} = \frac{\partial x^{\lambda}}{\partial x^{\mu} \partial x^{\nu}}$ ($\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ ، ... ، $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$)

- ١ - الصفر cipher (or cypher)
الرمز الدال على العدد (صفر) ووضعت له العلامة «O» .
- ٢ - الحساب بالأرقام
إجراء العمليات الحسابية الأساسية باستخدام الأرقام .

الدائرة circle
المحل الهندسى لنقطة تتحرك فى المستوى بحيث يكون بعدها عن نقطة ثابتة فى المستوى (مركز الدائرة center of the circle)
يساوى مقداراً ثابتاً (طول نصف قطر الدائرة radius of the circle) . وهى أيضاً فئة نقط المستوى التى تقع على بعد ثابت (طول نصف

$$\left[\begin{matrix} \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \\ \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \end{matrix} \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 x^{\lambda}}{\partial x^{\mu} \partial x^{\nu}} + \frac{\partial^2 x^{\lambda}}{\partial x^{\nu} \partial x^{\mu}} - \frac{\partial^2 x^{\lambda}}{\partial x^{\mu} \partial x^{\nu}} \right)$$

وللصيغة التربيعية فى $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ من المتغيرات فإن $\left[\begin{matrix} \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \\ \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \end{matrix} \right]$ تعرف بنفس الصيغة ولكن تأخذ $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ ، $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ ، $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ من ١ إلى $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$. ويرمز لرموز كريستوفل من النوع الأول أيضاً $\left[\begin{matrix} \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \\ \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \end{matrix} \right]$ ، أو الرمز $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ وهذه الرموز متماثلة بالنسبة إلى $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ ، $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$. ورموز كريستوفل من النوع الثانى للصيغة التربيعية التفاضلية

$$\left[\begin{matrix} \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \\ \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \end{matrix} \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 x^{\lambda}}{\partial x^{\mu} \partial x^{\nu}} + \frac{\partial^2 x^{\lambda}}{\partial x^{\nu} \partial x^{\mu}} - \frac{\partial^2 x^{\lambda}}{\partial x^{\mu} \partial x^{\nu}} \right)$$

رموز كريستوفل الإقليدية
Christoffel symbols, Euclidean

رموز كريستوفل الإقليدية هى :
رموز كريستوفل للفراغ الإقليدى حيث محاور الإحداثيات الديكارتية $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ ، $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ ، ... ، $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ متعامدة وعنصر طول القوس

$$\left[\begin{matrix} \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \\ \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} \end{matrix} \right] = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 x^{\lambda}}{\partial x^{\mu} \partial x^{\nu}} + \frac{\partial^2 x^{\lambda}}{\partial x^{\nu} \partial x^{\mu}} - \frac{\partial^2 x^{\lambda}}{\partial x^{\mu} \partial x^{\nu}} \right)$$

<p>قطر الدائرة circle, diameter of a</p> <p>القطعة المستقيمة المقطوعة بالدائرة من أى خط مستقيم مار بمركزها . ويطلق المصطلح أيضاً على طول هذه القطعة المستقيمة .</p>	<p>القطر (من نقطة ثابتة (المركز) فى المستوى .</p> <p>قوس الدائرة circle, arc of a</p> <p>أى جزء من الدائرة مكون من نقطتين من نقطتها وجميع نقط الدائرة الواقعة بينهما .</p>
<p>دائرة عظمى circle, great</p> <p>مقطع كرة بمستوى يمر بمركزها . وقطر هذه الدائرة يساوى قطر الكرة .</p>	 <p>م : مركز الدائرة</p> <p>مـ : نصف قطر الدائرة</p> <p>اـ : قوس الدائرة</p> <p>اـ : وتر فى الدائرة</p> <p>حـ : قطر فى الدائرة</p>
<p>دائرة تخيلية circle, imaginary</p> <p>اسم لفئة النقط التى تحقق المعادلة :</p> $(س - ك)^2 + (ص - ل)^2 = ح^2$ <p>حيث ك ، ل ، ح أعداد حقيقية ، $ح \neq 0$ صفراً</p> <p>وكل من الإحداثيين س ، ص لأية نقطة من نقطتها لا يمكن أن يكون عدداً حقيقياً .</p>	<p>مساحة الدائرة circle, area of a</p> <p>مساحة جزء المستوى المكون من جميع النقط الداخلية للدائرة وتساوى ط² نهر² ، حيث ن ط² نصف قطر الدائرة ، ط النسبة بين طول محيط الدائرة وقطرها .</p>
<p>معادلتا الدائرة فى الفراغ</p> <p>circle in space, equations of a</p> <p>معادلتا سطحين منحني تقاطعهما الدائرة ، مثال ذلك معادلتا كرة ومستوى متقاطعين .</p>	<p>محيط الدائرة circle, circumference of a</p> <p>طول القوس المكون من منحنى الدائرة بأكملها ويساوى ٢ ط نـ ، حيث نـ طول نصف قطر الدائرة .</p>

circle, nine point دائرة النقط التسع
الدائرة المارة بمنتصفات أضلاع مثلث ،
ومواقع الأعمدة المرسومة من رؤوس المثلث على
أضلاعه ، والنقط المتوسطة للقطع المستقيمة
الواصلة بين رؤوس المثلث ونقطة تقاطع ارتفاعاته .

circle, null دائرة صفيرية
دائرة طول نصف قطرها صفر . فمثلاً :
$$س^2 + ص^2 = صفرًا$$

دائرة صفيرية مكونة من نقطة وحيدة هي
النقطة (صفر ، صفر) . والدائرة الصفيرية
$$(س - ل)^2 + (ص - ل)^2 = صفرًا$$

تتكون من النقطة الوحيدة (ل ، ل) .

circle of a celestial point, hour دائرة الساعة لنقطة سماوية
الدائرة العظمى على الكرة السماوية التي تمر
بهذه النقطة وبالقطين السماويين .

circle of a polygon, circumscribed
= circumcircle
الدائرة المارة برؤوس المضلع .

معادلة الدائرة في المستوى

circle in the plane, equation of a



أ - بدلالة الإحداثيات الديكارتية : معادلة
الدائرة التي مركزها النقطة (ل ، ل) وطول
نصف قطرها نور هي :

$$(س - ل)^2 + (ص - ل)^2 = نور^2$$

ب - بدلالة الإحداثيات القطبية : معادلة
الدائرة التي مركزها النقطة (ب ، θ) وطول
نصف قطرها نور هي :

$$س^2 + ص^2 - 2سب \cos(\theta - \theta_0) = نور^2$$

حيث (مر ، θ) إحداثيا أى نقطة على الدائرة .



دائرة التقارب لمتسلسلة قوى
circle of convergence of a power series

لمتسلسلة القوى

$$c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots + c_n(x-a)^n + \dots$$
 يوجد عدد r بحيث تكون المتسلسلة مطلقة التقارب إذا كان $|x-a| < r$.
 الدائرة التي نصف قطرها r ومركزها عند a في المستوى المركب هي دائرة التقارب لمتسلسلة القوى المعطاة ، ومعادلتها هي :

$$r = |x-a|$$

دائرة التقوس لمنحنٍ مستوٍ
circle of curvature of a plane curve


الدائرة المماسية للمنحنى على الجانب المقعر منه ولها نفس تقوس المنحنى عند نقطة التماس هي دائرة تقوس المنحنى عند هذه النقطة .

دائرة التقوس لمنحنى فراغى
circle of curvature of a space curve

= دائرة اللثام لمنحنى
= osculating circle of a curve
الوضع النهائى للدائرة المماسية للمنحنى الفراغى عند نقطة ثابتة عليه (م) ومارة بنقطة

الدائرة المماسية لمثلث من الخارج
circle of a triangle, escribed

الدائرة التي تمس ضلعاً في المثلث وامتدادى ضلعيه الآخرين . في الشكل الدائرة المعطاة تمس الضلع BC للمثلث ABC وامتداد ضلعيه AB ، AC .



الدائرة الداخلية لمثلث
circle of a triangle, inscribed

الدائرة التي تمس أضلاع المثلث من الداخل ، ومركز هذه الدائرة هو نقطة تلاقي منصفات الزوايا الداخلية للمثلث ، ونصف قطرها يساوى :

$$\frac{(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)}{4\Delta}$$

حيث $\Delta = \frac{1}{4}(a+b+c)(-a+b)(a-b+c)(a+b-c)$ ، a ، b ، c أطوال أضلاع المثلث .

<p>المعادلتان البارامتريتان (الوسيطيتان) للدائرة circle, the parametric equations of a المعادلتان $s = p \cos \theta$ ، $v = p \sin \theta$ ، حيث θ الزاوية بين الاتجاه الموجب لمحور السينات ونصف القطر من المركز للنقطة (س ، ص) على الدائرة ، p طول نصف قطر الدائرة وذلك في الحالة التي يكون فيها المركز هو نقطة الأصل لنظام الإحداثيات الديكارتية (س ، ص) .</p>	<p>متغيرة θ على المنحنى عندما $\theta \leftarrow \infty$ م على امتداد المنحنى . ودائرة اللثام لها تماس مع المنحنى عند م من الدرجة الثانية على الأقل .</p>
<p>دائرة الوحدة circle, unit دائرة طول نصف قطرها يساوى وحدة الأطوال ومركزها نقطة الأصل للنظام الإحداثي .</p>	<p>تربيع الدائرة circle, quadrature of a = circle, squaring of a عملية إيجاد مربع مساحته تساوى مساحة دائرة معلومة .</p>
<p>عائلة دوائر circles, family of الدوائر التي يمكن الحصول على معادلة أى منها بإعطاء قيمة محددة لثابت أساسى فى معادلة دائرة . فمثلاً: $s^2 + v^2 = c^2$ عائلة الدوائر المتحدة المركز (نقطة الأصل) التي يحصل عليها بإعطاء حـ قيماً مختلفة ، حيث حـ هو طول نصف قطر الدائرة .</p>	<p>نصف قطر الدائرة circle, radius of a أية قطعة مستقيمة تصل بين مركز الدائرة ونقطة على محيطها . ويطلق المصطلح أيضاً على طول هذه القطعة المستقيمة .</p>
<p>دوائر الاختلاف المركزى لقطع زائد circles of a hyperbola, eccentric</p>	<p>قاطع الدائرة circle, secant of a خط مسقيم يقطع الدائرة فى نقطتين .</p>
	<p>دائرة صغرى circle, small مقطع كرة بمستوى لا يمر بمركز الكرة ، وقطر الدائرة الصغرى أصغر من قطر الكرة .</p>

الدائرتان اللتان قطراهما المحوران القاطع والمرافق للقطع الزائد ومركزهما المشترك هو مركز القطع .

دائرتا الاختلاف المركزى لقطع ناقص

circles of an ellipse, eccentric

الدائرتان اللتان قطراهما المحوران الأكبر والأصغر للقطع الناقص ومركزهما المشترك هو مركز القطع .

circles, parallel دوائر متوازية

مقاطع سطح دوراني بمستويات متوازية عمودية على محور الدوران .

circles, pencil of حزمة دوائر

عائلة الدوائر الواقعة في مستوى معين وتمر بنقطتين ثابتتين ، ويمكن الحصول على معادلة كل دائرة من دوائر الحزمة من معادلتى أى دائرتين تمران بالنقطتين الثابتتين بضرب كل معادلة بمنغير وسيط اختيارى وجمع الناتج .
فمثلاً حزمة الدوائر المارة بنقطتى تقاطع الدائرتين :

$$س^2 + ص^2 - ٤ = \text{صفرًا} ،$$


$$س^2 + ٢س + ص^2 - ٤ = \text{صفرًا}$$

هى

له (س^٢ + ص^٢ - ٤) + ل (س^٢ + ٢س + ص^٢ - ٤) = صفرًا ، حيث له ، ل متغيران وسيطان لا ينعدمان آنياً . وعادة يؤخذ أحد هذين المتغيرين الوسيطين مساوياً للواحد ، ولكن هذا الاختيار يستبعد إحدى الدائرتين من الحزمة . ففى الشكل ، د_١ = صفرًا هى معادلة إحدى الدائرتين ، د_٢ = صفرًا معادلة الدائرة الأخرى .

معادلة أى دائرة تمر بنقطتى تقاطع هاتين الدائرتين هى :

$$د_١ + له د_٢ = \text{صفرًا} ،$$



حيث ك تأخذ جميع القيم فيما عدا القيمة التى تلاشى حدود الدرجة الثانية ، وإذا كانت معاملات س^٢ ، ص^٢ فى المعادلتين متساوية فإن المعادلة د_١ - د_٢ = صفرًا تمثل معادلة خط مستقيم مار بالنقطتين ويسمى المحور الأساسى (radical axis) لحزمة الدوائر . فمثلاً معادلة المحور الأساسى للدائرتين أعلاه يحصل عليها بوضع له = ١ ، ل = -١ أى س = صفرًا .

<p>مخروط دائري مائل</p> <p>circular cone, oblique</p> <p>مخروط دائري محوره ليس عمودياً على قاعدته .</p>	<p>دائرة ثنائية الاستقرار (فى الحاسب)</p> <p>circuit, flip- flop (in computer)</p> <p>دائرة لها حالتا استقرار ، تظل فى إحداهما لحين تلقى إشارة تحولها إلى حالة الاستقرار الثانية .</p>
<p>مخروط دائري قائم</p> <p>circular cone, right</p> <p>= مخروط دوراني cone of revolution</p> <p>مخروط دائري قاعدته عمودية على محوره ، ينتج من دوران مثلث قائم الزاوية حول أحد ضلعيه .</p>	<p>محدد دائري</p> <p>circulant determinant</p> <p>محدد عناصر كل صف فيه هى عناصر الصف السابق له مباشرة بعد وضع كل عنصر فى الصف مكان العنصر التالى له ووضع العنصر الأخير محل العنصر الأول . فى هذا المحدد تساوى عناصر القطر الرئيسى . وهذا المحدد يكون على الصورة التالية :</p>
<p>أسطوانة دائرية</p> <p>circular cylinder</p> <p>أسطوانة مقاطعها بمستويات عمودية على رواسمها دوائر ، أى أن دليلها دائرة .</p>	$\begin{vmatrix} a_{11}^p & a_{12}^p & a_{13}^p & a_{14}^p & a_{15}^p \\ a_{21}^p & a_{22}^p & a_{23}^p & a_{24}^p & a_{25}^p \\ a_{31}^p & a_{32}^p & a_{33}^p & a_{34}^p & a_{35}^p \\ a_{41}^p & a_{42}^p & a_{43}^p & a_{44}^p & a_{45}^p \\ a_{51}^p & a_{52}^p & a_{53}^p & a_{54}^p & a_{55}^p \end{vmatrix}$
<p>أسطوانة دائرية قائمة</p> <p>circular cylinder, right</p> <p>أسطوانة دائرية قاعدتها عموديتان على محورها . وهذه الأسطوانة تنشأ عن دوران مستطيل حول أحد أضلاعه .</p> <p>ومعادلة الأسطوانة التى دليلها الدائرة الواقعة فى المستوى ع = صفراً ومركزها نقطة الأصل ونصف قطرها p هى</p>	<p>مخروط دائري</p> <p>circular cone</p> <p>مخروط مقاطعه بمستويات عمودية على محوره دوائر .</p>

تبدیل ینقل کل عنصر من عناصر محدودة مرتبة إلى الوضع التالى لوضعه ، ینقل العنصر الآخر محل الأول .

نقطة دائرية لسطح

circular point of a surface


نقطة ناقصية للسطح ترتبط فيها معاملات الصيغة الأساسية الأولى له ، ل ، م مع معاملات الصيغة الأساسية الثانية ور ، ف ، ی بالعلاقات :

ور = پ له ، ف = پ ل ، ی = پ م ، پ ≠ صفراً وعند النقطة الدائرية يتساوى نصف القطرين الأساسيين للثقب العمودى ، كما يكون منحنى مخبر " ديوبن " دائرة . نقطتا تقاطع السطح الناقصى الدورانى مع محور دورانه نقطتان دائريتان . ويكون السطح كرة إذا ، وفقط إذا ، كانت كل نقطه نقطاً دائرية .
(انظر : مخبر " ديوبن " Dupin indicatrix) .

قطعة دائرية circular segment

المساحة المحصورة بين وتر ما فى دائرة والقوس المقابل له . وكل وتر فى الدائرة يحدّ قطعتين فيها مختلفتين فى المساحة تسمى إحداهما القطعة الصغرى وتسمى الأخرى القطعة الكبرى .

{ (س ، ص ، ع) : س^٢ + ص^٢ = پ^٢ }
(انظر الشكل)



التقدير الدائرى (للزوايا)

circular measure

قياس الزوايا بوحدة الزاوية النصف قطرية
radian .

الحركة الدائرية المنتظمة



circular motion, uniform

حركة جسم فى دائرة بسرعة ثابتة القيمة .

تبدیل دائرى

circular permutation = cyclic permutation

أما إذا كان الوتر قطعاً في الدائرة فإن القطعتين تتساويان .



ومساحة القطعة الدائرية تساوي

$\frac{1}{2} \text{ نوحه}^2 (r - \text{حاه})$ ، حيث نوحه طول نصف

قطر الدائرة ، ه قياس الزاوية المحصورة بالقس عند مركز الدائرة بالتقدير الدائري .

رأس المال الدائر circulating capital

المبلغ الذي يحول إلى أشكال أخرى أثناء عمليات الإنتاج أو خلال الأعمال التجارية مثل المبالغ المستخدمة في شراء المواد الخام .

كسر عشري تكرر

= كسر عشري دائري

circulating decimal = repeating decimal

كسر عشري تتكون جميع أرقامه بعد رقم معين من مجموعة من الأرقام تتكرر لانهائياً . مثال ذلك الكسور $\overline{3}$ ، $\overline{2,35}$ حيث تتكرر الأرقام النى فوقها شرطه لانهائياً . ويمكن كتابة الكسر العشري التكرارى على صورة كسر يحتوى على عدد محدود من الأرقام غير الصفرية بالإضافة إلى متسلسلة هندسية أساسها النسبة $(0,1)$ أو $(0,01)$ أو $(0,001)$ ، مثال ذلك

$$\overline{3} = 3 + 0,3 + 0,03 + 0,003 + \dots$$

$$\overline{2,35} = 2,35 + 0,00235 + 0,000235 + \dots$$

باستخدام هذه الخاصية يمكن إثبات أن كل كسر عشري تكررارى يساوى كسراً اعتيادياً ، وبالتالي يكون عدداً قياسياً . فمثلاً ،

$$\overline{3} = 3 \times \frac{1}{1-0,1} = 3 \times \frac{1}{0,9} = \frac{3}{0,9} = \frac{1}{3} \times 3 = \frac{1}{9} \times 3 = \frac{1}{3}$$

أما الأعداد غير القياسية مثل $\overline{2,7}$ فلا يمكن تمثيلها على صورة كسور عشرية تكرارية .


مركز الدائرة المحيطة بمثلث

circumcenter of a triangle

(انظر : الدائرة المحيطة بمثلث)
circumscribed circle of a triangle

الشكل الهندسى المحيط بمضلع (أو متعدد سطوح) circumscribed about a polygon (or polyhedron), configuration شكل هندسى يقع المضلع (أو متعدد السطوح) بأكمله داخله ، ويتكون من خطوط مستقيمة ، أو منحنيات ، أو سطوح ، وتقع كل رأس من رؤوس المضلع (أو متعدد السطوح) عليه . ويقال للمضلع (أو متعدد السطوح) أنه محاط بالشكل الهندسى .	circumcircle الدائرة المحيطة بمضلع (انظر : circumscribed circle of a polygon) . circumference المحيط المنحنى البسيط المغلق المحدد لمنطقة ما . محيط الكرة circumference of a sphere محيط أى دائرة عظمى على الكرة .
متعدد سطوح محيط بكرة circumscribed about a sphere, polyhedron متعدد سطوح تمس جميع أوجهه الكرة ، وتسمى الكرة فى هذه الحالة بالكرة المحاطة بمتعدد السطوح .	مضلع (متعدد سطوح) محيط بشكل هندسى circumscribed about a configuration, polygon (or polyhedron) مضلع كل ضلع من أضلاعه (أو متعدد سطوح كل وجه من أوجهه) مماس للشكل الهندسى ، ويقع الشكل الهندسى داخل المضلع (أو متعدد السطوح) . ويقال لهذا الشكل الهندسى « الشكل الهندسى المحاط بمضلع (أو بمتعدد سطوح) » .
دائرة محيطة بمضلع circumscribed circle of a polygon دائرة تمر برؤوس المضلع . إذا كان المضلع مضلعاً منتظماً عدد أضلاعه n وطول كل ضلع من أضلاعه l فإن طول	

(انظر الشكل)



أسطوانة محيطة بمنشور

circumscribed cylinder of a prism

أسطوانة قاعدتهاا تقعان فى نفس مستويى قاعدتى المنشور وتحيطان بهما وتكون الأحرف الجانبية للمنشور رؤاسم (عناصر) للأسطوانة . ويسمى المنشور فى هذه الحالة بالمنشور المحاط بالأسطوانة .

inscribed prism of the cylinder

مضلع محيط بدائرة

circumscribed polygon of a circle

مضلع أضلاعه مماسة للدائرة . إذا كان المضلع مضلعاً منتظماً عدد أضلاعه n وطول كل ضلع من أضلاعه l فإن طول نصف قطر الدائرة نور يساوى

نصف قطر الدائرة نور يساوى :

$$\frac{l}{2} \text{ قتا } \frac{180^\circ}{n}$$

ويقال لهذا المضلع « مضلع محاط بدائرة » .

دائرة محيطة بمثلث

= دائرة تمر برؤوس المثلث

circumscribed circle of a triangle

الدائرة التى مركزها ملتقى الأعمدة المقامة على أضلاع المثلث من منتصفاتها ونصف قطرها

$$\text{نور} = \frac{\overline{آ\bar{آ}}}{4} \sqrt{4 - (\bar{آ} - \bar{ح})(\bar{ح} - \bar{ت})(\bar{ت} - \bar{ح})}$$

حيث $\bar{آ}$ ، $\bar{ت}$ ، $\bar{ح}$ أطوال أضلاع المثلث ،

$$\bar{ح} = \frac{1}{2} (\bar{آ} + \bar{ت} + \bar{ح})$$

مخروط محيط بهرم

circumscribed cone of a pyramid

مخروط قاعدته محيطة بقاعدة الهرم وتنطبق رأسه على رأس الهرم ، ويسمى الهرم فى هذه الحالة بالهرم المحاط بالمخروط

inscribed pyramid of the cone

الكرة المحيطة بمتعدد سطوح
circumscribed sphere of a polyhedron
كرة تمر بجميع رؤوس متعدد السطوح ،
ويسمى متعدد السطوح في هذه الحالة بمتعدد
السطوح المحاط بالكرة .
polyhedron inscribed in the sphere

سيسويد « ديوكليس »
cissoid of Diocles

المحل الهندسى لنقطة متغيرة على خط
مستقيم متغير يقع في مستوى دائرة ثابتة ويمر
بنقطة ثابتة عليها ، بحيث يكون البعد بين
النقطتين مساوياً البعد بين نقطتي تقاطع الخط
المستقيم مع الدائرة ومع مماس الدائرة عند نهاية
قطرها المار بالنقطة الثابتة . وهو أيضاً المحل
الهندسى لموقع العمود من رأس قطع مكافئ على
مماس متغير للقطع . إذا كان θ نصف قطر الدائرة
في التعريف الأول ، فإن المعادلة القطبية للمنحنى
السيسويد تكون

$$r = 2\theta \tan \theta \quad , \quad \theta \text{ حـا } 0$$

ومعادلته الديكارتية هي :

$$ص^2 = (2 - س) س^3$$

وللمنحنى قُرْنَة من النوع الأول عند نقطة
الأصل حيث محور السينات هو المماس المزدوج .
وقد كان « ديوكليس » (٢٠٠ قبل الميلاد)

$$\frac{ل}{٢} \text{ ظنا } \frac{١٨٠}{س}$$


منشور محيط بأسطوانة
circumscribed prism of a cylinder

منشور قاعدته تقعان في نفس مستويي
قاعدتي الأسطوانة ومحيطتان بهما ، وتكون
الأوجه الجانبية للمنشور مماسة للسطح
الأسطوانى . وتسمى الأسطوانة في هذه الحالة
بالأسطوانة المحاطة بالمنشور
(inscribed cylinder of the prism)


هرم محيط بمخروط
circumscribed pyramid of a cone

هرم قاعدته محيطة بقاعدة المخروط وتنطبق
رأسه على رأس المخروط ، ويسمى المخروط في
هذه الحالة بالمخروط المحاط بالهرم
inscribed cone of the pyramid

(انظر الشكل)



هو أول من درس هذا المنحنى وأعطاه هذا الاسم .



السنة المدنية civil year
 = السنة التقويمية = calendar year
 = السنة القانونية = legal year
 مدة زمنية تساوي ٣٦٥ يوماً (سنة عادية)
 أو ٣٦٦ يوماً (سنة كبيسة) .

معادلة « كليرو » التفاضلية .

Clairaut's differential equation

معادلة تفاضلية على الصورة

$$ص = س ص' + د (ص') ,$$

حيث د (ص) دالة ما . الحل العام لهذه المعادلة

هو $ص = ح س + د (ح)$. وللمعادلة حل

شاذ يعطى بدلالة المعادلتين الوسيطيتين

$$ص = س - د (ص) + د (ص) , س = - د (ص) + د (ص) .$$

فصل تكافؤ (متكافئ) class, equivalence

إذا عرفت علاقة تكافؤ على فئة فإنها تجزئها إلى فئات جزئية (يسمى كل منها فصل تكافؤ) بحيث ينتمى عنصران من عناصر الفئة لنفس فصل التكافؤ إذا ، وفقط إذا ، كانا مرتبطين بعلاقة التكافؤ .

التكرار الفصلي class frequency
 التكرار الذي يأخذ به متغير ما مجموعة القيم المحنوه في فترة فصل ما .

فترة فصل (في الإحصاء)

class interval (in statistics)

تجميع القيم الممكنة لمتغير ما فمثلاً المتغيرات التي تكون متصلة من صفر إلى ١٠٠ يمكن تجميعها عشوائياً في فترات فصول عرضها عشر وحدات من صفر إلى عشرة ، ومن عشرة إلى عشرين ، وهكذا . ويسمى عرض الفصل أحياناً فترة الفصل .

نهايتا الفصل (في الحاسب)

= class limits (in computer)

= class bounds حد الفصل

الحدان الأدنى والأعلى لفترة فصل .

مجمع اللغة العربية - القاهرة

clean	محو	class mark	دليل الفصل
إزالة معلومات في وسط تخزين ، ويتم ذلك بوضع أصفار أو مسافات بيضاء مكان البيانات المطلوب محوها .		القيمة أو الاسم الذى يعطى لفترة فصل معين . وفي أغلب الأحيان يكون دليل الفصل هو القيمة المتوسطة أو القيمة الصحيحة الأقرب لها .	
الساعة (مولد النبضات بالحاسب)		رتبة منحنى جبرى مستو	
clock		class of a plane algebraic curve	
دائرة التوقيت الرئيسية في الحاسب . وتقوم بتوليد نبضات كهربائية متتابعة على فترات زمنية متساوية تتحكم في تشغيل دوائر الحاسب خطوة خطوة حتى يتم تنفيذ الأمر المطلوب .		أكبر عدد من المماسات التى يمكن رسمها للمنحنى من أى نقطة في مستواه وغير واقعة عليه . .	
clock addition	الجمع الساعاتى	الحركة اللاتوافقية الكلاسيكية	
الجمع مقياس ١٢ ، فمثلاً $7 \oplus 8 = 3$.		classical anharmonic motion	
clock multiplication	الضرب الساعى	حركة جسم يتذبذب ذبذبة لاتوافقية .	
الضرب مقياس ١٢ ، فمثلاً $7 \otimes 3 = 9$.		الميكانيكا الكلاسيكية	
clock wise	متفق والساعة	classical mechanics	
صفة للدوران في اتجاه حركة عقارب الساعة .		= الميكانيكا النيوتونية	
		Newtonian mechanics	
		علم معالجة الحركة والاتزان للأجسام على أساس قوانين نيوتن .	

معجم الرياضيات

<p>closed mapping راسم مغلق</p> <p>يقال لراسم (تناظر أو تحويل أو دالة) أنه مغلق إذا كانت صورة كل فئة مغلقة بالراسم فئة مغلقة .</p> <p>(انظر أيضاً : راسم مفتوح open mapping) .</p>	<p>closed curve منحنى مغلق</p> <p>منحنى ليس له نقط طرفية . وهو مجموعة من النقط يحصل عليها بتحويل متصل كصورة للدائرة ، ويسمى جزء المنحنى الذى يحصر تماماً جزءاً من مستوى أو من سطح بعروة المنحنى .</p>
<p>closed set فئة مغلقة</p> <p>يقال لفئة سـ من النقط أنها مغلقة إذا كانت كل نقطة نهاية للفئة سـ نقطة من نقطها . والفئة المغلقة مكملة فئة مفتوحة . فئة نقط الدائرة ونقط داخليتها هي فئة مغلقة .</p>	<p>closed interval فترة مغلقة</p> <p>فئة جميع الأعداد التى تكون أكبر من أو تساوى عدداً معيناً ثابتاً وتكون أيضاً أقل من أو تساوى عدداً معيناً ثابتاً آخر . إذا كان العددان هما a ، b فيرمز لهذه الفئة بالرمز $[a, b]$ أى أن</p>
<p>closed subroutine برنامج فرعى مغلق</p> <p>جزء من برنامج للحاسب له مكان خاص داخل البرنامج ويلبى أوامر البرنامج عند كل استدعاء له عن طريق روابط (links) : ويهدف استخدام هذا الأسلوب أساساً إلى الوفرة فى أماكن التخزين المتاحة .</p>	<p>$[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}$ ويسمى العدد $b - a$ طول الفترة ، a ، b نقطتا نهايتها .</p>
<p>closed surface سطح مغلق</p> <p>سطح ليس له منحنيات حدود . ويوجد لكل نقطة من نقاط هذا السطح جوار يكون مكافئاً طوبولوجياً لدائرية داخلية دائرة .</p>	<p>تحويل خطى مغلق</p> <p>closed linear transformation</p> <p>إذا كان T تحويل خطى من E إلى F ، $T(x) = y$ ، $x \in E$ ، $y \in F$ ، فإن T مغلق إذا كانت</p>

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>ائتلاف</p> <p>coalition</p> <p>فئة تحوى أكثر من لاعب واحد من المشتركين في مباراة ، ينسق أفرادها أسلوب لعبهم بهدف الكسب المشترك .</p>	<p>مُغلقة فئة من النقط</p> <p>closure of a set of points</p> <p>الفئة التى تحتوى الفئة المعطاة وجميع نقط تراكمها . ومُغلقة فئة مغلقة هى الفئة نفسها ، كما أن مُغلقة أى فئة تكون فئة مغلقة - وتسمى فئة جميع نقط تراكم فئة معطاة الفئة المشتقة لها derived set ويرمز لمغلقة فئة S' عادة بالرمز S' ولفئتها المشتقة بالرمز S'' ، وينتج من ذلك أن $S' = S''$.</p>
<p>الارتفاع المرافق لنقطة سماوية</p> <p>coaltitude of a celestial point</p> <p>= البعد السمى لنجم</p> <p>= zenith distance of a star</p> <p>البعد الزاوى من السمى إلى النجم مقيساً على امتداد الدائرة العظمى المارة بالسمى والنظير والنجم وهى مكملة الارتفاع .</p>	<p>خاصية الغلق</p> <p>closure property</p> <p>يقال لفئة ما أنها مغلقة تحت عملية تجرى على عناصرها إذا كان كل إجراء للعملية يعطى عنصراً من عناصر الفئة . فمثلاً الفئة $\{1, 3, 5, \dots\}$ ليست مغلقة تحت عملية جمع الأعداد لأن $1 + 3 = 4$ والعدد 4 ليس عنصراً من عناصر الفئة (الفئة لا تحقق خاصية الغلق بالنسبة لعملية الجمع) ، فى حين أن فئة الأعداد الصحيحة مغلقة تحت عملية الجمع لأن مجموع أى عددين صحيحين يكون دائماً عدداً صحيحاً .</p>
<p>الارتفاع المرافق لنقطة على سطح الأرض</p> <p>coaltitude of a point on the earth</p> <p>الزاوية المتممة لزاوية الارتفاع لنقطة على سطح الأرض .</p>	<p>نقطة تراكم</p> <p>cluster point</p> <p>(انظر : accumulation point) .</p>
<p>دوائر متحدة المحور (متمحورة)</p> <p>coaxial circles</p> <p>مجموعة من الدوائر كل زوج منها له نفس المحور الأساسى</p> <p>(انظر : المحور الأساسى axis, radical) .</p>	<p>دوائر متحدة المحور (متمحورة)</p> <p>coaxial circles</p> <p>مجموعة من الدوائر كل زوج منها له نفس المحور الأساسى</p> <p>(انظر : المحور الأساسى axis, radical) .</p>

<p>الصيغ ν_m مستقلة التوزيع بالنسبة إلى توزيع χ^2 لدرجات حرية ν_m هو أن يكون</p> $\frac{\nu_m}{1} = \frac{\nu_m}{1} = \nu_m$	<p>مستويات متحدة المحور (متمحورة) coaxial planes (انظر: مستويات متسامتة collinear planes).</p>
<p>النظام الشفري للبطاقات code, card أسلوب تمثيل الأرقام والحروف والرموز على أعمدة وصفوف بطاقة التقيب .</p>	<p>اللغة التجارية العامة (لغة الكوبول) cobol اصطلاح مأخوذ من الحروف الأولى لكلمات العبارة : common business oriented language وهي إحدى لغات البرامج العامة التي تم التوصل إليها لإعداد البرامج التي تقوم بتنفيذ العمليات والوظائف التجارية .</p>
<p>النظام الشفري للحاسب code, computer نظام من عدد من التشكيلات المختلفة من المواضع الثنائية المستخدمة في الحاسبات .</p>	<p>نظرية "كوشران" Cochrans theorem نظرية تنص على أنه إذا كانت $s_r (r=1, 2, \dots, n)$ متغيرات مستقلة وموزعة توزيعاً طبيعياً ومتوسطها الصفر وتباينها الواحد ، وإذا كانت $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_r$ صيغاً تربيعية عددها له في المتغيرات s_r رتبها $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_r$ على الترتيب بحيث أن</p> $\frac{\nu_m}{1} = \frac{\nu_m}{1} = \nu_m$
<p>دالة التشفير code, function نظام لتمثيل العمليات المختلفة التي يؤديها الحاسب والتي يتضمنها كل أمر من أوامر البرنامج .</p>	<p>فإن الشرط الكافي واللازم لكي يكون كل من</p>
<p>نظام شفري للأوامر code, instruction قائمة بالرموز والتعاريف المتعلقة بالأوامر الخاصة بالحاسب .</p>	

<p>الزاوية المتممة للميل الزاوى للنقطة السهوية ، أى الميل الزاوى مطروحاً من تسعين درجة .</p>	<p>نظام شفرى لعناوين متعددة code, multiple address أمر للتعامل مع أكثر من عنوان أثناء تنفيذ البرنامج .</p>
<p>التشفير . coding إعداد قائمة من الأوامر والتعليقات وكتابتها بطريقة معينة وبتتابع معين ، لتنفيذ عمليات تؤدي إلى حل مشكلة ما باستخدام الحاسب .</p>	<p>نظام تشفير رقمى code, numeric تمثيل البيانات بمجموعات مشفرة من البتات للتعبير عن الأرقام .</p>
<p>المجال المقابل لدالة codomain of a function فئة القيم التى يأخذها المتغير التابع فى الدالة .</p>	<p>نظام تشفير للعمليات code, operation جزء من الأمر يبين العملية التى يجب تنفيذها رمزياً .</p>
<p>معامل coefficient الجزء العددى فى الحد الجبرى ، ويكتب عادة قبل الرمز أو الرموز المستخدمة فى هذا الحد . فمثلاً يعتبر العدد ٢ معاملاً لكل من الحدين ٢ س ، ٢ (س + ص) . وبصورة عامة يستخدم هذا المفهوم ليبدل على حاصل ضرب جميع عوامل المقدار ما عدا رمزاً معيناً حيث يعتبر حاصل الضرب هذا معاملاً لذلك الرمز . فمثلاً فى المقدار ٢ ٢ س ص ع يعتبر ٢ ٢ س ص</p>	<p>نظام شفرى code system ١ - نظام من الرموز يستخدم للدلالة على عملية معينة طبقاً لأوامر البرنامج . ٢ - نظام من الرموز يستخدم لتمثيل البيانات . الميل الزاوى المرافق لنقطة سهوية = البعد القطبى codeclination of a celestial point</p>

معامل الاحتكاك coefficient of friction النسبة بين قوة الاحتكاك النهائي ورد الفعل العمودي بين سطحين معينين .	معاملاً للرمز ع ، كما يعتبر ٢ ٢ ص ع معاملاً للرمز س ، ٢ ٢ س معاملاً للرمز ص ع ، ... ، وغالباً يستخدم هذا المفهوم في الجبر ليدل على العوامل الثابتة في المقدار حتى يميزها عن المتغيرات .
معامل الاحتكاك الحركي coefficient of kinetic friction = معامل الاحتكاك الانزلاقي = coefficient of sliding friction النسبة بين القوة المماسية في اتجاه الحركة ورد الفعل العمودي عندما ينزلق جسم على آخر .	المعامل التفاضلي coefficient, differential = مشتقة = derivative (انظر : مشتقة derivative)
معامل التمدد الطولي (الخطي) coefficient of linear expansion خارج قسمة التغير الناشئ في طول قضيب على طوله الأصلي عند تغير درجة حرارته درجة واحدة .	المعامل الرئيسي coefficient, leading معامل الحد ذو القوة العليا في كثيرة حدود في متغير واحد .
معامل المرونة القصية coefficient of shear elasticity = modulus of shear elasticity النسبة بين إجهاد القص والانفعال الناشئ عنه وهو أحد معاملات المرونة .	معامل التصادم coefficient of collision = معامل الارتداد = coefficient of restitution النسبة بين مقدار السرعة النسبية لجسمين متحركين في خط مستقيم واحد بعد تصادمهما مباشرة وبين مقدار سرعتيهما النسبية قبل التصادم مباشرة .

<p>١٠٠ ع س يسمى معامل التغير للمتغير س .</p>	<p>معامل الاحتكاك الاستاتيكي coefficient of static friction</p>
<p>معامل التمدد الحجمي coefficient of volume (or cubical) expansion</p>	<p>النسبة بين القوة المماسية ورد الفعل العمودي عند بدء الحركة النسبية بين جسمين .</p>
<p>التغير في حجم مكعب من مادة ما حجمه الوحدة عند تغير درجة حرارتها درجة واحدة .</p>	<p>معامل الاستطالة (في علم الهندسة) coefficient of strain (in geometry)</p>
<p>معامل فاي (في الإحصاء) coefficient, phi (in statistics)</p>	<p>إذا كان $\bar{s} = s$ ، $\bar{v} = v$ (أو $\bar{s} = s$ ، $\bar{v} = v$) تحويل إحداثي ، فإن الثابت له يسمى معامل الاستطالة .</p>
<p>معامل يتوصل إليه من جدول ذي أربع خانات وفيه المتغيران متفرعان ثنائياً . ويعرف معامل فاي (ϕ) كالتالي :</p>	<p>(انظر : الاستطالة الأحادية البعد) strain, one-dimensional</p>
<p>حيث تحسب χ^2 من مدخلات الخلايا . (انظر : χ^2 Chi-square)</p>	<p>معامل التمدد الحراري coefficient of thermal expansion</p>
<p>معاملات ذات الحدين coefficients, binomial</p>	<p>مصطلح يطلق على معامل التمدد الطولي وكذلك على معامل التمدد الحجمي .</p>
<p>(انظر : binomial coefficients) .</p>	<p>معامل التغير (في الإحصاء) coefficient of variation (in statistics)</p>
	<p>إذا كان ع الانحراف المعياري للمتغير س ، \bar{s} متوسط المتغير س ، فإن المقدار</p>

العلاقة بين جذور ومعاملات معادلة كثيرة حدود

coefficients of a polynomial equation, relation between the roots and the

في معادلة كثيرة الحدود من الدرجة النونية
 $s^n + p_{n-1}s^{n-1} + p_{n-2}s^{n-2} + \dots + p_1s + p_0 = 0$ صفراً ،
 حيث معامل s^n هو الوحدة ، يساوى مجموع
 الجذور سالب معامل s^{n-1} (أى - p_1) ،
 ويساوى مجموع حاصلات ضرب الجذور
 مأخوذة مثنى مثنى بكل الطرق الممكنة معامل
 s^{n-2} (أى p_2)

ويساوى مجموع حاصلات ضرب الجذور
 مأخوذة ثلاثة ثلاثة بثلاثة سالب معامل s^{n-3}
 (أى - p_3) ، ... ، ويساوى حاصل
 ضرب جميع الجذور الحد المطلق مضروباً في
 $(-1)^n$

فمثلاً في معادلة الدرجة الثانية :
 $s^2 + ps + q = 0$ صفراً ،
 حيث $p \neq 0$ صفراً ، وبالتالي يمكن كتابة المعادلة
 على الصورة :

$$s^2 + \frac{p}{q}s + \frac{q}{q} = 0 \text{ صفراً ،}$$

يكون مجموع الجذرين - $\frac{p}{q}$ ،

حاصل ضربهما $\frac{q}{q}$

معاملات معادلة

coefficients in an equation

الحد المطلق ومعاملات كل الحدود التى تحوى
 متغيرات .

معاملات " لا جندر "

coefficients, Legendre

(انظر : كثيرات حدود " لا جندر ")
 Legendre polynomials

الضرب والقسمة باستخدام المعاملات
 coefficients, multiplication and
 division by means of detached

اختصار لعمليتى الضرب والقسمة
 العاديتين فى الجبر باستخدام المعاملات
 بإشاراتها فقط ، وبحيث تعرف قوى المتغير
 المتضمن فى الحدود المختلفة من ترتيب كتابة
 المعاملات ، ويفترض أن القوى غير الموجودة
 ممثلة بمعاملات صفرية . فمثلاً ، نحصل على
 حاصل ضرب

($s^3 + 2s + 1$) فى ($3s - 1$)
 باستخدام التعبيرين : ($1 + 2s + s^3$) ،
 ($3 - 1s$)

محدد معاملات فئة من المعادلات الخطية

coefficients of a set of linear

equations, determinant of the

المحدد الذي يكون عنصره في الصف الرأى

والعمود الميمي هو معامل المتغير الميمي في

المعادلة الرائية من مجموعة معادلات خطية

عددہا ن فی ن من المجاہیل . فمثلاً محدد

معاملات المجاهيل في المعادلتين :

۲ س + ۳ ص - ۱ = صفراً،

٤ س - ٧ ص + ٥ = صفراً

هو

$$\begin{vmatrix} \gamma & \gamma \\ \gamma - & \varepsilon \end{vmatrix}$$

مصفوفة المعاملات لمجموعة من المعادلات

الخطية الأنية

coefficients of a set of simultaneous

linear equations, matrix of the

المنظومة المستطيلة الشكل التي نحصل عليها

بإغفال المتغيرات في المعادلات عندما تكتب

المعادلات بحيث تكون المتغيرات فيها بنفس

الترتيب ومكتوبة بحيث تقع معاملات كل متغير

في نفس العمود ، وتستخدم الصفر كمعامل في

حالة عدم وجود حد . وعندما يكون عدد

المتغيرات مساوياً لعدد المعادلات ، فإن المصفوفة

يقال لها مصفوفة مربعة .

فمثلاً مصفوفة معاملات المعادلتين :

٢. س + ب + ص + ح + ع + ٦ = صفر

$٢٠ = ٢٥ + ح٢ + ص٢ + س٢$

هي

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

معاملات غير معينة

coefficients, undetermined

كميات غير معلومة تدخل في الصيغ

(كثيرات الحدود الجبرية عادة) بغرض

تعيينها لتأخذ الصيغ صوراً معينة مطلوبة .

فمثلاً إذا كان المطلوب تحليل المقدار

س^۲ - ۳ س + ۲ ، فیانہ یمکن اخذ عاملی

التحليل على أنهما س، ٢، س + ب حيث

٢، ب العاملين المطلوب تعينهم في

هذه الحالة ، بحث يكون حاصل ضرب

س + ا + س = مكافئاً للمقدار الأصلي

أند: $\frac{1}{2} \times 100 = 50$

$$2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11^2 \cdot 13^2 \cdot 17^2 \cdot 19^2 \cdot 23^2 \cdot 29^2 \cdot 31^2 \cdot 37^2 \cdot 41^2 \cdot 43^2 \cdot 47^2 \cdot 53^2 \cdot 59^2 \cdot 61^2 \cdot 67^2 \cdot 71^2 \cdot 73^2 \cdot 79^2 \cdot 83^2 \cdot 89^2 \cdot 97^2 \cdot 101^2 \cdot 103^2 \cdot 107^2 \cdot 109^2 \cdot 113^2 \cdot 127^2 \cdot 131^2 \cdot 137^2 \cdot 149^2 \cdot 151^2 \cdot 157^2 \cdot 163^2 \cdot 167^2 \cdot 173^2 \cdot 179^2 \cdot 181^2 \cdot 187^2 \cdot 191^2 \cdot 193^2 \cdot 197^2 \cdot 199^2 \cdot 211^2 \cdot 223^2 \cdot 227^2 \cdot 229^2 \cdot 233^2 \cdot 239^2 \cdot 241^2 \cdot 251^2 \cdot 257^2 \cdot 263^2 \cdot 269^2 \cdot 271^2 \cdot 277^2 \cdot 281^2 \cdot 283^2 \cdot 293^2 \cdot 307^2 \cdot 311^2 \cdot 313^2 \cdot 317^2 \cdot 331^2 \cdot 337^2 \cdot 347^2 \cdot 353^2 \cdot 359^2 \cdot 367^2 \cdot 373^2 \cdot 379^2 \cdot 383^2 \cdot 389^2 \cdot 397^2 \cdot 401^2 \cdot 409^2 \cdot 419^2 \cdot 421^2 \cdot 431^2 \cdot 433^2 \cdot 439^2 \cdot 443^2 \cdot 449^2 \cdot 457^2 \cdot 461^2 \cdot 463^2 \cdot 467^2 \cdot 479^2 \cdot 487^2 \cdot 491^2 \cdot 499^2 \cdot 503^2 \cdot 509^2 \cdot 521^2 \cdot 523^2 \cdot 527^2 \cdot 539^2 \cdot 541^2 \cdot 547^2 \cdot 557^2 \cdot 563^2 \cdot 569^2 \cdot 571^2 \cdot 577^2 \cdot 587^2 \cdot 593^2 \cdot 599^2 \cdot 601^2 \cdot 607^2 \cdot 613^2 \cdot 617^2 \cdot 619^2 \cdot 623^2 \cdot 629^2 \cdot 631^2 \cdot 637^2 \cdot 641^2 \cdot 643^2 \cdot 647^2 \cdot 653^2 \cdot 659^2 \cdot 661^2 \cdot 667^2 \cdot 671^2 \cdot 673^2 \cdot 677^2 \cdot 683^2 \cdot 687^2 \cdot 691^2 \cdot 693^2 \cdot 697^2 \cdot 701^2 \cdot 703^2 \cdot 707^2 \cdot 709^2 \cdot 713^2 \cdot 719^2 \cdot 721^2 \cdot 727^2 \cdot 729^2 \cdot 731^2 \cdot 733^2 \cdot 737^2 \cdot 739^2 \cdot 743^2 \cdot 747^2 \cdot 751^2 \cdot 753^2 \cdot 757^2 \cdot 759^2 \cdot 761^2 \cdot 763^2 \cdot 767^2 \cdot 769^2 \cdot 771^2 \cdot 773^2 \cdot 777^2 \cdot 779^2 \cdot 781^2 \cdot 783^2 \cdot 787^2 \cdot 789^2 \cdot 791^2 \cdot 793^2 \cdot 797^2 \cdot 799^2 \cdot 801^2 \cdot 803^2 \cdot 807^2 \cdot 809^2 \cdot 811^2 \cdot 813^2 \cdot 817^2 \cdot 819^2 \cdot 821^2 \cdot 823^2 \cdot 827^2 \cdot 829^2 \cdot 831^2 \cdot 833^2 \cdot 837^2 \cdot 839^2 \cdot 841^2 \cdot 843^2 \cdot 847^2 \cdot 849^2 \cdot 851^2 \cdot 853^2 \cdot 857^2 \cdot 859^2 \cdot 861^2 \cdot 863^2 \cdot 867^2 \cdot 869^2 \cdot 871^2 \cdot 873^2 \cdot 877^2 \cdot 879^2 \cdot 881^2 \cdot 883^2 \cdot 887^2 \cdot 889^2 \cdot 891^2 \cdot 893^2 \cdot 897^2 \cdot 899^2 \cdot 901^2 \cdot 903^2 \cdot 907^2 \cdot 909^2 \cdot 911^2 \cdot 913^2 \cdot 917^2 \cdot 919^2 \cdot 921^2 \cdot 923^2 \cdot 927^2 \cdot 929^2 \cdot 931^2 \cdot 933^2 \cdot 937^2 \cdot 939^2 \cdot 941^2 \cdot 943^2 \cdot 947^2 \cdot 949^2 \cdot 951^2 \cdot 953^2 \cdot 957^2 \cdot 959^2 \cdot 961^2 \cdot 963^2 \cdot 967^2 \cdot 969^2 \cdot 971^2 \cdot 973^2 \cdot 977^2 \cdot 979^2 \cdot 981^2 \cdot 983^2 \cdot 987^2 \cdot 989^2 \cdot 991^2 \cdot 993^2 \cdot 997^2 \cdot 999^2$$

والتالي:

فان $2^2 + 3^2 = 13$ و $3^2 + 4^2 = 25$ و $4^2 + 5^2 = 41$ و $5^2 + 6^2 = 61$ و $6^2 + 7^2 = 85$ و $7^2 + 8^2 = 113$ و $8^2 + 9^2 = 145$ و $9^2 + 10^2 = 181$ و $10^2 + 11^2 = 221$ و $11^2 + 12^2 = 265$ و $12^2 + 13^2 = 313$ و $13^2 + 14^2 = 365$ و $14^2 + 15^2 = 421$ و $15^2 + 16^2 = 481$ و $16^2 + 17^2 = 545$ و $17^2 + 18^2 = 613$ و $18^2 + 19^2 = 685$ و $19^2 + 20^2 = 761$ و $20^2 + 21^2 = 841$ و $21^2 + 22^2 = 925$ و $22^2 + 23^2 = 1013$ و $23^2 + 24^2 = 1105$ و $24^2 + 25^2 = 1201$ و $25^2 + 26^2 = 1301$ و $26^2 + 27^2 = 1405$ و $27^2 + 28^2 = 1513$ و $28^2 + 29^2 = 1625$ و $29^2 + 30^2 = 1741$ و $30^2 + 31^2 = 1861$ و $31^2 + 32^2 = 1985$ و $32^2 + 33^2 = 2113$ و $33^2 + 34^2 = 2245$ و $34^2 + 35^2 = 2381$ و $35^2 + 36^2 = 2521$ و $36^2 + 37^2 = 2665$ و $37^2 + 38^2 = 2813$ و $38^2 + 39^2 = 2965$ و $39^2 + 40^2 = 3121$ و $40^2 + 41^2 = 3281$ و $41^2 + 42^2 = 3445$ و $42^2 + 43^2 = 3613$ و $43^2 + 44^2 = 3785$ و $44^2 + 45^2 = 3961$ و $45^2 + 46^2 = 4141$ و $46^2 + 47^2 = 4325$ و $47^2 + 48^2 = 4513$ و $48^2 + 49^2 = 4705$ و $49^2 + 50^2 = 4901$ و $50^2 + 51^2 = 5101$ و $51^2 + 52^2 = 5305$ و $52^2 + 53^2 = 5513$ و $53^2 + 54^2 = 5725$ و $54^2 + 55^2 = 5941$ و $55^2 + 56^2 = 6161$ و $56^2 + 57^2 = 6385$ و $57^2 + 58^2 = 6613$ و $58^2 + 59^2 = 6845$ و $59^2 + 60^2 = 7081$ و $60^2 + 61^2 = 7321$ و $61^2 + 62^2 = 7565$ و $62^2 + 63^2 = 7813$ و $63^2 + 64^2 = 8065$ و $64^2 + 65^2 = 8321$ و $65^2 + 66^2 = 8581$ و $66^2 + 67^2 = 8845$ و $67^2 + 68^2 = 9113$ و $68^2 + 69^2 = 9385$ و $69^2 + 70^2 = 9661$ و $70^2 + 71^2 = 9941$ و $71^2 + 72^2 = 10225$ و $72^2 + 73^2 = 10513$ و $73^2 + 74^2 = 10805$ و $74^2 + 75^2 = 11101$ و $75^2 + 76^2 = 11401$ و $76^2 + 77^2 = 11705$ و $77^2 + 78^2 = 12013$ و $78^2 + 79^2 = 12325$ و $79^2 + 80^2 = 12641$ و $80^2 + 81^2 = 12961$ و $81^2 + 82^2 = 13285$ و $82^2 + 83^2 = 13613$ و $83^2 + 84^2 = 13945$ و $84^2 + 85^2 = 14281$ و $85^2 + 86^2 = 14621$ و $86^2 + 87^2 = 14965$ و $87^2 + 88^2 = 15313$ و $88^2 + 89^2 = 15665$ و $89^2 + 90^2 = 16021$ و $90^2 + 91^2 = 16381$ و $91^2 + 92^2 = 16745$ و $92^2 + 93^2 = 17113$ و $93^2 + 94^2 = 17485$ و $94^2 + 95^2 = 17861$ و $95^2 + 96^2 = 18241$ و $96^2 + 97^2 = 18625$ و $97^2 + 98^2 = 19013$ و $98^2 + 99^2 = 19405$ و $99^2 + 100^2 = 19801$ و $100^2 + 101^2 = 20201$ و $101^2 + 102^2 = 20605$ و $102^2 + 103^2 = 21013$ و $103^2 + 104^2 = 21425$ و $104^2 + 105^2 = 21841$ و $105^2 + 106^2 = 22261$ و $106^2 + 107^2 = 22685$ و $107^2 + 108^2 = 23113$ و $108^2 + 109^2 = 23545$ و $109^2 + 110^2 = 23981$ و $110^2 + 111^2 = 24421$ و $111^2 + 112^2 = 24865$ و $112^2 + 113^2 = 25313$ و $113^2 + 114^2 = 25765$ و $114^2 + 115^2 = 26221$ و $115^2 + 116^2 = 26681$ و $116^2 + 117^2 = 27145$ و $117^2 + 118^2 = 27613$ و $118^2 + 119^2 = 28085$ و $119^2 + 120^2 = 28561$ و $120^2 + 121^2 = 29041$ و $121^2 + 122^2 = 29525$ و $122^2 + 123^2 = 30013$ و $123^2 + 124^2 = 30505$ و $124^2 + 125^2 = 30991$ و $125^2 + 126^2 = 31481$ و $126^2 + 127^2 = 31975$ و $127^2 + 128^2 = 32473$ و $128^2 + 129^2 = 32975$ و $129^2 + 130^2 = 33481$ و $130^2 + 131^2 = 33991$ و $131^2 + 132^2 = 34505$ و $132^2 + 133^2 = 35023$ و $133^2 + 134^2 = 35545$ و $134^2 + 135^2 = 36071$ و $135^2 + 136^2 = 36601$ و $136^2 + 137^2 = 37135$ و $137^2 + 138^2 = 37673$ و $138^2 + 139^2 = 38215$ و $139^2 + 140^2 = 38761$ و $140^2 + 141^2 = 39311$ و $141^2 + 142^2 = 39865$ و $142^2 + 143^2 = 40423$ و $143^2 + 144^2 = 40985$ و $144^2 + 145^2 = 41551$ و $145^2 + 146^2 = 42121$ و $146^2 + 147^2 = 42695$ و $147^2 + 148^2 = 43273$ و $148^2 + 149^2 = 43855$ و $149^2 + 150^2 = 44441$ و $150^2 + 151^2 = 45031$ و $151^2 + 152^2 = 45625$ و $152^2 + 153^2 = 46223$ و $153^2 + 154^2 = 46825$ و $154^2 + 155^2 = 47431$ و $155^2 + 156^2 = 48041$ و $156^2 + 157^2 = 48655$ و $157^2 + 158^2 = 49273$ و $158^2 + 159^2 = 49895$ و $159^2 + 160^2 = 50521$ و $160^2 + 161^2 = 51151$ و $161^2 + 162^2 = 51785$ و $162^2 + 163^2 = 52423$ و $163^2 + 164^2 = 53065$ و $164^2 + 165^2 = 53711$ و $165^2 + 166^2 = 54361$ و $166^2 + 167^2 = 55015$ و $167^2 + 168^2 = 55673$ و $168^2 + 169^2 = 56335$ و $169^2 + 170^2 = 57001$ و $170^2 + 171^2 = 57671$ و

نتیجہ اُن ۲ = ۱ ، ۱ = ۲

دوال مثلثية للزوايا الحادة تتساوى قيمتها عندما تكون قيم المتغير المستقل متتامة ، وهى دالتا الجيب وجيب التمام ، ودالتا الظل وظل التمام ، ودالتا القاطع وقاطع التمام .

التماسك **cohesion**
صفة تعبر عن تجاذب جزيئات المادة ومقاومتها لأى مؤثر يعمل على تفريقها .

مباراة توافق قطع النقود المعدنية
coin - matching game

مباراة بين شخصين يرمى فيها كل من اللاعبين قطعة معدنية لها نفس القيمة ، فإذا أظهرت القطعتان لدى سقوطهما نفس الوجه (كلاهما صورة أو كلاهما كتابة) كسب اللاعب الأول وإذا أظهرتا وجهين مختلفين كسب اللاعب الثانى ، وهذه المباراة صفرية المجموع .

(انظر : مباراة صفرية المجموع .
zero - sum game)

أشكال منطبقة

coincident configurations

شكلان يمكن أن تقع كل نقطة من نقاط

العامل المرافق لعنصر فى محدد

cofactor of an element of a determinant
= signed minor of an element of a determinant

يحدد العنصر مأخوذاً بإشارة موجبة أو سالبة حسبها كان مجموع رقمى الموضع للصف والعمود المحذوفين من المحدد الأسمى عدداً زوجياً أو فردياً . فمثلاً العامل المرافق للعنصر a_{ij} فى المحدد ،

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ هو } - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

(انظر : محدد عنصر فى محدد
minor of an element of a determinant)

العامل المرافق لعنصر فى مصفوفة

cofactor of an element of a matrix

العامل المرافق لنفس العنصر فى محدد مصفوفة مربعة ، ويعرف فقط للمصفوفات المربعة .

دوال مثلثية مترافقة

cofunctions, trigonometric

collating sequence تتابع ضام
ترتيب حروف فرع ما بشكل يساعد على
استخدامها في فرز وترتيب البيانات ، ومعظم
نظم التتابع تصمم بحيث تأخذ الأرقام من صفر
إلى ٩ والحروف من أ إلى ي نفس قيم التتابع
الطبيعية المعروفة .

collation ضم
ضم بطاقتين أو أكثر موجودة في مجموعتين من
البطاقات لتكوين مجموعة فرعية متكاملة ، ويتم
الضم طبقاً لدليل موجود في مجال معين ،
وبالإضافة إلى ذلك تبقى المجموعات مرتبة طبقاً
لدليل آخر .

collecting terms تجميع الحدود
حصر الحدود داخل أقواس لترتيبها (مثلاً
حسب القوى الصاعدة أو النازلة للمتغير
الرئيسي) أو جمع الحدود المتماثلة . فمثلاً
لتجميع الحدود في المقدار
 $٢ + ١س + ٢س + ٢س + ٢س + ٢س + ٢س$
تكتب على الصورة :
 $٢ + ٢س + (١ + ٢)س + (٢ + ٢)س + (٢ + ٢)س + (٢ + ٢)س + (٢ + ٢)س$
ولتجميع الحدود في المقدار
 $٢س + ٣س - ٣س + ٣س$
تكتب على الصورة :

أحدهما على الآخر ، أى يمكن رسم
أحدهما فوق الآخر بتساو قياسى .
فالخطان (أو المنحنيان أو السطحان) اللذان
لهما نفس المعادلة يكونان متطابقين .
والمحل الهندسى لمعادلة على الصورة
[د (س ، ص)] = ٢ صفرأ يمثل شكلين
متطابقين .

الزاوية المتممة لزاوية خط العرض لنقطة
colatitude of a point
الزاوية التى تساوى زاوية خط العرض
لنقطة مطروحة من ٩٠° .

(انظر : إحداثيات قطبية كروية
coordinates, spherical polar)

collateral security ضمان مضاحب
أصول مادية تودع لضمان إتمام تنفيذ
عقد ما وترد لدى إتمام تنفيذ هذا
العقد .

سندات ائتمان تكميلية

collateral trust bonds
(انظر : bonds, collateral trust) .

حيث (س_١ ، ص_١) ، (س_٢ ، ص_٢) ، (س_٣ ، ص_٣) إحداثيات النقاط . وتكون ثلاث نقط في الفراغ متسامية إذا ، وفقط إذا كانت نسب الاتجاه للخطوط المستقيمة المارة بكل زوج منها متناسبة .

collineation تسامت
تحويل للمستوى أو الفراغ ينقل النقاط فوق نقط ، الخطوط المستقيمة فوق خطوط مستقيمة ، المستويات فوق مستويات .

تحويل تسامتي
collineatory transformation

١ - تحويل خطي غير شاذ من الفراغ الإقليدي الذي بعده (ن-١) على الصورة

$$ص_r = \frac{ن}{١=م} م_r س_r م ،$$

$$م = ١ ، ٢ ، ٣ ، \dots ، ن$$

بدلالة الإحداثيات المتجانسة . وهذا التحويل ينقل النقاط المتسامية إلى نقط متسامية أخرى

٢ - تحويل على الصورة $ص = م^{-١} م$

لمصفوفة $م$ بمصفوفة غير شاذة $م^{-١}$ ويقال للمصفوفتين $م$ ، $م^{-١}$ أنهما متماثلتان وأن كلاً منهما تحويل للأخرى . المفهومان ١ ، ٢ مرتبطان .

$$(٢س - س) + (٣ص + ص) = س + ٤ص .$$

collinear متسامت

١ - صفة لما يقع على استقامة واحدة .

٢ - صفة لما يشترك في خط مستقيم واحد .

collinear planes مستويات متسامية

= مستويات متحدة المحور

= coaxial planes

مستويات تشترك في خط مستقيم واحد .

وكل ثلاثة مستويات تكون متسامية أو متوازية إذا كانت معادلة أى منها ارتباطاً خطياً لمعادلتى المستويين الآخرين .

collinear points نقط متسامية

= نقط على استقامة واحدة

نقط تقع على نفس الخط المستقيم . وتكون

النقطتان متساميتين مع نقطة الأصل إذا ، وفقط

إذا ، كانت إحداثياتهما الديكارتية المناظرة متناسبة ،

وتكون ثلاث نقط في المستوى متسامية إذا كان :

$$= \text{صفرأ} \cdot \begin{vmatrix} ١ & ص_١ & س_١ \\ ١ & ص_٢ & س_٢ \\ ١ & ص_٣ & س_٣ \end{vmatrix}$$

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>المشاركة عند القلعة ، وأن القلعة تُحتل حينئذ بالجانب الذى لديه ناجون . ويقاس العائد النهائى بالعدد الكلى من الناجين عند القلاع جميعها .</p>	<p>تصادم collision تقابل جسم متحرك ٢ بآخر ب (ثابت أو متحرك) فيؤثر ٢ على ب عند لحظة تماسهما بقوة تساوى وتضاد القوة التى يؤثر بها ب على ٢ .</p>
<p>عمود column ١ - منظومة رأسية من الحدود تستخدم فى عمليتى الجمع والطرح وفى المحددات والمصفوفات . ٢ - موضع الحرف أو الرقم المسجل فى الحاسب فى حالة تسجيل الحروف بصورة مرتبطة ومتباعدة تظهر فيها الحروف على شكل أعمدة متراصة بعضها بجوار بعض كما فى البطاقات المثقبة .</p>	<p>تصادم مرن collision, elastic تصادم بين جسمين لا ينتج عنه تغير فى مجموع كميتى حركتيهما . مرافق لوغاريتم عدد cologarithm of a number لوغاريتم مقلوب العدد ، أى سالب لوغاريتم العدد مع كتابة الكسر العشرى موجباً . ويستخدم فى الحسابات لتجنب التعامل مع سالب الجزء العشرى .</p>
<p>ترتيب عمودى column arrangement ترتيب الحدود رأسياً فى عمليتى الجمع والطرح وترتيب حدود المصفوفة أو المحدد فى صفوف وأعمدة .</p>	<p>مباراة " كولونيل بلوتو " Colonel Blotto game مسألة فى نظرية المباريات تدرس تقسيم القوى المهاجمة والمدافعة عند كل قلعة بين عدد من القلاع مع افتراض أن كل جانب يخسر عدداً من الرجال مساوياً لعدد ما فى القوة الصغرى</p>
<p>عمود فى محدد column in a determinant (انظر : محدد determinant) .</p>	

يساوى عدد تبديل n من العناصر مأخوذة راء
راء في كل مرة مقسومة على عدد تبديل r من
الأشياء مأخوذة راء راء في كل مرة ، أى

$$\frac{n!}{r!} = \frac{n!}{r!} = \frac{n!}{r!}$$

ويرمز لها بأحد الرمزین : n و r أو (n, r)

ارتباط خطى محدب

combination, convex linear

الارتباط الخطى المحدب للكميات
 $s, r = 1, 2, \dots, n$ ، تعبير على
الصورة :

محدب $\frac{n}{r} = s$ ، حيث $\frac{n}{r} = s$ ، وكل r
عدد حقيقى غير سالب .

تشكيل خطى combination, linear

التشكيل الخطى لكميتين أو أكثر هو مجموع
هذه الكميات بعد ضربها في ثوابت على
ألا تساوى جميع هذه الثوابت الصفر .
والتشكيل الخطى للمعادلتين $d(s, v) =$
صفرأ ، $r(s, v) =$ صفرأ هو المعادلة
 $d(s, v) + r(s, v) =$ صفرأ

تحويل توازى (كومبسكيورى) لمنحنى

combescure transformation of a curve

راسم أحادى متصل لمنحنى في الفراغ فوق
منحنى آخر بحيث تكون المماسات عند النقط
المتناظرة متوازية . وبالتالي فإن الأعمدة
الأساسية وثنائيات التعامد على الترتيب تتوازي
أيضاً عند النقط المتناظرة .

تحويل حافظ لتعامد ثلاثية سطوح (تحويل

كومبسكيورى)

combescure transformation of a triply

orthogonal system of surfaces

راسم أحادى متصل للفراغ الإقليدى الثلاثى
البعد فوق نفسه بحيث تكون الأعمدة لعناصر
مجموعة ثلاثية من السطوح المتعامدة موازية
لأعمدة عناصر مجموعة أخرى عند النقط
المتناظرة بالتحويل .

توفيقه combination

أى اختيار لعنصر أو أكثر من عناصر فئة من
الأشياء دون اعتبار للترتيب . وعدد التوافيق
لأشياء عددها n مأخوذة راء راء في كل مرة هو
عدد الفئات الجزئية التى يحوى كل منها عنصراً
من عناصر فئة تحوى n من العناصر . وهذا

مجمع اللغة العربية - القاهرة

كميات لها مقياس مشترك ، أى أنه يوجد مقياس تحتويه كل من هذه الكميات عدداً صحيحاً من المرات . فالعددان ٥ ، ٧ قابلان للقياس ، والمقياس المشترك بينهما ١ . والكميتان $\sqrt[3]{٢}$ ، $\sqrt[3]{٣}$ قابلان للقياس والمقياس المشترك بينهما $\sqrt[3]{٦}$ أما ٥ ، $\sqrt[3]{٦}$ فليسا قابلين للقياس .

بنك تجارى commercial bank
بنك تتضمن أعماله الدفع والسحب بشيكات .

حوالة تجارية commercial draft
حوالة من مؤسسة إلى أخرى لضمان تسوية مديونية .

ورقة تجارية commercial paper
ورقة صالحة للتداول تستخدم فى التعاملات التجارية ، مثل الحوالات ، الأوراق النقدية ، والشيكات المظهرة (endorsed) .

السنة التجارية commercial year
مدة قدرها ٣٦٠ يوماً تستخدم عند حساب الأرباح البسيطة .

حيث ٢ ، ب ثابتان لا ينعدمان آنياً .
والرسم البياني للتشكيل الخطى لأى معادلتين يمر بنقط تقاطع المنحنيين الممثلين للمعادلتين ولا يقطع أى منهما فى أى نقطة أخرى .

التحليل التوافيقى
combinational (combinatorial) analysis

موضوع يعنى بدراسة طرق الاختيار سواء أخذ الترتيب بعين الاعتبار أم لم يؤخذ .

الطوبولوجى التوافيقى
combinatorial topology

فرع الطوبولوجى الذى يعنى بدراسة الصيغ الهندسية وذلك بتحليلها إلى الأشكال الهندسية الأبسط (تبسيطات) التى يتجاوز كل منها بأسلوب منتظم .

أمر command
جزء من تعليمات البرنامج يحدد للحاسب العملية المطلوب تنفيذها .

كميات متقايسة
commensurable quantities

<p>القاسم المشترك الأعظم (ق . م . ق) common divisor, greatest (G. C. D) القاسم المشترك الأعظم لعددتين أو أكثر هو أكبر عدد يكون قاسماً مشتركاً لهذه الأعداد ، فمثلاً القاسم المشترك الأعظم للأعداد ١٥ ، ٣٠ ، ٤٥ هو ١٥ .</p>	<p>المقام المشترك الأصغر (البسيط) (م . م . ق) common denominator, least (lowest (L.C.D.)) أصغر مضاعف مشترك بين مقامات عدة كسور . فمثلاً ، المقام المشترك الأصغر للكسور $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{7}$ هو ٤٢ لأنه أصغر عدد تقسمه المقامات ٢ ، ٣ ، ٧ بدون باقي .</p>
<p>كسر اعتيادي common fraction = كسر بسيط = simple fraction كسر بسطه ومقامه عددان صحيحان .</p>	<p>أساس المتوالية الحسابية common difference in an arithmetic progression الفرق بين أى حد والحد السابق له فى المتوالية الحسابية .</p>
<p>لغة عامة common language لغة من لغات البرامج يمكن استخدامها لإعداد البرامج التى يمكن ترجمتها وتشغيلها على عدد من نظم الحاسبات المختلفة . وتعتبر لغات الجول Algol ، فورتران Fortran ، كوبول Cobol أمثلة على اللغات العامة .</p>	<p>(انظر : المتوالية الحسابية) arithmetic progression .</p>
<p>اللوغاريتمات الاعتيادية common logarithms اللوغاريتمات التى أساسها العدد ١٠ . (انظر : اللوغاريتم logarithm) .</p>	<p>قاسم مشترك (ق . م) common divisor (C. D) = common measure القاسم المشترك لعددتين أو أكثر هو عدد يكون عاملاً لكل من الأعداد الأصلية . فمثلاً كل من ٣ ، ٥ ، ١٥ قاسم مشترك للأعداد ١٥ ، ٣٠ ، ٤٥ .</p>

<p>common side ضلع مشترك</p> <p>إذا اشترك مضلعان أو أكثر في ضلع قيل أن هذا الضلع ضلع مشترك بين هذه المضلعات .</p>	<p>common multiple مضاعف مشترك</p> <p>كمية تكون مضاعفاً لكل من كميتين أو أكثر ، أى أن ٢ يكون مضاعفاً مشتركاً للكميتين ٦ ، ٩ إذا كان ١٨ مضاعفاً للكمية ٦ ومضاعفاً للكمية ٩ ، وهذا يعنى أن كلاً من ٦ ، ٩ يكون عاملاً من عوامل ١٨ .</p>
<p>common stock أسهم مشتركة</p> <p>أسهم تحدد الأرباح المدفوعة عنها بالأرباح الصافية للمنشأة بعد دفع كل أنواع التكاليف الأخرى بما في ذلك الأرباح على الأسهم المميزة .</p>	<p>فمثلاً العدد ٣٥ مضاعف مشترك للعددين ٥ ، ٧ ، كما أن المقدار $٣س - ٢س - ١س$ مضاعف مشترك للمقدارين $٣س + ١س$ ، $١س - ١$.</p>
<p>مماس مشترك لدائرتين</p> <p>common tangent to two circles</p> <p>مماس يمس كلاً من الدائرتين .</p>	<p>المضاعف المشترك الأصغر (م . م . ا)</p> <p>common multiple, least (L. C. M)</p> <p>المضاعف المشترك الأصغر لكميتين أو أكثر هو أصغر مضاعف مشترك لهما . ففي الحساب المضاعف المشترك الأصغر لعددين ٦ ، ٩ هو العدد ١٨ بحيث أن ٦ يقسم ١٨ ، ٩ يقسم ١٨ ، وإذا كان ٥ مضاعفاً مشتركاً للعددين ٦ ، ٩ فإن ١٨ يقسم ٥ أيضاً فمثلاً ١٢ هو المضاعف المشترك الأصغر للأعداد ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ .</p> <p>وفي الجبر تكون كثيرة الحدود ٥ مضاعفاً مشتركاً أصغر لكثيرتي الحدود ٥ ، ٦ إذا كانت ٥ مضاعفاً مشتركاً لهما وتقسم أى مضاعف مشترك آخر لهما . فمثلاً المضاعف المشترك الأصغر للمقدارين $١س - ٢س$ ، $١س + ٢س$ هو $(١س - ٢س)(١س + ٢س)$.</p>
<p>رموز التعويضات في التأمين على الحياة</p> <p>commutation symbols in life insurance</p> <p>رموز تدل على طبيعة الأعداد في أعمدة جدول التعويضات . مثال ذلك الرمز ١ للذات يظهران في جداول التعويضات .</p> <p>(انظر : جداول التعويضات)</p> <p>commutation tables</p>	

<p>قانون الإبدال في الضرب commutative law of multiplication قانون ينص على أن الترتيب الذي تتم به عملية الضرب لا يؤثر على ناتج الضرب : $a \times b = b \times a$ لكل عددين a, b، ويقال عندئذ أن الخاصية الإبدالية متوفرة في عملية الضرب.</p> <p>عملية إبدالية · commutative operation تكون العملية الثنائية $*$ على الفئة S إبدالية إذا كان $a * b = b * a$ لكل $a, b \in S$، فمثلاً عملية الجمع على فئة الأعداد الحقيقية عملية إبدالية : $a + b = b + a$، أما عملية الطرح على الأعداد الحقيقية فهي ليست إبدالية حيث أن $a - b \neq b - a$</p> <p>خاصية إبدالية commutative property خاصية إذا توافرت في نظام رياضي فإن ناتج تطبيقها على عنصرين من عناصر النظام لا يتأثر بإبدال هذين العنصرين .</p> <p>خاصية الإبدال لعملية الجمع commutative property of addition (انظر : addition, commutative property of)</p>	<p>جداول (أعمدة) تأمين commutation tables (columns) جداول يحسب منها قيم أنواع معينة من التأمينات بسرعة . مثال ذلك جدول التعويضات الذي يتضمن قيم $d_s, d_{s+1}, \dots, d_{s+n}$ لجميع الأعمار في جداول الوفيات ، حيث d_s عدد الأشخاص الذين يعيشون حتى سن s في سنة ما مضروباً في القيمة الحالية لمبلغ من المال تدفع عنه فوائد محددة لمدة s من السنين ، d_{s+1} هو مجموع المتسلسلة $(d_s + d_{s+1} + \dots + d_{s+n})$ حتى نهاية الجدول .</p> <p>زمرة إبدالية commutative group = زمرة أبيلية = Abelian group (انظر : Abelian group) .</p>
<p>قانون الإبدال في الجمع commutative law of addition قانون ينص على أن الترتيب الذي تتم فيه عملية الجمع لا يؤثر على المجموع : $a + b = b + a$ لكل عددين a, b، ويقال عندئذ أن الخاصية الإبدالية متوفرة في عملية الجمع .</p>	<p>قانون الإبدال في الجمع commutative law of addition قانون ينص على أن الترتيب الذي تتم فيه عملية الجمع لا يؤثر على المجموع : $a + b = b + a$ لكل عددين a, b، ويقال عندئذ أن الخاصية الإبدالية متوفرة في عملية الجمع .</p>

<p>التزامات متبادلة</p> <p>commuting obligations</p> <p>عملية استبدال مجموعة من الالتزامات لتسديد مبلغ معين في تواريخ معينة بمجموعة أخرى من الالتزامات طبقاً لقواعد تسديد جديدة ،. ويسمى التاريخ المشترك الذى تتكافأ عنده الالتزامات في الحالتين التاريخ البورى . focal date</p>	<p>خاصية الإبدال لعملية الضرب</p> <p>commutative property of multiplication</p> <p>خاصية تعنى أن الترتيب الذى يضرب به عددان لا يؤثر على الناتج أى $a \times b = b \times a$ لكل a, b.</p> <p>نظام إبدالى</p> <p>commutative system</p> <p>= نظام أبلى</p> <p>=abelian system</p> <p>أى نظام عملياته الثنائية إبدالية .</p>
<p>فئة مكتنزة</p> <p>compact set</p> <p>١ - فئة تحتوى على عدد محدد من العناصر .</p> <p>أو ٢ - فئة تحتوى على عدد لا نهائى من العناصر وكل فئة لا نهائية جزئية منها تحتوى على نقطة تراكم واحدة على الأقل من نقط تراكم الفئة .</p> <p>أو ٣ - فئة تحتوى كل متتابعة من عناصرها على متتابعة جزئية تقاربية نهايتها عنصر من عناصر الفئة ، وتسمى هذه الفئة أيضاً فئة مكتنزة تتابعياً</p> <p>sequentially compact أو فئة مكتنزة قابلة للعد countably compact وتكون الفئة الجزئية المكتنزة من فراغ " هاوسدورف " الطوبولوجى مغلقة ، ولكن ليس من الضروري أن تكون الفئة المغلقة مكتنزة .</p>	<p>عاكس عنصرين من زمرة</p> <p>commutator of elements of a group</p> <p>عاكس العنصرين a, b من عناصر زمرة هو العنصر $a^{-1}b^{-1}ab$ ، أو العنصر $ab^{-1}ba^{-1}$ حيث $ab^{-1}ba^{-1} = a^{-1}b^{-1}ab$. الزمرة التى عناصرها a_1, a_2, \dots, a_n حيث a_i عاكس زوج من العناصر تسمى الزمرة الجزئية العاكسة commutator subgroup والزمرة الجزئية العاكسة لزمرة أبلية تحتوى فقط على العنصر المحايد . ويقال لزمرة أنها مثالية (perfect) إذا كانت مطابقة لزمرتها الجزئية العاكسة . والزمرة الجزئية العاكسة تكون زمرة جزئية لا متغيرة (invariant) ، وزمرة العوامل (factor group) الناشئة معها تكون أبلية .</p>

compactification لفراغ "تيخونوف"
Tychonoff space هو مغلقة صورة γ في
الفراغ I^ω ، حيث I هو حاصل الضرب
الديكارتي للفترة المغلقة I التي طولها الوحدة
مأخوذة ω من المرات ، ω هو العدد الكاردينالي
لعائلة كل الدوال المتصلة من γ إلى I (صورة
نقطة $s \in \gamma$ في I^ω هو عنصر I الذي مركبته
بالدالة d هي $d(s)$ لكل دالة d من دوال عائلة
الدوال المتصلة) . وتكنيزي «ستون وتشيك»
هو تكنيزي تعظيمي maximal ويكون الفراغ
 I^ω بأكمله مكتنزا .

compactum مكتنز
فراغ طوبولوجي مكتنز ومقياسي metrizable
ومن أمثلته الفترات المغلقة والكترات
المغلقة (مع داخليتها أو بدونها) ، والمضلعات
المغلقة .

دالتان قابلتان للمقارنة

comparable functions

دالتان $d(s)$ ، $r(s)$ قيم كل منهما
حقيقية ، ولهما مجال تعريف مشترك M ،
حيث تحققان إما $d(s) \geq r(s)$ لكل
 $s \in M$ أو $d(s) \leq r(s)$ لكل $s \in M$.

فراغ مكتنز محلياً

compact space, locally

فراغ كل نقطة من نقطه لها جوار مغلقته
مكتنزة . فمثلاً المجموعة

(صفر ، ١ ، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{3}$ ، ...) مكتنزة ، بينما

مجموعة الأعداد الحقيقية مكتنزة محلياً ، ولكنها
ليست مكتنزة ، لأن المتابعة ١ ، ٢ ، ٣ ،
... لا تحتوى على متتابعة جزئية تقاربية .

compactification تكنيز

تكنيز الفراغ الطوبولوجي γ هو فراغ
طوبولوجي مكتنز γ^* يحوى الفراغ γ . فمثلاً
المستوى المركب هو تكنيز للمستوى الإقليدي
الذي نحصل عليه بإضافة نقطة وحيدة (يرمز لها
عادة بالرمز ∞) جواراتها هي الفئات التي تحوى
 ∞ ومكملة فئة جزئية محدودة ومغلقة (أى
مكتنزة) من المستوى . وبالمثل ، أى فراغ
هاوسدورف γ مكتنز محلياً locally compact ،
يكون له تكنيز وحيد (النقطة one point
compactification) (هو أيضاً فراغ هاوسدورف)
يحصل عليه بإضافة نقطة وحيدة ، يمكن
أن يرمز لها بالرمز ∞ ، جواراتها فئات
تحوى ∞ ومكملة فئة جزئية مكتنزة من γ .
وتكنيزي- «ستون وتشيك» Stone - Cech

<p>compasses فرجار</p> <p>أداة لرسم الدوائر وقياس الأبعاد بين النقط .</p> <p>معادلات الملاءمة (المرونة)</p>	<p>comparison date تاريخ المقارنة</p> <p>تاريخ معين تتكافأ عنده مجموعتان من الدفعات .</p> <p>(انظر : معادلة الدفعات)</p> <p>equation of payments</p>
<p>compatibility equations (elasticity)</p> <p>معادلات تفاضلية تربط بين مركبات ممتد الانفعال ويتلو منها إمكان حالة الانفعال في جسم متصل .</p>	<p>اختبار المقارنة لثقارب متسلسلة لا نهائية</p> <p>comparison test for convergence of an infinite series</p>
<p>البندول المُعادل</p> <p>compensated pendulum</p> <p>بندول لا تتغير المسافة بين نقطة تعليقه ومركز ثقله بتغير درجة الحرارة ، ومن ثم لا يتغير زمن ذبذبه بتغير درجة الحرارة .</p>	<p>إذا كانت القيمة المطلقة لكل حد ، بعد حد معين مختار ، من متسلسلة أقل من أو تساوى قيمة الحد المناظر من متسلسلة تقاربية حدودها موجبة ، فإن المتسلسلة تكون تقاربية (فى الواقع تكون مطلقة التقارب) . وإذا كان كل حد من المتسلسلة أكبر من أو يساوى الحد المناظر من متسلسلة تباعدية حدودها موجبة فإن المتسلسلة تكون تباعدية .</p>
<p>ترجمة (لبرامج الحاسب)</p> <p>compilation (for computer programs)</p> <p>عملية ترجمة برنامج مكتوب بلغة من لغات البرمجة إلى لغة الحاسب أو إلى لغة برمجة أخرى أقل مستوى .</p>	<p>compass بوصلة</p> <p>إبرة مغناطيسية جرة الحركة حول محور عمودى على قرص موضح عليه الاتجاهات وتشير الإبرة دائماً إلى اتجاه خط الزوال المغنطيسى .</p>
<p>compiler برنامج مُترجم</p>	

الدالة المتممة في حل معادلة تفاضلية
complementary function of a differential equation

الدالة المتممة في حل معادلة تفاضلية من الرتبة النونية هي مجموع ن من الحلول المستقلة خطياً للمعادلة التفاضلية المتجانسة المناظرة لهذه المعادلة بعد ضرب كل من هذه الحلول في وسيط اختياري .

المحدد المتمم لعنصر (في المحددات)
complementary minor of an element (in determinants)

المحدد الذي يحصل عليه بحذف الصف والعمود اللذين يقع العنصر فيهما .
(انظر : محدد عنصر في محدد)
minor of an element in a determinant

سطح متمم لسطح ما
complementary to a given surface, surface

يوجد لكل سطح س عدد لا نهائي من السطوح المتوازية يكون س سطحاً ذا مركز بالنسبة لكل منها . والسطح المتمم لسطح س هو السطح الآخر الذي يكون مركزاً

برنامج خاص يقوم بعملية الترجمة من إحدى لغات البرمجة إلى لغة برمجة أخرى أو إلى لغة الآلة .

مكملة فئة
complement of a set
فئة عناصرها لا تنتمي للفئة المعطاة س ، وإنما تنتمي للفئة الشاملة أولفئة تحوى س ، ويرمز لمكملة الفئة س بالرمز له (س) .

فمثلاً مكملة فئة الأعداد الموجبة بالنسبة لفراغ جميع الأعداد الحقيقية هي الفئة التي تحوى كل الأعداد السالبة والصفر .

تسارع " كوريوليس "
complementary acceleration

= acceleration of Coriolis

(انظر : acceleration of Coriolis) .

زاويتان متتامتان
complementary angles

(انظر : angles, complementary) .

متحققة لجميع الحالات السابقة لحالة معينة فإنها تكون متحققة أيضاً لهذه الحالة .
فمثلاً لإثبات أن :

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

نلاحظ أنه عندما $n=1$ فإن كلا من الطرفين يساوى ١ ، وبجمع $n+1$ لكل من الطرفين نحصل على :

$$1 + 2 + 3 + \dots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$$

$$(n+2) \left(\frac{n+1}{2} \right) =$$

أى أنه إذا كانت النظرية صحيحة لعدد n من الحدود تكون صحيحة لعدد $(n+1)$ من الحدود .

من هذا ينتج أن التقرير المعطى صحيح لجميع قيم n .

تدريج تام للأعداد

complete number scale

تدريج ينشأ باختيار نقطة «و» على خط مستقيم لتناظر الصفر وترقيم نقط التقسيم على يمين النقطة «و» بالأعداد الصحيحة الموجبة ١ ، ٢ ، ٣ ، ... وعلى يسارها بالأعداد الصحيحة السالبة -١ ، -٢ ، -٣ ، ...

لنفس العائلة من السطوح المتوازية .
;

دوال مثلثية مترافقة

complementary trigonometric functions

(انظر : cofunctions, trigonometric) .

السنية العمرية التامة

complete annuity

(انظر : annuity, complete) .

حقل كامل **complete field**

حقل مرتب ordered field كل فئة جزئية غير خالية منه يكون لها حد أعلى سفلى . إذا كان لها حد أعلى . مثال ذلك حقل الأعداد الحقيقية .

الاستنتاج الكامل **complete induction**
= الاستنتاج الرياضى

= mathematical induction

أسلوب لإثبات قانون أو نظرية ببيان أنها متحققة في الحالة الأولى ثم تبيان أنه إذا كانت

<p>فيكون ضعيف التهامية وليس عاكساً إذا كان $\ s\ = \sup_{r=1}^{\infty} s_r$ محدوداً .</p>	<p>فراغ تام complete space فراغ مقياسى تكون كل متتابعة من متتابعات "كوشى" فيه تقاربية وتقرب من نقطة من نقط الفراغ . فمثلاً فراغ كل الأعداد الحقيقية تام وكذلك فراغ كل الأعداد المركبة تام .</p>
<p>نظام تام من الدوال complete system of functions الشرط الكافى واللازم لكى يكون نظام من دوال متعامدة معيرة متصلة d_1, d_2, \dots تاماً هو أن يكون</p>	<p>فراغ تام طوبولوجياً complete space, topologically فراغ طوبولوجى متشاكل طوبولوجياً homeomorphic مع فراغ مقياسى تام . فمثلاً الفئة الجزئية من فراغ مقياسى تام تكون تامة طوبولوجياً إذا ، وفقط إذا ، كانت هذه الفئة من نوع "بوريل" . (انظر : فئة "بوريل" Borel set) .</p>
<p>$(d, r) = \sup_{n=1}^{\infty} (d_n, r_n)$ لكل دالة متصلة r على الفترة (a, b) ، أو أن يؤول $\sup_{n=1}^{\infty} (d_n, r_n)$ فى المتوسط من المرتبة الثانية إلى $r(s)$ ، حيث $(d, r) = \sup_{s=1}^{\infty} d(s) r(s)$ ، حيث ويسمى الضرب الداخلى للدالتين d, r . ومن أمثلة أنظمة الدوال المتعامدة المعيرة المتصلة التامة الدوال :</p>	<p>فراغ ضعيف التهامية complete space, weakly فراغ خطى معير كل متتابعة ضعيفة التقارب من عناصره تقرب تقارباً ضعيفاً من عنصر من عناصر الفراغ . وكل فراغ خطى معير ضعيف التهامية يكون تاماً ، ويكون فراغ "بناخ" وكل فراغ "بناخ" عاكس ضعيف التهامية . أما الفراغ ل للمتتابعات $s = (s_1, s_2, \dots)$</p>
<p>إتمام المربع completing the square</p>	

كسر يكون بسطه أو مقامه أو كلاهما كسراً .

تكامل مركب **complex integration**
= تكامل كفاف **contour integral**

لتكن د (ع) دالة مداها فئة جزئية من حقل الأعداد المركبة ، م منحني يصل بين نقطتين م ، له في المستوى المركب (أو على سطح ريمان) ، ولنفرض أن

ع₀ = م ، ع₁ ، ع₂ ، ... ، ع_n = له نقط اختيارية عددها (ن + ١) على المنحني م تقسمه إلى ن من القطع المتتالية ، وأن م نقطة على القطعة المغلقة من المنحني م التي تصل بين ع_{n-١} ، ع_n وأن δ أكبر عدد من بين الأعداد

التكامل المركب $\int_{\gamma} f(z) dz$ هو نهاية

المجموع $\sum_{r=1}^n f(\xi_r) (y_r - y_{r-1})$

عندما تؤول δ إلى الصفر ، إن وجدت هذه النهاية .

وإذا كانت الدالة د متصلة على المنحني م وكان المنحني م محدود الطول (rectifiable) فإن هذا التكامل المركب يكون موجوداً .

طريقة تستخدم عند حل معادلات الدرجة الثانية ، وتتم بتحويل كل حدود المعادلة إلى طرفها الأيمن ، والقسمة على معامل حد الدرجة الثانية ، ثم إضافة مقدار إلى الحد المطلق لجعل الطرف الأيمن مربعاً كاملاً . فمثلاً ، لإتمام المربع للمعادلة $2s^2 + 8s + 1 = 0$ صفرأ تقسم جميع الحدود في الطرف الأيمن للمعادلة على ٢ لنحصل على $s^2 + 4s + \frac{1}{2} = 0$ صفرأ ويضاف $\frac{1}{4}$ إلى طرفي المعادلة فنحصل على $s^2 + 4s + 4 = \frac{7}{2}$ (س + ٢) = ٣,٥

المرافق المركب لمصفوفة

complex conjugate of a matrix

هو المصفوفة التي عناصرها الأعداد المركبة المرافقة للعناصر المناظرة للمصفوفة المعطاة .

فمثلاً : المرافق المركب للمصفوفة

$$\begin{pmatrix} a_{11} + ib_{11} & a_{12} + ib_{12} \\ a_{21} + ib_{21} & a_{22} + ib_{22} \end{pmatrix}$$

هو المصفوفة

$$\begin{pmatrix} a_{11} - ib_{11} & a_{12} - ib_{12} \\ a_{21} - ib_{21} & a_{22} - ib_{22} \end{pmatrix}$$

كسر مركب **complex fraction**

= **compound fraction**

عدد مركب	عدد مركب
complex number, amplitude of a	عدد على الصورة $s + t \cdot i$ ، حيث s, t عددا حقيقيان ، $i^2 = -1$. ويسمى العدد المركب عدداً تخيلياً
= complex number, argument of a	imaginary number عندما تكون $s = 0$ ، $t \neq 0$ ، وعندها تخيلياً صرفاً pure imaginary عندما تكون $s = 0$ ، $t \neq 0$ ، وعندها حقيقياً عندما تكون $s \neq 0$ ، $t = 0$. ويمكن تمثيل العدد المركب $s + t \cdot i$ في المستوى بالمتجه الذي مركبته s ، t ، أو بالنقطة (s, t) .
(انظر : amplitude of a complex number أو argument of a complex number)	(انظر : مستوى " أرجاند " Argand plane)
مرافق عدد مركب	ويقال لعدد مركب $s + t \cdot i$ ، s, t عددا حقيقيان ، $i^2 = -1$ ، أنهما متساويان إذا ، فقط إذا ، كانا متطابقين . أي إذا ، فقط إذا ، كانت $s = s$ ، $t = t$. وبالتالي يتساوى العددان المركبان إذا ، فقط إذا ، كانا يمثلان نفس المتجه .
complex number, conjugate of a	وإذا كان (r, θ) هما الإحداثيان القطبيان للنقطة $M(s, t)$ فإن $s = r \cos \theta$ ، $t = r \sin \theta$. وبالتالي فإذا كان $s + t \cdot i$ فإن
إذا كان $s + t \cdot i$ فإن العدد المركب المرافق له ، ويرمز له بالرمز $\bar{s} - t \cdot i$. ويلاحظ أن $ s + t \cdot i = \bar{s} - t \cdot i $.	$E = (r \cos \theta + t \sin \theta)$ وهذه الصورة الأخيرة تعرف بالصورة القطبية (polar form) للعدد المركب E .
الجزء التخيلي لعدد مركب	
complex number, imaginary part of a	
الجزء التخيلي لعدد مركب $s + t \cdot i$ هو t ويرمز له بالرمز t .	
مقياس العدد المركب	
complex number, modulus of a	
= القيمة المطلقة للعدد المركب	
= complex number, absolute value of a	

$z_1 = [\cos \theta_1 + j \sin \theta_1]$ ، $z_2 = [\cos \theta_2 + j \sin \theta_2]$ ،
أى أن ناتج ضرب العددين المركبين ، يحصل
عليه بضرب مقياسيهما وجمع سعتهما .

خارج قسمة عددين مركبين

complex numbers, quotient of two

العدد المركب الذى مقياسه خارج قسمة
مقياس المقسوم (البسط) على مقياس القاسم
(المقام) وسعته الفرق بين سعة المقسوم وسعة
القاسم ، أى أن :

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(\cos \theta_1 + j \sin \theta_1)}{(\cos \theta_2 + j \sin \theta_2)}$$

$$= \frac{1}{\cos \theta_2} [\cos (\theta_1 - \theta_2) + j \sin (\theta_1 - \theta_2)]$$

ويمكن حساب خارج القسمة بضرب كل من
المقسوم والقاسم فى مرافق القاسم .

مجموع عددين مركبين

complex numbers, sum of

العدد المركب الذى جزؤه الحقيقى هو مجموع
الجزأين الحقيقيين للعددين وجزؤه التخيلى هو
مجموع الجزأين التخيليين لهما .

$$\text{أى أنه إذا كان } z_1 = \cos \theta_1 + j \sin \theta_1 , z_2 = \cos \theta_2 + j \sin \theta_2$$

طول المتجه الممثل للعدد المركب .
وبالتالى فإن مقياس العدد المركب
 $\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$. إذا
كان العدد المركب معطى على الصورة
القطبية $z = r(\cos \theta + j \sin \theta)$ حيث
 $r \leq 1$ صفر فإن مقياسه يساوى r . ويرمز لمقياس
العدد المركب $|z|$ بالرمز $|z|$.

الصورة القطبية لعدد مركب

complex number, polar form of a

(انظر : عدد مركب complex number) .

حاصل ضرب عددين مركبين

complex numbers, product of

ناتج ضرب العددين المركبين باعتبار كل منهما
كثيرة حدود فى t وملاحظة أن $t^2 = -1$.
أى أن : $(\cos \theta_1 + j \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + j \sin \theta_2) =$
 $(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + j(\cos \theta_1 \sin \theta_2 + \sin \theta_1 \cos \theta_2)$
أيضاً : $[\cos \theta_1 + j \sin \theta_1] [\cos \theta_2 + j \sin \theta_2] =$
 $[\cos (\theta_1 + \theta_2) + j \sin (\theta_1 + \theta_2)]$
 $= \cos (\theta_1 + \theta_2) + j \sin (\theta_1 + \theta_2)$
 $= [\cos (\theta_1 + \theta_2) + j \sin (\theta_1 + \theta_2)]$

$$= (s_1, s_2) + (s_1, s_2)$$

$$= (s_1 + s_1, s_2 + s_2)$$

$$= (s_1, s_2) \times (s_1, s_2)$$

$$(s_1, s_2) - (s_1, s_2) = (s_1 - s_1, s_2 - s_2)$$
 هذا النظام تتحقق فيه معظم القوانين الجبرية الأساسية كقوانين المزج والإبدال لعمليتي الجمع والضرب . وهو حقل غير مرتب .

المستوى المركب complex plane
 مستوى الأعداد المركبة ونقطة وحيدة في اللاتجاهية جواراتها خارجية دوائر مركزها نقطة الأصل . والمستوى المركب يكافئ كرة طوبولوجيا .


الجذران المركبان لمعادلة من الدرجة الثانية complex roots of a quadratic equation

إذا كانت a, b, c أعداداً حقيقية ، $a \neq 0$ ، وكان $b^2 - 4ac > 0$ صفر فإن جذرا المعادلة $ax^2 + bx + c = 0$ يكونان مركبين ومترافقين ويساويان

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

حيث $a^2 = 1$

$$(s_1 + s_2) + (s_1 + s_2) = (s_1 + s_1) + (s_2 + s_2)$$
 ومن الناحية الهندسية ، يماثل هذا المجموع مجموع المتجهين المناظرين للعدد المركبين في المستوى كما في الشكل المعطى : إذا كان \vec{OM} يمثل العدد المركب s_1 ، و \vec{ON} يمثل العدد المركب s_2 ، فإن \vec{OP} يمثل العدد المركب $s_1 + s_2$ ، حيث P الرأس الرابع لمتوازي الأضلاع الذى رؤوسه الأخرى النقط O, M, N . أى أن



نظام الأعداد المركبة complex numbers, system of

فئة الأزواج المرتبة (s, s) من الأعداد الحقيقية التى يعتبر فيها الزوجان (s_1, s_2) ، (s_1, s_2) متساويين إذا ، وفقط إذا ، كانا متطابقين ، أى أن $(s_1, s_2) = (s_1, s_2) \Leftrightarrow s_1 = s_1, s_2 = s_2$ ، والتى تعرف عليها عمليتا جمع وضرب كالتالى :

<p>أى فئة جزئية مترابطة أخرى من الفئة المعطاة . والمركبة تكون بالضرورة فئة جزئية مغلقة بالنسبة للفئة المعطاة .</p>	<p>الجذور المركبة لمعادلة complex roots of an equation الأعداد المركبة التى تحقق المعادلة .</p>
<p>مركبة متجه component of a vector أى واحد من متجهين أو أكثر مجموعها يساوى المتجه .</p>	<p>كرة مركبة complex sphere كرة نصف قطرها الوحدة يمثل عليها المستوى المركب بواسطة الإسقاط الاستريوجرافى (stereographic projection) . والمستوى المركب هو عادة المستوى الاستوائى للكرة بالنسبة لقطب الإسقاط أو المستوى المماسى للكرة عند نقطة نهاية القطر المار بقطب الإسقاط .</p>
<p>مركبة المتجه فى اتجاه معين component of a vector in a certain direction مسقط المتجه على خط مستقيم فى الاتجاه المعين ، ويفترض فى هذه الحالة أن للمتجه مركبة أخرى عمودية على الاتجاه المعطى .</p>	<p>وحدة مركبة complex unit عدد مركب مقياسه الوحدة على الصورة $1 + i$ ، يمثل هندسياً بقطعة مستقيمة موجهة من مركز دائرة نصف قطرها الوحدة ومركزها قطب نظام الإحداثيات القطبية إلى نقطة على الدائرة وكل من حاصل ضرب وخارج قسمة وحدتين مركبتين هو وحدة مركبة .</p>
<p>مركبات اتجاه خط مستقيم فى الفراغ components of a line in space, direction = نسب اتجاه خط مستقيم فى الفراغ = direction ratios of a line in space = أعداد اتجاه خط مستقيم فى الفراغ = direction numbers of a line in space أى ثلاثة أعداد ، ليست كلها أصفاراً ،</p>	<p>مركبة فئة من النقط component of a set of points فئة جزئية مترابطة (connected) وغير محتواة فى</p>

فإن مقدارى المركبتين يساويان رجتا هـ ،
رجا هـ على الترتيب حيث ر طول المتجه .

مركبات ممتد الإجهاد

components of the stress tensor

مجموعة من الدوال فى نظرية المرونة
تحدد حالة الإجهاد عند أى نقطة من نقط المادة
المرنة .

مشتقة وتفاضلة دالة محصلة

**composite function, derivative and
differential of a**

(انظر : قاعدة السلسلة chain rule)

دالة محصلة فى متغير واحد .

composite function of one variable

دالة فى متغير واحد هو نفسه دالة فى
متغير ثانٍ . فمثلاً $v = d(e)$ حيث
 $e = m(s)$ ومشتقة هذه الدالة بالنسبة
للمتغير s يمكن الحصول عليها من
العلاقة :

$$\frac{dv}{ds} = \frac{dv}{de} \times \frac{de}{ds}$$

متناسبة مع جيوب تمام اتجاه الخط المستقيم .

إذا كان الخط المستقيم يمر بالنقطتين

(s_1, v_1, e_1) ، (s_2, v_2, e_2)

فإن مركبات اتجاهه تكون متناسبة مع الأعداد

$s_2 - s_1$ ، $v_2 - v_1$ ، $e_2 - e_1$

وتكون جيوب تمام اتجاهه هى

$$\frac{s_2 - s_1}{f} = \frac{v_2 - v_1}{f} = \frac{e_2 - e_1}{f}$$

حيث f هو البعد بين النقطتين ويساوى

$$\sqrt{(s_2 - s_1)^2 + (v_2 - v_1)^2 + (e_2 - e_1)^2}$$

المركبتان الأفقية والرأسية للمتجه

**components of a vector, horizontal
and vertical**

مسقطا المتجه على الأفقى والرأسى . وعادة

يؤخذ اتجاه محور السينات على أنه الاتجاه الأفقى

واتجاه محور الصادات على أنه الاتجاه الرأسى .

مركبتا متجه فى اتجاهين متعامدين

**components of a vector in two
perpendicular directions**

مسقطا المتجه على كل من الاتجاهين . إذا

كان المتجه يميل على أحد الاتجاهين بزاوية هـ

<p>حقيقية . مثل</p> $س^2 - ٢٥ = (س - ٥) (س + ٥)$ <p>التركيب والقسمة في التناسب</p> <p>composition and division in a proportion</p> <p>تحويل من صيغة التناسب إلى صيغة أن مجموع المقدم الأول وتاليه إلى الفرق بين المقدم الأول وتاليه يساوى مجموع المقدم الثانى وتاليه إلى الفرق بين المقدم الثانى وتاليه . أى الانتقال</p> $\frac{س}{٥} = \frac{٢}{ب}$ <p>من</p> $\frac{س + ح}{س - ح} = \frac{ب + ٢}{ب - ٢}$ <p>إلى</p> <p>الرسم البياني بالتحصيل</p> <p>composition, graphing by</p> <p>طريقة للحصول على الرسم البياني لدالة ، وذلك بكتابتها على صورة مجموع لعدة دوال ، ورسم كل من هذه الدوال ، ثم جمع الإحداثيات الصادية المتناظرة . فمثلاً ، منحني الدالة $ص = ٥س - ح$ حاس يمكن الحصول عليه بسهولة أكثر برسم منحني كل من</p>	<p>دالة محصلة في متغيرين</p> <p>composite function of two variables</p> <p>١ - دالة في متغيرين مستقلين كل منهما دالة في متغيرين مستقلين آخرين فمثلاً :</p> <p>ع = د (س ، ص) حيث س = م (ي ، م) ، ص = م (ي ، م) تكون دالة محصلة في ي ، م .</p> <p>٢ - دالة يمكن تحليلها ، أى يمكن التعبير عنها كحاصل ضرب دالتين أو أكثر . مثال ذلك</p> $س^2 - ص^2 = (س - ص) (س + ص)$ <p>الفرض المركب (في الإحصاء)</p> <p>composite hypothesis (in statistics)</p> <p>فرض إحصائى يعين أكثر من قيمة واحدة لإحدى خواص متغير .</p> <p>عدد غير أولي</p> <p>composite number</p> <p>عدد يمكن تحليله ، مثل ٤ ، ٦ ، ١٠ ، على عكس الأعداد التى لا يمكن تحليلها مثل ٣ ، ٥ ، ٧ . ويستخدم هذا المفهوم للأعداد الصحيحة فقط .</p> <p>كمية غير أولية</p> <p>composite quantity</p> <p>كمية جبرية يمكن تحليلها إلى عوامل</p>
---	--

أو من أحداث كل حدثين منها غير متنافيين
non mutually exclusive events

كسر مركب
compound fraction
= complex fraction
(انظر : كسر مركب complex fraction)

الربح المركب
compound interest
الربح الناتج عند إضافة الفائدة عند استحقاقها إلى رأس المال الأصلي عن المدة الباقية . أى أن الربح يحسب على رأس المال الأصلي للفترة الأولى ، وعلى رأس المال الأصلي مضافاً إليه الفائدة من الفترة الأولى للفترة الثانية ، وعلى رأس المال في بداية الفترة الثانية مضافاً إليه الفائدة عن الفترة الثانية للفترة الثالثة وهكذا . فمثلاً إجمالى رأس مال قدره س بربح مركب ٦٪ بعد n من السنين يساوى $(1,06)^n س$.

بندول مركب
compound pendulum
جسم متماسك يتذبذب حول محور أفقى .

الدالتين $ص = هـ$ ، $ص = -$ حاس ثم جمع الإحداثيات الصادية المناظرة لنفس القيم للمتغير $س$ في هذين المنحنيين .

تركيب القوى
composition of forces
عملية إيجاد قوة واحدة تكافىء القوى التى تؤثر على جسم متماسك (جاسىء) .

تحصيل المتجهات
composition of vectors
هو عملية جمع المتجهات . وعادة يستخدم مصطلح « تحصيل المتجهات » عند جمع المتجهات التى تمثل قوى أو سرعات أو تسارعات .


حدث مركب
compound event
١ - حدث يعتمد على احتمال حدوث حدثين مستقلين أو أكثر . مثال ذلك عند إلقاء قطعة نقود مرتين فإن احتمال ظهور الصورة في كل من المرتين يساوى حاصل ضرب الاحتمالين

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \text{ أى } \frac{1}{4}$$

٢ - حدث يتكون من حدثين غير متنافيين ،

<p>الحساب العددي</p> <p>computation, numerical</p> <p>حساب يشتمل على أعداد فقط دون رموز .</p>	<p>معامل المرونة الحجمية</p> <p>compression, modulus of</p> <p>= bulk modulus</p> <p>(انظر : bulk modulus) .</p>
<p>حاسب</p> <p>computer</p> <p>آلة لإجراء العمليات الحسابية العددية . وإذا اقتضت هذه العمليات على تركيبات من عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة تسمى آلة حاسبة calculating machine وذلك لتمييزها عن الحاسبات الإلكترونية electronic computers التي تقوم بعمليات معقدة .</p>	<p>انضغاط بسيط أو أحادي البعد</p> <p>compression, simple or one dimensional</p> <p>التحويلات $s = s$ ، $s = s$ ، $s = s$ له s ، أو $s = s$ له s ، $s = s$ ، حيث له $1 >$ تضغط شكل ما ، في اتجاهات موازية لمحورى الإحداثيات ويقال عندئذ أن الانضغاط وحيد البعد ، ويسمى الثابت له معامل الانفعال .</p> <p>(انظر : انفعال أحادي البعد)</p> <p>(one dimensional strain) .</p>
<p>حاسب تناظري</p> <p>computer, analogue (analog)</p> <p>(انظر : analogue computer) .</p>	<p>عملية الحساب</p> <p>computation = calculation</p> <p>إجراء العمليات الرياضية . يستخدم المصطلح عادة للإشارة إلى العمليات الحسابية أكثر من إشارته إلى العمليات الجبرية . مثال ذلك إيجاد صيغة لحجم كرة نصف قطرها n ، وحساب هذا الحجم عندما تكون $n = 5$ سم ، أو حساب الجذر التربيعي للعدد ٣ .</p>
<p>حاسب إلكترونى رقمى</p> <p>computer, digital</p> <p>حاسب إلكترونى يتعامل مع البيانات غير المتصلة (الأرقام) ويجرى عليها العمليات الحسابية والمنطقية .</p>	

<p>بلغة الحاسب لحل مسألة معينة .</p>	<p>حاسب إلكترونى</p> <p>computer, electronic</p> <p>. جهاز إلكترونى يستقبل البيانات وينفذ عمليات تشغيل معينة عليها ، ويخرج نتائج هذه العمليات بصورة مألوفة . وهو إما حاسب رقمى (digital) وإما حاسب بالقياس (تناظرى) (analog) .</p>
<p>حاسب لغرض خاص</p> <p>computer, special purpose</p> <p>حاسب مصمم لحل مسألة بعينها . ومن أمثله الحاسبات بالقياس التى تقوم بتوجيه المدافع أو التى تنظم خطوات العمل لآلات المصانع .</p>	<p>حاسب عام</p> <p>computer, general purpose</p> <p>حاسب ينفذ مجموعة من العمليات الأساسية (حسابية أو منطقية) وبالتالي يستخدم لحل المسائل فى مجالات متنوعة ، وأغلب الحاسبات الإلكترونية الرقمية هى من هذا النوع .</p>
<p>حاسب متزامن</p> <p>computer, synchronous</p> <p>حاسب تتم فيه العمليات على فترات زمنية تحكمها نبضات كهربائية منتظمة يصدرها مولد داخل الحاسب يسمى الساعة (clock) .</p>	<p>أمر للحاسب الإلكتروني</p> <p>computer instruction</p> <p>أمر للحاسب فى صورة سلسلة من الأرقام الثنائية يستطيع الحاسب ، بعد تفسيرها ، تنفيذ ما يتطلبه هذا الأمر .</p>
<p>نظام حاسب</p> <p>computer system</p> <p>= configuration</p> <p>(انظر : (configuration (in computer) .</p>	<p>برنامج للحاسب</p> <p>computer program</p> <p>مجموعة تعليمات مرتبة ترتيباً معيناً ومكتوبة</p>
<p>كلمة حاسوبية</p> <p>computer word</p> <p>مجموعة من الأرقام الثنائية أو الأحرف تعامل كوحدة وتخزن فى خلية تخزين واحدة .</p>	



منحنى مقعر تجاه نقطة (أو خط)

concave curve toward a point (or line)

يقال لقوس من منحنى إنه مقعر تجاه نقطة ما (أو خط) إذا وقعت كل قطعة من القوس مقطوعة بوتر على جانب الوتر الذى لا تقع فيه النقطة (أو الخط) .

فالدائرة التى يقع مركزها على محور السينات تكون مقعرة تجاهه .

منحنى مقعر لأسفل

concave downward curve

إذا وجد خط مستقيم أفقى يقع المنحنى أعلاه ويكون مقعراً تجاهه فإن المنحنى يكون مقعراً لأسفل ، النصف العلوى للدائرة التى يقع مركزها على محور السينات يكون مقعراً لأسفل .

كثير سطوح مقعر

concave polyhedron

. كثير سطوح غير محدب .

متتابعة مقعرة **concave sequence**

متتابعة من الأعداد a_1, a_2, a_3, \dots

$$\text{بحيث } a_{n+1} \leq \frac{1}{2}(a_n + a_{n+2})$$

منحنى مقعر لأعلى

concave upward curve


إذا وجد خط مستقيم أفقى يقع المنحنى

مضلع مقعر **concave polygon**

شكل مستو له أكثر من ثلاثة أضلاع وواحدة على الأقل من زواياه الداخلية قياسها أكبر من 180° ويكون كثير الأضلاع مقعراً إذا ، وفقط إذا ، وجد خط مستقيم يمر بداخلية الشكل ويقطع أضلاعه فى أربع نقط أو أكثر .

(انظر الشكل) .

$r = p + b$ قاه
 حيث b طول القطعة المستقيمة ، p بعد
 النقطة الثابتة عن الخط المستقيم الثابت .
 ومعادلة هذا المنحنى بدلالة الإحداثيات
 الديكارتية هي :
 $(p - s)^2 = (s^2 + v^2) = b^2$
 وهذا المنحنى تقربى بالنسبة للخط المستقيم
 الثابت (انظر الأشكال) .



conclusion استنتاج
 تقرير يُتَوَصَّل إليه أو يستنتج باستخدام
 مسلمات أو نظريات أو معلومات معطاة
 (فروض) .

conclusion of a theorem نتيجة نظرية
 نتيجة تترتب على منطوق النظرية أو تبرهن
 به .

أسفله ويكون مقعراً تجاهه فإن المنحنى يكون
 مقعراً لأعلى ، النصف السفلى للدائرة التى يقع
 مركزها على محور السينات يكون مقعراً لأعلى .

concentric circles دوائر متحدة المركز
 دوائر تقع فى مستوى واحد ولها نفس المركز .

أشكال متمركزة (متحدة المركز)
concentric figures
 أشكال هندسية مراكزها منطبقة .

منحنى محارى (كونكويد) **conchoid**
 = منحنى " نيكوميديس " المحارى
 = **conchoid of Nicomedes**

المحل الهندسى لإحدى نقطتى نهايتى قطعة
 مستقيمة ثابتة الطول تقع على خط مستقيم يدور
 حول نقطة ثابتة (و) ، بينما تكون نقطة النهاية
 الأخرى للقطعة المستقيمة (م) هى تقاطع هذا
 الخط المستقيم مع خط مستقيم ثابت لا يحوى
 النقطة الثابتة . بالنسبة لنظام إحداثيات قطبية
 (ر ، هـ) القطب فيه هو النقطة الثابتة والمحور
 القطبى عمودى على الخط الثابت ، تكون
 معادلة هذا المنحنى على الصورة :

مجمع اللغة العربية - القاهرة

متلاقية	concurrent	ليصير التقرير صائباً .
صفة للتلاقى فى نقطة واحدة .		
قوى متلاقية	concurrent forces	شرط ضرورى condition, necessary شرط لا يصح تقرير معين الا بتحقيقه وقد يكون هناك أكثر من شرط ضرورى واحد .
مستقيمات متلاقية	concurrent lines	شرط ضرورى وكاف condition, necessary and sufficient شرط يكون ضرورياً وكافياً فى آن واحد . مثال ذلك ، الشرط الضرورى والكافى لكى يكون الشكل الرباعى متوازى أضلاع أن يكون ضلعان متقابلان فيه متساويان فى الطول ومتوازيان . وشرط كافٍ وليس ضرورياً لكى يكون الشكل الرباعى متوازى أضلاع. أن تكون جميع أضلاعه متساوية فى الطول ، وشرط ضرورى وليس كافياً لكى يكون الشكل متوازى أضلاع أن يكون رباعياً .
مستويات متلاقية	concurrent planes	
ثلاثة مستويات أو أكثر بينها نقطة واحدة مشتركة .		
نقطة تكاثف	condensation point	
يقال للنقطة م أنها نقطة تكاثف لفئة سـ إذا كان كل جوار للنقطة م يحوى نقطاً غير قابلة للعد من نقط الفئة سـ.		
شرط	condition	شرط كافٍ condition, sufficient شرط يترتب عليه منطقياً تقرير معين معطى .
فرض رياضى أو حقيقة رياضية كافية لتأكيد صواب تقرير معين أو ما يجب أن يكون صائباً		

قفزة مشروطة conditional jump
(انظر: تفرع مشروط
branch, conditional)

الاحتمال المشروط

conditional probability

احتمال وقوع حدث ما تحت ظروف معلومة تسمى الشرط . فعند زنى حجرى نرد فإن احتمال أن يكون مجموع الرقمين على وجهيهما

يساوى ٥ هو $\frac{4}{36}$ لأن المجموع ٥ يأتى من

الأحداث (١ ، ٤) ، (٢ ، ٣) ، (٣ ، ٢) ، (٤ ، ١) . وهذا احتمال غير مشروط . أما احتمال كون المجموع ٥ إذا علم أن هذا المجموع عدد يقل عن ٧ فهذا احتمال شرطى يحصل عليه هكذا :

ح (المجموع = ٥ | المجموع > ٧)

$$= \frac{\text{ح (المجموع = ٥)}}{\text{ح (٢، ٣، ٤، ٥، ٦)}}$$

$$= \frac{\frac{4}{36}}{\frac{15}{36}} = \frac{4}{15}$$

وبشكل عام

$$\text{ح (٢ \setminus ٣)} = \frac{\text{ح (٢ \cap ٣)}}{\text{ح (٣)}}$$

التقارب الشرطى للمتسلسلات

conditional convergence of series

تكون المتسلسلة اللانهائية شرطية التقارب إذا اعتمد تقاربها على الترتيب الذى تكتب به حدودها .

معادلة شرطية conditional equation

معادلة تكون صحيحة فقط لقيم معينة للكميات غير المعلومة المتضمنة . مثال ذلك ، المعادلة $٥ = ٢ + س$ تكون صحيحة فقط عندما $س = ٣$ ، والمعادلة $س + ص = ٣$ صفرأ تكون صحيحة عندما $س = ٢$ ، $ص = ١$ ولأزواج أخرى من قيم $س$ ، $ص$ ، ولكنها لا تكون صحيحة لأزواج أخرى من قيم $س$ ، $ص$ مثل $س = ٢$ ، $ص = صفرأ$

متباينة شرطية conditional inequality

متباينة تكون صحيحة فقط لقيم معينة للمتغيرات المتضمنة وليس لجميع قيمها . مثال ذلك ، المتباينة $س + ٢ < ٣$ متباينة شرطية لأنها صحيحة فقط لقيم $س$ أكبر من ١ ، بينما المتباينة $س + ١ < س$ ليست متباينة شرطية لأنها صحيحة لجميع قيم المتغير المتضمن $س$.

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>٢ - جسم محدود بمنطقة مستوية و سطح مكون من القطع المستقيمة التي تصل بين نقطة ثابتة ليست في مستوى المنطقة المستوية ونقط حدودها . وتسمى النقطة الثابتة رأس المخروط (vertex) والمنطقة المستوية قاعدة المخروط (base) والقطع المستقيمة رواسم أو عناصر المخروط elements . ويطلق المصطلح أيضاً على السطح المغلف لهذا الجسم .</p>	<p>تقرير (تعبير) شرطى conditional statement = جملة شرطية = conditional sentence تقرير مركب (تعبير) أداة الربط فيه هي إذا كان . . . ، فإن . . . مثال ذلك التقرير إذا كان العدد الطبيعي زوجياً ، فإن مربعه يقبل القسمة على ٤ . ويرمز لهذا التقرير (التعبير) بالرمز التالى : $F \leftarrow R$. يسمى التقرير البسيط R المقدمة (antecedent) ويسمى التقرير البسيط R النتيجة أو التالى (consequent) .</p>
<p>ارتفاع مخروط cone, altitude of a (انظر : altitude of a cone) .</p>	
<p>ارتفاع مخروط ناقص cone, altitude of a frustum of a البعد بين قاعدتي المخروط الناقص .</p>	<p>جهد الموصل conductor potential جهد الموصل لمنطقة سطحها S هو الدالة التوافقية على داخلية S والمتصلة على S على والتي تأخذ القيمة الثابتة 1 على S وهذه الدالة تصف جهد شحنة كهربائية في حالة اتزان على سطح موصل .</p>
<p>محور مخروط cone, axis of a الخط المستقيم المار برأس المخروط ومركز القاعدة (إذا كان لها مركز) .</p>	
<p>مخروط دائرى cone, circular</p>	<p>مخروط cone ١ - سطح مخروطى (انظر : سطح مخروطى) conical surface .</p>

مساحة السطح الجانبي لمخروط

cone, lateral area of a

(انظر : area of a cone, lateral) .

المساحة الجانبية لمخروط دائري قائم
cone, lateral area of a right circular

المساحة غير المستوية للمخروط وتساوى
ط نو ل ، حيث نو نصف قطر قاعدة
المخروط ، ل طول راسمه .

مخروط دائري مائل

cone, oblique circular

(انظر : circular cone, oblique) .

المخروط المماس لسطح ثنائي
cone of a quadric surface, tangent

مخروط كل راسم من رواسمه مماس للسطح
الثنائي .

مخروط دائري قائم

cone, right circular

(انظر : circular cone, right) .

(انظر : circular cone) .

دليل لسطح المخروط

cone, directrix of a

المنحنى الناتج عن تقاطع رواسم
السطح المخروطي مع مستوي لا يمر برأس
المخروط .


cone, elliptic

مخروط ناقصي


مخروط قاعدته قطع ناقص .

cone, frustum of a المخروط الناقص

جزء المخروط المحدود بقاعدته ومقطعه بمستوي
موازي لهذه القاعدة (انظر الشكل) .



ويسمى هذا المقطع قاعدة ثانية للمخروط
الناقص .



المساحة الجانبية لمخروط ناقص دائري قائم
cone, the lateral area of a frustum of a right circular

المساحة الجانبية لمخروط ناقص دائري قائم
تساوى ط ل (نوم₁ + نوم₂) ، حيث ل
الارتفاع الجانبى للمخروط ، نوم₁ ، نوم₂ نصفا
قطرى قاعدتيه .

مخروط ابتر cone, truncated
جزء المخروط المحصور بين مستويين
غير متوازيين خط تقاطعها لا يقطع
المخروط . وقاعدتا المخروط الناقص المائل
(bases of a truncated cone) هما مقطعا بهذين
المستويين .

حجم المخروط cone, volume of a

تسطير مخروط cone, ruling of a
الأوضاع المختلفة للخط المستقيم المولد
لسطح المخروط .
(انظر : تسطير ruling) .

الزاوية نصف الرأسية للمخروط
(الدائرى القائم)

cone, semi-vertical angle of a
(انظر :
angle of a cone, semi-vertical) .

الارتفاع الجانبى لمخروط دائري قائم
cone, slant height of a right circular
طول راسم المخروط الدائرى القائم .

مخروط كروى cone, spherical
السطح المكون من طاقية كروية و سطح
مخروطى يشترك معها فى القاعدة ورأسه مركز
الكرة . وحجم المخروط الكروى يساوى
 $\frac{2}{3} \pi r^2 h$ ، حيث نوم نصف قطر الكرة ،
ع ارتفاع الطاقية الكروية .

فترة الثقة لتقدير ما
confidence (or assurance) interval
of an estimate

مجال لقيم يعتقد أنه يتنوع ، بدرجة ثقة محددة مسبقاً ، على القيمة الخاصة لمتغير بسيط أو خاصية مميزة ضمن لها تقدير ما ، وترتبط درجة الثقة باحتمال الحصول على المجالات الصحيحة باستخدام العينات العشوائية .

فترة ثقة قصيرة غير منحازة

confidence interval, short unbiased

فترة ثقة غير منحازة احتمال تغطيتها للقيمة
الخاطئة للمتغير الوسيط في جوار للقيمة
الصحيحة يكون أقل من الاحتمال المناظر لأي
فترة ثقة أجري غير منحازة لنفس فترة الثقة :

انظر : فترة ثقة غير منحازة
confidence interval, unbiased.

فترة الثقة الأقصر
confidence interval, shortest

فترة الثقة التي تخفض دالة ما في
 وية (مفرد) : بندقه (يؤثر) إلى الحيلة الأدنى ، حيث
 وير (سر) : يهز (سيرة) : التبان في عينة عشوائية
 يس من المجتمع

ثلث حاصل ضرب مساحاة القاعدة في ارتفاع المخروط . إذا كان المخروط دائرياً ، فإن حجمه يساوى $\frac{1}{3}$ ط² ن² ع ، حيث ن نصف قطر

القاعدة: $\frac{1}{\sin} = \frac{1}{\cos} = \frac{1}{\tan}$

حجم مخروط ناقص
cone, volume of a frustum of a

حجم المخروط الناقص يساوي

$$= (\sqrt{r_1 r_2} + r_1 + r_2) \frac{1}{2r_1 r_2}$$

حيث \bar{r} ارتفاع المخروط ، r_1 ، r_2 مساحتي قاعدتيه .

فترة الثقة الأقصر تقريباً

confidence interval, approximately
shortest.

يقال إن فترة الثقة أقصر تقريباً إذا لم تكن فترة الثقة هي الأقصر لعينات عشوائية بحجم n ، ولكن احتمال احتوائها على قيم خاطئة للمتغير الوسيط تقترب من فترة الثقة الأقصر عندما

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ ← 2

<p>أو المنحنيات أو السطوح .</p> <p>سطوح مخروطية متحدة البؤر</p> <p>confocal conicoids</p> <p>سطوح مخروطية تشترك في نفس المستويات الأساسية (principal planes) ومقاطعها بأى من هذه المستويات تكون قطاعات مخروطية متحدة البؤرتين ، فمثلاً ، إذا كان له متغيراً وسيطاً ، ٢ ، ب ، ح كميات ثابتة ، فإن المعادلة :</p> $1 = \frac{x^2}{a^2 - c^2} + \frac{y^2}{b^2 - c^2} + \frac{z^2}{c^2}$ <p>حيث $a^2 > b^2 > c^2$ ، تمثل سطوحاً مخروطية متحدة البؤر .</p> <p>عندما تكون $a^2 < b^2 < c^2$ فإن المعادلة تمثل عائلة من السطوح الناقصية المتحدة البؤر (confocal ellipsoids)</p> <p>وعندما تكون $a^2 < b^2 < c^2$ فإنها تمثل عائلة من السطوح الزائدية ذات الفرع الواحد المتحدة البؤر (confocal hyperboloids of one sheet)</p> <p>وعندما تكون $a^2 < b^2 < c^2$ فإنها تمثل عائلة من السطوح الزائدية ذات الفرعين المتحدة البؤر (confocal hyperboloids of two sheets)</p>	<p>فترة ثقة غير منحازة</p> <p>confidence interval, unbiased</p> <p>تكون فترة الثقة من $(س_1)$ إلى $(س_2)$ (س_هـ) بمعامل ثقة معلوم غير منحازة إذا كان احتمال احتوائها على القيمة الصحيحة أكبر من احتمال احتوائها على أى قيمة أخرى .</p> <p>وبخلاف ذلك فإن الفترات تكون فترات ثقة منحازة biased confidence intervals .</p> <p>نظام حاسب (في الحاسب)</p> <p>configuration (in computer)</p> <p>عدد من الوحدات والأجهزة المترابطة بحيث تعمل وفق نظام معين .</p> <p>وأى نظام حاسب (computer configuration) يتكون من وحدة أو أكثر من وحدات التشغيل المركزية (C. P. U) ووحدة أو أكثر من وحدات الإدخال والإخراج (I / O devices) ووحدة أو أكثر من وحدات التخزين (storage devices) .</p> <p>شكل (في الهندسة)</p> <p>configuration (in geometry)</p> <p>مصطلح عام يطلق على أى شكل هندسى أو على أى تركيبة هندسية كالنقط أو المستقيمات</p>
--	--

قطاعات مغروطة متحدة البورتين

confocal conics

القطاعات الناقصة والقطاعات الزائدة التي
تتشارك في البؤرتين ، والمعادلة القياسية لها هي :

$$1 = \frac{r_{\text{ص}}}{(r_{\text{ل}} - r_{\text{ب}})} + \frac{r_{\text{س}}}{(r_{\text{ل}} - r_{\text{پ}})}$$

حيث $b^2 > a^2$ ، $b^2 \neq a^2$ ، له تأخذ جميع القيم الحقيقية الأخرى التي تحقق $b^2 > a^2$ ويكون منحنى المجموعة قطعاً ناقصاً إذا كانت $b^2 > a^2$ ، وقطعاً زائداً إذا كانت $b^2 < a^2$ وإحداثيات البؤرتين هي : $(\pm \sqrt{b^2 - a^2}, 0)$.

متابعة من المصفوفات المتوافقة

conformable matrices, sequence of

متتالية s_1, s_2, \dots, s_m من
المصفوفات بحيث يكون عدد أعمدة المصفوفة
 s_m مساويا لعدد صفوف المصفوفة s_{m-1} لكل
 m بحيث $2 \leq m \leq n$. مثال ذلك
المصفوفات

$$C \begin{bmatrix} \begin{matrix} \text{Y1}^P & \text{Y1}^P & \text{Y1}^P \\ \text{Y2}^P & \text{Y2}^P & \text{Y2}^P \\ \text{Y3}^P & \text{Y3}^P & \text{Y3}^P \end{matrix} \end{bmatrix} = D$$

$$\begin{bmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \end{bmatrix} = q$$

$$\begin{bmatrix} 11 \rightarrow & 21 \rightarrow & 21 \rightarrow & 11 \rightarrow \\ 22 \rightarrow & 22 \rightarrow & 22 \rightarrow & 12 \rightarrow \end{bmatrix} = q^{-1}$$

تُكوِّن المتتابعة \mathbb{L} ، \mathbb{H} ، \mathbb{C} من المصفوفات المتوافقة . ويمكن إيجاد حاصل ضرب $\mathbb{S}_1 \mathbb{S}_2 \dots \mathbb{S}_n$ إذا ، فقط إذا ، كانت \mathbb{S}_1 ، \mathbb{S}_2 ، ... ، \mathbb{S}_n متتابعة المصفوفات المتوافقة . والعلاقة « متوافقتان » غير متماثلة ، فمثلاً ، \mathbb{L} ، \mathbb{H} متوافقتان ، ولكن \mathbb{H} ، \mathbb{L} غير متوافقتين .

1. *Pharmaceutical industry* – The pharmaceutical industry is a major contributor to the U.S. economy, with sales of over \$200 billion in 2000. The industry is characterized by high R&D costs, long development times, and high barriers to entry. The industry is also heavily regulated by the FDA.

تمثيل مرافق لحافظ للزوايا لسطح على آخر
conformal-conjugate representation
of one surface on another

تمثيل للسطح يكون حافظاً للزوايا وكل مجموعة مترافقة على أحد السطحين تناظر مجموعة مترافقة على السطح الآخر .

congruence

التطابق

تقرير (أو عبارة) تفيد التطابق بين كميتين .

مصفوفات متطابقة
congruent matrices
(انظر ! تحويل تطابقي
congruent transformation)

تحويل تطابقي
congruent transformation
تحويل على الصورة $S = S^{-1} S$ بمصفوفة S
بمصفوفة غير شاذة S ، حيث S^{-1} مدور S .
المصفوفة S يقال لها متطابقة مع المصفوفة S .

قطع مخروطي منحل
conic, degenerate
الصورة النهائية لقطع مخروطي وقد تكون
نقطة أو خطاً مستقيماً أو خطين مستقيمين .
فمثلاً ، يقترب القطع المكافئ من خط مستقيم
عندما يتحرك المستوى القاطع للسطح
المخروطي حتى يصبح مماساً له ، ويقترب القطع
المكافئ من خطين مستقيمين متوازيين عندما
تنتقل رأس المخروط إلى ما لا نهاية ، ويقترب
القطع الناقص من نقطة عندما يمر المستوى
القاطع برأس السطح المخروطي وبحيث
لا يحوى عنصراً من عناصره ، ويقترب القطع
الزائد من خطين مستقيمين متقاطعين عندما

فمثلاً ، إذا كانت a ، b ، c أعداداً صحيحة
فإن $a \equiv b$ (مقياس c) ، ويقرأ a متطابقة مع
 b بمقياس c ، يعنى أن $a - b$ يقبل القسمة
على c بدون باق . مثال ذلك ، $5 \equiv 3$
(مقياس 2) .

تطابق خطي
congruence, linear
تطابق جميع حدوده من الدرجة الأولى في
المتغيرات المتضمنة . مثال ذلك :
 $12س + 10ص - 6 \equiv 0$ صفراً (مقياس 42)
هو تطابق خطي .

تطابق تربيعي
congruence, quadratic
تطابق من الدرجة الثانية ، وصورته العامة
هي $اس^2 + بس + ح \equiv 0$ صفراً (مقياس
 n) ، حيث $a \neq 0$ صفر .

أشكال متطابقة (في الهندسة)
congruent figures (in geometry)
الأشكال التي يمكن وضع أحدها فوق
الأخر بحيث ينطبق عليه تماماً . وهو التعريف
الذي وضعه "إقليدس" .

يحوى المستوى القباطع رأس السطح المخروطي. ونجميع هذه الحالات النهائية يمكن الحصول عليها جبرياً بتغيير المتغيرات الوسيطة في معادلات القطاعات المختلفة.

قطر القطع المخروطى

conic, diameter of a

المحل الهندسى لمتصفات عائلة من أوتار القطع المتوازية ويكون خطاً مستقيماً ، ولكل قطع مخروطى عدد لا نهائى من الأقطار . وفى حالة القطاعات المركزية تكون الأقطار حزمة من الخطوط المستقيمة المارة بمركز القطع .

القطاعات المخروطية conic sections

المحل الهندسى لنقطة تتحرك بحيث تكون النسبة بين بعدها عن نقطة ثابتة إلى بعدها عن خط مستقيم ثابت تساوى مقداراً ثابتاً . وتسمى النسبة الثابتة الاختلاف المركزى eccentricity للمنحنى ، وتسمى النقطة الثابتة البؤرة focus ، ويسمى الخط الثابت الدليل directrix . ويرمز للاختلاف المركزى عادة بالرمز e .

وعندما يكون $e = 1$ يسمى القطع المخروطى قطعاً مكافئاً ،

وعندما يكون $e > 1$ يسمى القطع المخروطى قطعاً ناقصاً ، وعندما يكون $e < 1$ يسمى القطع المخروطى قطعاً زائداً .

وهذه الأنواع الثلاثة سميت بالقطاعات المخروطية لأنه يمكن الحصول عليها بأخذ مقاطع مستوية لسطح مخروطى . ويمكن كتابة معادلة القطع المخروطى فى صور متعددة . فمثلاً :

(١) فى الإحداثيات القطبية تأخذ المعادلة الصورة :

$$r = \frac{r_0}{1 + e \cos \theta}$$

حيث e الاختلاف المركزى ، والبؤرة هى قطب نظام الإحداثيات ، والدليل هو العمودى على المحور القطبى وعلى بعد r_0 من القطب . وبالإحداثيات الديكارتية تكافئ المعادلة الأساسية المعادلة :

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

حيث البؤرة هى عند نقطة الأصل ، ومحور السينات ينطبق على المحور القطبى .

(٢) المعادلة الجبرية العامة من الدرجة الثانية فى متغيرين (الإحداثيين x ، y) تمثل دائماً قطعاً مخروطياً ويتضمن ذلك القطاعات المخروطية المنحلة .

<p>سطح مخروطى دائرى</p> <p>conical surface, circular</p> <p>سطح مخروطى دليله دائرة وتقع رأسه على الخط العمودى على مستوى الدائرة المار بمركزها . إذا كانت الرأس عند نقطة الأصل وكان مستوى الدليل عمودياً على محور العينات ، تأخذ معادلة السطح المخروطى الدائرى الصورة : $s^2 + c^2 = l^2$ حيث له ثابت .</p>	<p>معادلة المماس لقطع مخروطى عام</p> <p>conic, tangent equation to a general</p> <p>إذا كانت معادلة القطع بالإحداثيات الديكارتية هي :</p> $as^2 + 2bs + c^2 + d^2 + e^2 = 0$ <p>فإن معادلة المماس عند النقطة (s_1, c_1) الواقعة على القطع هي :</p> $as_1s + b(s_1 + c_1) + d(s_1 + c_1) + e(s_1 + c_1) = 0$
<p>سطح مخروطى تربيعى</p> <p>conical surface, quadric</p> <p>سطح مخروطى دليله قطع مخروطى .</p> <p>سطح تربيعى</p> <p>conicoid = quadric surface</p> <p>سطح ناقصى أو زائدى أو مكافئى .</p> <p>انظر : سطح ناقصى ellipsoid وسطح زائدى hyperboloid وسطح مكافئى paraboloid</p>	<p>سطح مخروطى</p> <p>conical surface</p> <p>السطح الذى يتولد عن حركة خط مستقيم يمر دائماً بنقطة ثابتة ويقطع منحنى ثابتاً . وتسمى النقطة الثابتة رأس (vertex or apex) السطح المخروطى ، ويسمى المنحنى الثابت دليل (directrix) السطح المخروطى ، ويسمى الخط المستقيم المتحرك مولد أو راسم (generator or generatrix) السطح المخروطى .</p> <p>وأي معادلة متجانسة من الدرجة الثانية فى الإحداثيات الديكارتية المتعامدة تمثل سطحاً مخروطياً . تقع رأسه عند نقطة الأصل .</p>
<p>القطاعات المخروطية المتحدة البؤر</p> <p>conics, confocal</p>	

<p>conjecture حدسية</p> <p>مقولة رياضية يظن أنها صحيحة ولم تبرهن بعد .</p>	<p>(انظر : confocal conics) .</p>
<p>أعداد جبرية مترافقة</p>	<p>الأوتار البؤرية للقطاعات المخروطية</p> <p>conics, focal chords of</p> <p>أوتار القطع المارة ببؤرة له .</p>
<p>conjugate algebraic numbers</p> <p>جذور معادلة جبرية درجتها زوجية وغير قابلة للتحليل ومعاملاتها أعداد قياسية ، أى جذور معادلة على الصورة :</p> $x^n + s_1 x^{n-1} + \dots + s_{n-1} x + s_n = 0$ <p>صفرًا ، حيث n عدد زوجي ، s_1, s_2, \dots, s_{n-1} أعداد قياسية .</p> <p>فمثلاً : جذرا المعادلة $x^2 + s_1 x + s_2 = 0$ صفرًا هما</p>	<p>الخاصية البؤرية (الصوتية أو الضوئية) للقطع المخروطي</p> <p>conics, focal (acoustical or optical) property of</p> <p>(انظر : الخاصية البؤرية للقطع الناقص)</p> <p>(ellipse, focal property of)</p> <p>و</p> <p>(الخاصية البؤرية للقطع الزائد)</p> <p>(hyperbola, focal property of)</p> <p>و</p> <p>(الخاصية البؤرية للقطع المكافئ)</p> <p>(parabola, focal property of)</p>
<p>$\frac{1}{4}(-1 \pm \sqrt{3})$ ،</p> <p>وهما عددان جبريان مركبان مترافقان .</p> <p>وجذرا المعادلة $x^2 - 4x + 1 = 0$ صفرًا هما $2 \pm \sqrt{3}$ وهما عددان جبريان حقيقيان مترافقان .</p>	<p>قطاعات مخروطية متماثلة الوضع</p> <p>conics, similarly placed</p> <p>قطاعات مخروطية من نفس النوع محاورها المتناظرة متوازية .</p>
<p>زاويتان مترافقتان</p> <p>conjugate angles</p> <p>(انظر : angles, conjugate) .</p>	<p>المتناظرة متوازية .</p>

(انظر :
complex numbers, conjugate)

دالتان محدبتان مترافقتان

conjugate convex functions

إذا كانت د دالة مطلقة التزايد لجميع قيم
س \leq صفراً وكانت د (٠) = صفراً ، وكانت
الدالة العكسية لها ، فإنه يقال أن الدالتين
المحدبتين

$$f(s) = \sup_{y} \{ d(y) - sy \} ,$$

$$f^*(s) = \inf_{y} \{ d(y) - sy \}$$

مترافقتان .

منحنى متوسط ترافقى على سطح

conjugate curve on a surface, mean

منحنى متوسط ترافقى على سطح
الاتجاهين المتوسطين المترافقين على سطح
نقطة من نقطه .

conjugate arcs قوسان مترافقتان

قوسا دائرة اتحادهما يكون الدائرة كاملة
وتقاطعهما هو الفئة الخالية ، أى القوسان
اللذان تنقسم إليهما الدائرة بأى من
أوتارها .

المحور المرافق لقطع زائد

conjugate axis of a hyperbola

(انظر : القطع الزائد hyperbola) .

زوج مترافق من ذوات الحدين الصماء

conjugate binomial surds

عددان على الصورة : $\sqrt{p} + \sqrt{q}$ ، $\sqrt{p} - \sqrt{q}$ ،
حيث p ، q ، b ، c ،
أعداد قياسية ، \sqrt{p} ، \sqrt{q} أحدهما أو كلاهما
ليس عدداً قياسياً . وحاصل ضرب هذا الزوج
المترافق يكون عدداً قياسياً .

$$\text{مثال ذلك : } (\sqrt{p} + \sqrt{q})(\sqrt{p} - \sqrt{q}) = p - q$$

عددين مركبان مترافقان

conjugate complex numbers

<p>طريقة الاتجاهات المترافقة conjugate directions, method of تعميم لطريقة اتجاهات الميل المترافقة لحل نظام معادلات خطية عددها n في n من المجاهيل .</p>	<p>منحنيان مترافقان conjugate curves منحنيان كل واحد منهما منحنى " برتراند " Bertrand بالنسبة للآخر . المنحنيات التي لها أكثر من مرافق هي فقط المنحنيات المستوية ومنحنى اهليكس (الحلزون) الدائري . circular helix</p>
<p>الاتجاهان المترافقان على سطح عند نقطة conjugate directions on a surface at a point</p>	<p>(انظر : منحنى " برتراند " . Bertrand curve)</p>
<p>اتجاهها زوج من الأقطار المترافقة لمبين انحناء " ديوبان " عند نقطة م ناقصية أوزائدية لسطح سر . يوجد اتجاه وحيد مرافق لأي اتجاه معطى على السطح عند م ، ومن ثم يوجد عدد لانهاى من أزواج الاتجاهات المترافقة على سر عند م .</p>	<p>قطر مرافق لمستوى قطري لسطح تربيعى مركزى conjugate diameter of a diametral plane of a central quadric القطر الذى يحوى مراكز جميع مقاطع السطح التربيعى المركزى بمستويات موازية لمستوى قطري معين .</p>
<p>الاتجاهان المتوسطان المترافقان على سطح conjugate directions on a surface, mean</p>	<p>قطران مترافقان conjugate diameters قطران لقطع مخروطى مركزى كل منهما هو المحل الهندسى لمنتصفات الأوتار الموازية للآخر . ولا يتعامد القطران المترافقان إلا فى حالة انطباقهما على محورى القطع . وفى الدائرة يتعامد كل قطرين مترافقين .</p>

<p>العنصر في الصف الرائي والعمود الميمى .</p>	<p>كل من هذين الاتجاهين هو متوسط نصفى قطر التقوس الأساسيين r_1 ، r_2 أى أن</p>
<p>طريقة اتجاهات الميل المترافقة</p>	$r = \frac{1}{r_1 + r_2}$
<p>conjugate gradients, method of طريقة تكرارية لحل منظومة معادلات خطية</p>	<p>ديادان مترافقان conjugate dyads</p>
<p>عددها r فى r من المجاهيل $s = (s_1, s_2, \dots, s_r)$ تنتهى بعد r من الخطوات إذا لم يكن هناك خطأ تراكمى ، وتبدأ هذه الطريقة بتقدير أولى s لمتجه الحل s ، تعقبه خطوات تصحيح فى اتجاهين مترافقين بالنسبة لمصفوفة المعاملات ، تختار تتابعياً لتكون فى اتجاهات الميل بالنسبة لدالة تربيعية مصاحبة ، وتأخذ هذه الدالة قيمة صغرى تساوى الصفر عند الحل s للمسألة الأصلية .</p>	<p>(انظر : دياذ dyad) . العناصر المترافقة والزمر الجزئية المترافقة لزمرة conjugate elements and conjugate subgroups of a group (انظر : تحويل عنصر زمرة transform of an element of a group) .</p>
<p>دالتان توافقيتان مترافقتان</p>	<p>العناصر المترافقة فى محدد</p>
<p>conjugate harmonic functions دالتان توافقيتان (u, v) ، ي (u, v) تحققان معادلتى " كوشى وريان " التفاضليتين الجزئيتين فى (u, v) . وتكون الدالتان u, v ، مترافقتين إذا ، وفقط إذا ، كانت $u + v$ دالة تحليلية فى $u + v$ ، ويمكن إيجاد مترافقة دالة توافقية باستخدام</p>	<p>conjugate elements of a determinant عناصر المحدد التى يحل كل منها محل الآخر عند جعل صفوف المحدد أعمدة وأعمدته صفوفاً . فمثلاً ، العنصر فى الصف الثانى والعمود الثالث هو المرافق للعنصر فى الصف الثالث والعمود الثانى . وبصفة عامة ، يكون العنصران a_{ij} ، a_{ji} مترافقين ، حيث i, j</p>

(٢) النقطتان المترافقتان توافقياً مع نقطتي تقاطع القطع مع الخط المستقيم المار بالنقطتين .

أعداد: صماء مترافقة

conjugate radicals

١ - زوج مترافق من ذوات الحدين الصماء .

(انظر : conjugate binomial surds) .

٢ - أعداد جذرية تُكوّن أعداداً جبرية مترافقة

(انظر : أعداد جبرية مترافقة)
conjugate algebraic numbers

جذور مترافقة conjugate roots

١ - جذران مركبان مترافقان لمعادلة .

٢ - أعداد جبرية مترافقة .

(انظر : conjugate algebraic numbers)

سطح مسطر مرافق لسطح ما

conjugate ruled surface of a given surface

سطح مسطر مستقيمت تسطيره هي المماسات

لسطح آخر مسطر س عند نقط خط الحصر ل

للسطح س والمتعامدة على مستقيمت تسطيره س

عند النقط المناظرة للخط المستقيم ل .

معادلتى كوشى وريمان .

سطحان زائديان مترافقان

conjugate hyperboloids

سطحان زائديان يعطيان ، باختيار مناسب

لمحاور الإحداثيات، بالمعادلتين :

$$1 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$$

$$1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}$$

المرافق المركب لمصفوفة

conjugate of a matrix, complex

(انظر : complex conjugate of a matrix) .

نقطتان مترافقتان بالنسبة لقطع مخروطي

conjugate points relative to a conic

(١) نقطتان تقع إحداهما على الخط المستقيم

المار بنقطتي تماس المماسين المرسومين للقطع من

النقطة الأخرى .

مجمع اللغة العربية - القاهرة

إذا كانت S^* المجموعة المناظرة لزمرة جزئية S بتشاكل ذاتى فإنها تكون زمرة جزئية . ويقال أن S ، S^* مترافقتان إذا كان هذا التشاكل الذاتى داخلياً .

منظومة مترافقة من المنحنيات على سطح
conjugate system of curves on a surface

عائلتان من المنحنيات على سطح S كل منهما ذات متغير وسيط واحد ويمر خلال كل نقطة M من نقط السطح منحني وحيد من كل من العائلتين بحيث يكون اتجاها المماسين للمنحنيين المارين بالنقطة M مترافقين عند M .

طريقة المترافقات المتتالية

conjugates, method of successive

طريقة تكرارية للحساب التقريبى لقيمة دالة تحليلية (فى نظرية المتغير المركب) ترسم مجالاً يكاد يكون دائرياً فوق داخلية دائرة مع حفظ قياس الزوايا .

ويمكن اعتبار هذا الراسم على أنه الخطوة الثانية فى عملية ذات خطوتين لرسم مجال بسيط الترابط فوق داخلية دائرة مع حفظ قياس الزوايا ، وتتم الخطوة الأولى لرسم مجال معطى

(انظر : خط الحصر line of striction) .

conjugate space فراغ مرافق

= dual space

= adjoint space

إذا كانت دالة خطية متصلة معرفة على فراغ خطى معيارى N (حقيقى أو مركب) ، فإنه يوجد عدد أصغر (يسمى معيار N ويرمز له بالرمز $\|d\|$) يحقق المتباينة

$|d(s)| \geq \|d\| \|s\|$ لكل $s \in N$ وتكون فئة جميع هذه الدوال فراغاً خطياً معيارياً كاملاً (أى فراغ " بناخ ") يسمى الفراغ المرافق الأول (first conjugate space) للفراغ N ويرمز له بالرمز N_1 . ويسمى الفراغ المرافق الأول للفراغ N_1 الفراغ المرافق الثانى (second conjugate space) للفراغ N ، ويرمز له بالرمز N_2 ، وهكذا . إذا كان N فراغاً نهائى البعد ، فإن $N_2 = N$ ، N_1 يكونان متطابقين .

وأى فراغ خطى معيارى يكون متشاكلاً قياسياً مع فراغ جزئى من الفراغ المرافق الثانى له .

زمرتان جزئيتان مترافقتان

conjugate subgroups

<p>مجال متعدد الترابط connected region, multiply مجال ليس بسيط الترابط .</p>	<p>فوق مجال يكاد يكون دائرياً بواسطة دوال معزوفة أو من خلال سلسلة من الرواسم الحافظة لقياس الزوايا .</p>
<p>مجال بسيط الترابط connected region, simply مجال يمكن فيه التقليل اتصاليا لكل منحني مغلق يقع بالكامل بداخله فيحدث التقليل إلى نقطة من نقط المجال دون الخروج منه . وهو مجال لا يمكن لأي منحني مغلق وواقع بالكامل بداخله أن يحوي نقطة حدية من نقط المجال . فمثلاً ، سطح الكرة مجال بسيط الترابط ، ولكن إذا أزيلت نقطة من نقط سطح الكرة فإن المجال الناج لا يكون بسيط الترابط .</p>	<p>المتراقتان التوافقتان بالنسبة لنقطتين conjugates with respect to two points, harmonic النقطتان اللتان تقسمان الخط المستقيم المار بنقطتين معلومتين بنفس النسبة العددية من الداخل ومن الخارج . وهاتان النقطتان هما مع النقطتين المعلومتين نسبة تبادلية تساوى - ١ . وتكون النقطتان المعلومتان مترافقتين توافقياً بالنسبة لنقطتي التقسيم .</p>
<p>فئة مترابطة قوسياً connected set, arcwise فئة من النقط كل نقطتين من نقطها يمكن وصلهما بقوس بسيطة تنتمى جميع نقطها للفئة نفسها . فئة مترابطة محلياً connected set, locally</p>	<p>معطوف قضيتين conjunction of propositions القضية المكونة من قضيتين تربطهما أداة الربط « و » . فمثلاً ، معطوف القضيتين « اليوم الأربعاء » « اسمى أحمد » هو القضية « اليوم الأربعاء واسمى أحمد » ويرمز لمعطوف القضيتين س ، ص . بالرمز $S \wedge V$ ص ويقراً س و ص ويكون معطوف س ، ص صائباً إذا ، وفقط إذا ، كان كل من س ، ص صائباً .</p>

من قطعة واحدة ، وهذا الرقم يساوى $2 - X$ ، حيث X مميز "أويلر" (Euler characteristic) ومن ثم فإن رقم الترابط لمنحنى بسيط الترابط يساوى ١ .

ويقال لمنحنٍ إنه ثنائى الترابط (doubly connected) ، أو ثلاثى الترابط (triply connected) أو ... حسبما كان رقم الترابط ٢ أو ٣ ، أو ...

رقم الترابط لسطح

connectivity number of a surface

رقم الترابط لسطح مترابط هو الواحد مضافاً إليه الحد الأقصى لعدد القطعيات المغلقة (أو القطعيات التى تصل بين نقط القطعيات السابقة ، أو الواصلة بين نقط الحد ، أو نقطة من نقط الحد إلى نقطة من قطعة سابقة ، إذا لم يكن السطح مغلقاً) التى يمكن إجرائها دون تجزئ السطح ، وهذا الرقم يساوى $3 - X$ لسطح مغلق ، $2 - X$ لسطح ذى منحنيات حدية . ومن ثم فإن رقم الترابط لسطح بسيط الترابط يساوى ١ . ويقال للسطح أنه ثنائى الترابط ، أو ثلاثى الترابط ، أو ... حسبما كان رقم الترابط ٢ ، أو ٣ ، أو ...

فئة S من النقط لكل نقطة s من نقطتها ولكل جوار s للنقطة s يوجد جوار s للنقطة s بحيث يكون تقاطع s ، s فئة مترابطة محتواة فى s .

فئة مترابطة من النقط

connected set of points

فئة لا يمكن تقسيمها إلى فئتين S ، s بحيث $S \cap s = \emptyset$ ، وبحيث لا تنتمى أى نقطة تراكم لإحدى الفئتين للفئة الأخرى . وبالتالي فإن فئة جميع الأعداد القياسية (الكسرية) لا تكون مترابطة ، وذلك لأن كلاً من فئة جميع الأعداد القياسية الأصغر من $\sqrt{5}$ وفئة جميع الأعداد القياسية الأكبر من $\sqrt{5}$ مغلقة فى فئة الأعداد القياسية . والفئة المترابطة قوسياً تكون مترابطة ، ولكن الفئة المترابطة لا تكون بالضرورة مترابطة قوسياً أو بسيطة الترابط .

رقم الترابط لمنحنى

connectivity number of a curve

رقم الترابط لمنحنى مترابط هو الواحد مضافاً إليه الحد الأقصى لعدد النقط التى يمكن استبعادها دون تجزئ المنحنى إلى أكثر

معجم الرياضيات

<p>صحيحة متتالية ، الأعداد ٢ ، ٤ ، ٦ ، ... أعداد صحيحة زوجية متتالية ، والأعداد - ٣ ، - ١ ، ١ ، ٣ ، ... أعداد صحيحة فردية متتالية .</p> <p>التالى (فى المنطق) consequence (in logic) = conclusion الجزء الثانى من الجملة الشرطية فى المنطق ويطلق عليه أيضاً النتيجة .</p> <p>(انظر : جمل شرطية conditional sentences والتضمين implication)</p> <p>التالى (فى النسبة) consequent (in proportion) الحـد الثانى فى النسبة ، أى المقدار الذى يقارن به الحد الأول فيها . مثال ذلك ، فى النسبة ٢ : ٣ العدد ٣ هو التالى والعدد ٢ هو الحد الأول أو المقدم (antecedent) .</p> <p>conservation of energy بقاء الطاقة</p>	<p>السطح شبه المخروطى (المخروطانى) conoid</p> <p>١ - كل سطح مُولّد بخط مستقيم يتحرك موازياً لمستوى معين ويقطع خطين معينين أحدهما مستقيم والآخر منحنى .</p> <p>٢ - السطح المكافئ الدورانى أو السطح الزائدى الدورانى أو السطح الناقصى الدورانى .</p> <p>٣ - السطح الزائدى العام أو السطح المكافئ العام ، وليس السطح الناقصى العام .</p> <p>السطح شبه المخروطى القائم conoid, right</p> <p>سطح شبه مخروطى ، المستوى الموازى لرواسمه والخط المستقيم الذى يقطعها متعامدان .</p> <p>أعداد صحيحة متتالية consecutive integers</p> <p>أعداد صحيحة مرتبة الفرق بين كل عدد وما يليه منها إما واحد دائماً أو اثنين دائماً . فمثلاً ، الأعداد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ... أعداد</p>
--	--

<p>في اتجاهات محاور الإحداثيات الديكارتية المتعامدة ، \vec{r} هو مسار الجسم . ويكون المكامل (دالة التكامل) تفاضلاً تاماً إذا كان المجال محافظاً . ومن أمثلة المجالات المحافظة المجال الثقالي والمجال الإلكتروستاتيكي . أما مجالات القوى التي تتضمن تأثيرات احتكاكية فليست محافظة .</p>	<p>مبدأ في الميكانيكا ينص على أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث . وينص هذا المبدأ على أن مجموع طاقتي الحركة والوضع يكون ثابتاً في مجال القوى المحافظة .</p>
<p>قوة محافظة conservative force كل قوة ينشأ عنها مجال محافظ .</p>	<p>قانون بقاء كمية الحركة conservation of momentum, law of قانون في الميكانيكا ينص على أنه إذا تحركت كتل نظام ما تحت تأثير القوى الداخلية المتبادلة بينها فقط فإن المجموع الكلي لمتجهات كميات حركتها يظل ثابتاً .</p>
<p>افتراضات متآلفة consistent assumptions افتراضات لا يناقض الواحد منها الآخر . (انظر : افتراض assumption) .</p>	<p>مجال محافظ (لقوة) conservative field (of force) إذا كان الشغل الذي تبذله قوة لإزاحة جسم من نقطة إلى أخرى لا يتوقف على المسار الواصل بين النقطتين ، فيقال إن مجال القوة مجال محافظ . وفي الحالة التي يزاح فيها الجسم على مسار مغلق بقوة مجاها محافظ يكون الشغل المبذول بالقوة مساوياً للصفر . ويمثل الشغل رياضياً بالتكامل الخطي</p>
<p>تقدير متآلف (في الإحصاء) consistent estimate (in statistics) تقدير يقترب من القيمة الفعلية كلما زاد حجم العينة ، ويؤول إليها عندما يزداد حجم العينة إلى ما لا نهاية .</p>	<p>$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C F_x dx + F_y dy + F_z dz$ حيث F_x, F_y, F_z هي مركبات القوة</p>

معادلات خطية متآلفة عددها m في n من المجاهيل

consistent m linear equations in n unknowns

تكون المعادلات متآلفة إذا ، فقط إذا ، كانت رتبة مصفوفة المعاملات مساوية لرتبة المصفوفة الموسعة ، وإذا كان كل حد من الحدود المطلقة في مجموعة المعادلات الخطية يساوي صفراً (أى إذا كانت المعادلات متجانسة) فإن حل المعادلات يكون هو الحل الصفري ويطلق عليه الحل التافه .

حلول معادلات خطية متآلفة عددها n في n من المجاهيل

consistent n linear equations in n unknowns, solutions of

هناك ثلاث حالات :

١ - إذا كان محدد المعاملات Δ لا يساوى الصفر فإن المعادلات يكون لها حل وحيد وتكون متآلفة ومستقلة .

٢ - إذا كان Δ يساوى الصفر وجميع المحددات Δ التي نحصل عليها باستبدال معاملات المجهول x_i بالحدود المطلقة تساوى الصفر يكون للمعادلات عدد لا نهائى من الحلول وتكون متآلفة وغير مستقلة .

تقدير متوافق (لمجهول)

consistent estimate (on an unknown)

تقدير لكمية مجهولة يقترب من قيمة هذه الكمية كلما ازداد حجم العينة المستخدمة .

فروض متآلفة

consistent hypotheses

فروض لا يناقض الواحد منها الآخر .

(انظر : فرض hypothesis) .

حلول معادلات خطية متجانسة متآلفة عددها m في n من المجاهيل

consistent m homogenous linear equations in n unknowns, solutions of

هناك ثلاث حالات :

١ - إذا كان $m > n$ ، يكون للمعادلات حل غير الحل التافه (trivial solution) .

٢ - إذا كان $m = n$ ، يكون للمعادلات حل غير الحل التافه إذا ، فقط إذا ، كان محدد المعاملات مساوياً للصفر .

٣ - إذا كان $m < n$ ، يكون للمعادلات حل غير الحل التافه إذا ، فقط إذا ، كانت رتبة مصفوفة المعاملات أصغر من n .

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>(انظر : annuities, consolidated) .</p>	<p>٣ - إذا كان Δ يساوى الصفر وواحد على الأقل من المحددات Δ ^س لا يساوى الصفر لا يكون للمعادلات أى حل وتكون غير متآلفة .</p>
<p>constant ثابت كمية لا تتغير قيمتها أو مقدارها ، أو رمز يمثل نفس الكمية خلال إجراء متتابعة من العمليات الرياضية .</p>	<p>consistent postulates مسلميات متآلفة مسلمات لا يناقض الواحدة منها الأخرى .</p>
<p>constant, absolute ثابت مطلق (انظر : absolute constant) .</p>	<p>نظام متآلف من المعادلات consistent system of equations نظام من المعادلات له حل واحد على الأقل . ويكون النظام غير متآلف (inconsistent) إذا كانت مجموعة الحل له هي المجموعة الخالية .</p>
<p>constant, arbitrary ثابت اختياري ثابت يمكن أن يأخذ قيماً مختلفة مثل ثابت التكامل .</p>	<p>الآلة الكاتبة للحاسب console typewriter آلة كاتبة تتصل بالحاسب عن طريق لوحة مفاتيح لإدخال الرسائل الاستعلامية والأوامر الخاصة بتشغيل الحاسب واستقبال الرسائل منه .</p>
<p>ثابت الثقائل (الجاذبية) constant, gravitational (انظر: قانون نيوتن للثقائل) gravitational law, Newton's .</p>	<p>سنيات مجمدة consolidated annuities = consols.</p>
<p>constant of integration ثابت التكامل ثابت اختياري يضاف لأي دالة ناتجة من</p>	

معجم الرياضيات

(انظر : الحد المطلق absolute term) .	التكامل للحصول على كل مقابلات المشتقة . فمثلاً التكامل $\int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C$ ، حيث C ثابت (لا يتوقف على x) .
<p>سرعة ثابتة constant velocity = سرعة منتظمة = uniform velocity السرعة التي يتحرك بها جسم يقطع مسافات متساوية في الاتجاه نفسه في فترات زمنية متساوية ، أى أن السرعة الثابتة تمثل بنفس المتجه عند كل نقطة من نقط المسار وهو خط مستقيم .</p>	<p>ثابت التناسب . constant of proportionality = معامل التناسب = factor of proportionality القيمة الثابتة للنسبة بين كميتين متناسبتين ، وتكتب هذه العلاقة عادة على الصورة : $y = kx$ ، حيث k ثابت التناسب أو معامل التناسب . فمثلاً ، تتناسب المسافة المقطوعة مع الزمن عند ثبوت السرعة ، أى أن $v = \frac{s}{t}$ ، حيث v ثابت التناسب أو معامل التناسب .</p>
<p>الثوابت الأساسية constants, essential مجموعة الثوابت الاختيارية وهى الثوابت التى عددها مساو لعدد النقط اللازمة لتحديد منحنى وحيد من منحنيات العائلة التى تمثلها معادلة .</p>	<p>سرعة قيمتها ثابتة constant speed (انظر : speed) .</p>
<p>ثابتا "لامى" constants, Lamé's ثابتان موجبان λ ، μ ، وضعهما "لامى" ، يحددان تماماً خواص المرونة لجسم موحد الخواص (أيستروبي) . ويرتبطان مع معامل "يونسج" Young (ي) ونسبة بواسون Poisson .</p>	<p>الحد الثابت فى معادلة أو دالة constant term in an equation or function = الحد المطلق فى معادلة أو دالة = absolute term in an equation or function</p>

<p>وتر التماس contact, chord of (انظر : chord of contact) .</p>	<p>(ك) بالضعفتين : $\frac{\gamma}{(\kappa+1)^2} = \mu , \frac{\gamma \kappa}{(\kappa^2-1)(\kappa+1)} = \lambda$ ويسمى الثابت μ معامل الجساءة (modulus of rigidity) أو معامل القص (shear modulus) .</p>
<p>رتبة تماس منحنين contact of two curves, order of يقال إن رتبة تماس منحنين تساوى n إذا تساوت مشتقاتهما من الرتبة n عند نقطة التماس لكل $m \geq n$ ، واختلفت مشتقاتهما من الرتبة $(n+1)$ عند نقطة التماس .</p>	<p>عدد الثوابت الأساسية constants, the number of essential (انظر : الثوابت الأساسية) essential constants .</p>
<p>نقطة التماس contact, point of (انظر : المماس لمنحنى tangent to a curve) .</p>	<p>حركة مقيدة constrained motion حركة يحد فيها مسار الجسم . مثال ذلك حركة خرزة على سلك أو حركة كرة على سطح .</p>
<p>٦٨٦ - محتوى فئة من النقط content of a set of points = Jordan content of a set of points إذا كان المحتوى الخارجى لفئة من النقط مساوياً للمحتوى الداخلى لها ، فإن أيّاً منها يسمى محتوى فئة النقط .</p>	<p>إنشاء construction ١ (عملية رسم شكل هندسى يحقق شروطاً معينة .</p>
<p>٦٨٧ - المحتوى الخارجى لفئة من النقط content of a set of points, exterior</p>	<p>٢ (رسم الشكل الهندسى الخاص بالنظرية ، وإضافة أى أجزاء للشكل يحتاج الإثبات إليها .</p>

يساوى الصفر .	= outer content of a set of points = exterior Jordan content of a set of points
المحتوى الصفرى لفئة من النقط content zero of a set of points إذا كان المحتوى الخارجى لفئة النقط يساوى الصفر ، فإن المحتوى الداخلى للفئة يساوى الصفر أيضاً ، ويقال أن الفئة لها محتوى صفرى . مثال ذلك ، الفئة	المحتوى الخارجى لفئة من النقط هو أكبر حد سفلى لمجاميع أطوال عدد محدود من الفترات (المفتوحة أو المغلقة) بحيث تنتمى كل نقطة من نقط الفئة لفترة منها ولجميع مثل هذه الفئات من الفترات . مثال ذلك ، فئة الأعداد الكسرية فى الفترة (صفر ، ١) لها محتوى خارجى يساوى ١ .
لها محتوى صفرى .	
الزاوية بين مماسين contingence, angle of الزاوية بين الاتجاهين الموجبين للمماسين لمنحنٍ مستوٍ عند نقطتين من نقطه .	المحتوى الداخلى لفئة من النقط content of a set of points, interior = inner content of a set of points = interior Jordan content of a set of points المحتوى الداخلى لفئة من النقط هو أصغر حد علوى لمجاميع أطوال عدد محدود من الفترات (المفتوحة أو المغلقة) غير المتقاطعة كل منها محتواة تماماً فى الفئة مع اعتبار جميع هذه المجموعات من الفترات ويعرف المحتوى الداخلى أيضاً بأنه الفرق بين طول فترة ما تحتوى فئة النقط والمحتوى الخارجى لمكاملة فئة النقط بالنسبة للفترة . مثال ذلك ، فئة الأعداد الكسرية فى الفترة (صفر ، ١) لها محتوى داخلى
زاوية التماس الجيوديسى contingence, angle of a geodesic زاوية التماس الجيوديسى لنقطتين م، له من نقط منحنى م على سطح ما هى زاوية تقاطع الجيوديسىين المماسين للمنحنى م عند م، له .	

contingent annuity سنهية مشروطة
(انظر : annuity, contingent) .

continuation notation رمز استمرار
ثلاث نقط أو شرط تلى عدداً من الحدود
المبينة .

وإذا كان عدد الحدود لا نهائياً ، فمن المتبع
كتابة عدد قليل من الحدود الأولى ، يليها ثلاث
نقط ، ثم الحد العام ، وأخيراً ثلاث نقط ،
كالتالى :

$$1 + s + s^2 + \dots + s^n + \dots$$

امتداد تحليلى لدالة تحليلية فى متغير
مركب

continuation of an analytic function of
a complex variable, analytic.

(انظر : analytic continuation of an
analytic function of a complex variable) .

استمرارية الإشارة فى كثيرة حدود
continuation of sign in a polynomial

تكرار نفس الإشارة الجبرية قبيل الحدود
المتعاقبة فى كثيرة الحدود .

جدول إمكان الحدوث (فى الإحصاء)

contingency table (in statistics)

إذا أمكن تصنيف فئة من المفردات معاً
على أساس عاملين أحدهما له م من الفصول
الجزئية والآخر له ن من الفصول الجزئية ،
فإن الجدول الناتج للتصنيف يسمى جدول
إمكان الحدوث ويكون فى هذه الحالة من النوع
م × ن .

وعندما تكون م = ن = ٢ يكون جدول إمكان
الحدوث من نوع ٢ × ٢

two-by-two contingency table,

مثال ذلك ، تصنيف الأفراد على أساس
الجنس والتعلم ، نحصل على الجدول :

الأمية	الجنس		
	ذكر	أنثى	
متعلم	١٠	٩	١٩
أمية	٨	٩	١٧
	١٨	١٨	

ويعرف هذا الجدول أيضاً بالجدول الرباعى
. four fold table

كسر متسلسل دورى
continued fraction, periodic
 = كسر متسلسل تكررارى
 = **continued fraction, recurring**
 إذا تكررت متتابعة معينة من الألفات « P »
 أو الباءات « ب » دورياً ، فإن الكسر المتسلسل
 يقال له كسر متسلسل دورى .
 (انظر : كسر متسلسل)
 . continued fraction

كسر متسلسل منته
continued fraction, terminating
 كسر متسلسل عدد حدوده محدود .
 (انظر : كسر متسلسل)
 . continued fraction

٧٠٢ - حاصل الضرب المتسلسل
continued product
 عملية ضرب عدد لا نهائى من الحدود ،
 أو ضرب حدود على الصورة (٣ × ٢) × ٤
 لأكثر من معاملين ، ويعبر عنه رمزياً باستخدام
 الرمز \prod . فمثلاً ،

$$\dots \left(\frac{n}{1+n} \right) \dots \left(\frac{3}{4} \right) \left(\frac{2}{3} \right) \left(\frac{1}{2} \right)$$

التساوى المتسلسل **continued equality**
 مساواة ثلاثة مقادير أو أكثر بواسطة علامتين
 أو أكثر من علامات التساوى فى تعبير متصل ،
 مثال ذلك ،

$$P = B = C ، أود (س ، ص) =$$

$$مر (س ، ص) = و (س ، ص) .$$

كسر متسلسل **continued fraction**
 عدد مضاف إليه كسر مقامه عدد مضاف إليه
 كسر ، وهكذا . مثال ذلك ،

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4 + \dots}}}}$$

وقد يكون للكسر المتسلسل عدد محدود من
 الحدود أو عدد لا نهائى منها .

كسر متسلسل غير منته
continued fraction, nonterminating
 كسر متسلسل عدد حدوده لا نهائى .
 (انظر : كسر متسلسل)
 . continued fraction

<p>مبدأ الاتصال</p> <p>continuity, principle of</p> <p>(انظر : مسلمة الاتصال axiom of continuity)</p>	$\left(\frac{r}{1+r} \right) \prod_{n=1}^{\infty} =$
<p>سنة مستديمة</p> <p>continuous annuity</p> <p>(انظر : annuity, continuous)</p>	<p>تناسب متسلسل</p> <p>continued proportion</p> <p>كميات مرتبة بحيث تكون النسبة بين الأولى والثانية منها هي نفس النسبة بين أى كمية فيها والتي تليها ، فمثلاً الكميات ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨١ ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ، ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٣ ، ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ، ١٦٥ ، ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، ١٧٥ ، ١٧٦ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٦ ، ١٩٧ ، ١٩٨ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٢١٤ ، ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، ٢٢٤ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٥٤ ، ٢٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤ ، ٢٦٥ ، ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨٢ ، ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٢٩٩ ، ٣٠٠ ، ٣٠١ ، ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ ، ٣١١ ، ٣١٢ ، ٣١٣ ، ٣١٤ ، ٣١٥ ، ٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ، ٣٢١ ، ٣٢٢ ، ٣٢٣ ، ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، ٣٢٧ ، ٣٢٨ ، ٣٢٩ ، ٣٣٠ ، ٣٣١ ، ٣٣٢ ، ٣٣٣ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤١ ، ٣٤٢ ، ٣٤٣ ، ٣٤٤ ، ٣٤٥ ، ٣٤٦ ، ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ٣٥٠ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ ، ٣٥٣ ، ٣٥٤ ، ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، ٣٥٧ ، ٣٥٨ ، ٣٥٩ ، ٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٣٦٢ ، ٣٦٣ ، ٣٦٤ ، ٣٦٥ ، ٣٦٦ ، ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، ٣٦٩ ، ٣٧٠ ، ٣٧١ ، ٣٧٢ ، ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، ٣٧٥ ، ٣٧٦ ، ٣٧٧ ، ٣٧٨ ، ٣٧٩ ، ٣٨٠ ، ٣٨١ ، ٣٨٢ ، ٣٨٣ ، ٣٨٤ ، ٣٨٥ ، ٣٨٦ ، ٣٨٧ ، ٣٨٨ ، ٣٨٩ ، ٣٩٠ ، ٣٩١ ، ٣٩٢ ، ٣٩٣ ، ٣٩٤ ، ٣٩٥ ، ٣٩٦ ، ٣٩٧ ، ٣٩٨ ، ٣٩٩ ، ٤٠٠ ، ٤٠١ ، ٤٠٢ ، ٤٠٣ ، ٤٠٤ ، ٤٠٥ ، ٤٠٦ ، ٤٠٧ ، ٤٠٨ ، ٤٠٩ ، ٤١٠ ، ٤١١ ، ٤١٢ ، ٤١٣ ، ٤١٤ ، ٤١٥ ، ٤١٦ ، ٤١٧ ، ٤١٨ ، ٤١٩ ، ٤٢٠ ، ٤٢١ ، ٤٢٢ ، ٤٢٣ ، ٤٢٤ ، ٤٢٥ ، ٤٢٦ ، ٤٢٧ ، ٤٢٨ ، ٤٢٩ ، ٤٣٠ ، ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٣ ، ٤٣٤ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٣٩ ، ٤٤٠ ، ٤٤١ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ ، ٤٤٤ ، ٤٤٥ ، ٤٤٦ ، ٤٤٧ ، ٤٤٨ ، ٤٤٩ ، ٤٥٠ ، ٤٥١ ، ٤٥٢ ، ٤٥٣ ، ٤٥٤ ، ٤٥٥ ، ٤٥٦ ، ٤٥٧ ، ٤٥٨ ، ٤٥٩ ، ٤٦٠ ، ٤٦١ ، ٤٦٢ ، ٤٦٣ ، ٤٦٤ ، ٤٦٥ ، ٤٦٦ ، ٤٦٧ ، ٤٦٨ ، ٤٦٩ ، ٤٧٠ ، ٤٧١ ، ٤٧٢ ، ٤٧٣ ، ٤٧٤ ، ٤٧٥ ، ٤٧٦ ، ٤٧٧ ، ٤٧٨ ، ٤٧٩ ، ٤٨٠ ، ٤٨١ ، ٤٨٢ ، ٤٨٣ ، ٤٨٤ ، ٤٨٥ ، ٤٨٦ ، ٤٨٧ ، ٤٨٨ ، ٤٨٩ ، ٤٩٠ ، ٤٩١ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥ ، ٤٩٦ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨ ، ٤٩٩ ، ٥٠٠ ، ٥٠١ ، ٥٠</p>

يقال للتناظر (سواء كان دالة أو راسماً أو تحويلاً) الذى يقرب كل نقطة في فضاء E بنقطة وحيدة في فضاء آخر F إنه تناظر متصل إذا وجدت نقطة s مناظرة لكل نقطة s^* ووجد لكل جوار J s^* للنقطة s^* ، جوار J s للنقطة s بحيث يحوى J s^* جميع نقط s التى تتناظر مع نقط من J s . ويكون التناظر الذى يرسم E فوق F متصلاً إذا ، وفقط إذا ، كان معكوس كل فئة مفتوحة من F فئة مفتوحة في E ، حيث معكوس فئة V في F هي فئة جميع نقط E المناظرة لنقط V .

دالة مطلقة الاتصال

continuous function, absolutely

(انظر :
absolutely continuous function)

دالة نصف متصلة سفلياً عند نقطة

continuous function at a point, lower semi-

الدالة D (s) التى تحقق :

$D(s) < D(s_0)$ - s_0 لاي عدد موجب اختياري ϵ لجميع قيم s في جوار ما للنقطة s_0 تكون نصف متصلة سفلياً عند النقطة

s_0 . فمثلاً ، الدالة D المعرفة كالتالى :

$D(s) = 0$ إذا كانت s \neq صفراً ،
 $D(0) = 1$ -
نصف متصلة سفلياً عند $s = 0$ صفراً .

دالة نصف متصلة علوياً عند نقطة

continuous function at a point, upper semi-

الدالة D (s) التى تحقق :

$D(s) > D(s_0) + \epsilon$ لاي عدد موجب اختياري ϵ لجميع قيم s في جوار ما للنقطة s_0 تكون نصف متصلة علوياً عند النقطة s_0 . فمثلاً الدالة D المعرفة كالتالى :
 $D(s) = 0$ إذا كانت s \neq صفراً ،
 $D(0) = 1$ -
نصف متصلة علوياً عند $s = 0$ صفراً .

دالة متصلة في جوار نقطة

continuous function in the neighbourhood of a point

إذا وجد جوار لنقطة تكون فيه الدالة D متصلة عند كل نقطة من نقطه يقال أن الدالة D متصلة في جوار هذه النقطة ، أى أن الدالة $D(s_1, s_2, \dots, s_n)$ تكون متصلة

دالة في n من المتغيرات متصلة عند نقطة
continuous function of n variables at
a point

تكون الدالة d (س₁ ، س₂ ، ... ، س_n)
في n من المتغيرات س₁ ، س₂ ، ... ، س_n
متصلة عند النقطة (أ₁ ، أ₂ ، ... ، أ_n) إذا
كانت معرفة على جوار للنقطة وكانت نهاية الدالة
عندما تقترب المتغيرات من قيمها عند النقطة
تساوى d (أ₁ ، أ₂ ، ... ، أ_n) ، أي إذا كان
لكل $\epsilon > 0$ صفري يوجد $\delta > 0$ صفري بحيث إذا كان
البعد بين النقطتين (أ₁ ، أ₂ ، ... ، أ_n) ،
(س₁ ، س₂ ، ... ، س_n) أقل من δ ، فإن
 d (س₁ ، س₂ ، ... ، س_n) تكون معرفة وتحقق :
 $|d(س_1, \dots, س_n) - d(أ_1, \dots, أ_n)| < \epsilon$

دالة في n من المتغيرات متصلة في منطقة
continuous function of n variables in a
region

يقال أن دالة في n من المتغيرات متصلة في
منطقة إذا كانت متصلة عند كل نقطة من نقط
المنطقة .

دالة في متغير واحد متصلة عند نقطة
continuous function of one variable at
a point

في جوار للنقطة (أ₁ ، أ₂ ، ... ، أ_n) إذا
وجد عدد موجب ϵ بحيث تكون الدالة d
متصلة عند كل نقطة (ب₁ ، ب₂ ، ... ، ب_n)
ب_n تحقق $|ب_n - أ_n| < \epsilon$ لكل n ،
أو تحقق :

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ |ب_n - أ_n| = \epsilon}} [|ب_n - أ_n|] = 0$$

دالة في متغير مركب متصلة في مجال
continuous function of a complex
variable in a domain

يقال أن دالة في متغير مركب متصلة في مجال
إذا كانت متصلة عند كل نقطة فيه .

دالة في متغير حقيقي واحد متصلة على
فترة

continuous function of a real variable
in an interval

يقال أن دالة في متغير حقيقي واحد متصلة
على فترة إذا كانت متصلة عند كل نقطة من نقط
الفترة .

دالة في متغيرين متصلة في منطقة
continuous function of two variables
in a region

تكون دالة في متغيرين متصلة في منطقة
إذا كانت متصلة عند كل نقطة من نقط
المنطقة .

دالة متصلة على يسار نقطة
continuous function on the left
of a point

الدالة $D(s)$ في المتغير الحقيقي s تكون
متصلة على يسار النقطة s_0 إذا وجد لكل
 $\epsilon > 0$ عدد $\delta > 0$ صغير بحيث يكون :
 $|D(s) - D(s_0)| < \epsilon$ لكل s واقعة
بين $s_0 - \delta$ و s_0 .

دالة متصلة على يمين نقطة
continuous function on the right of a
point

الدالة $D(s)$ في المتغير الحقيقي s تكون
متصلة على يمين النقطة s_0 إذا وجد لكل
 $\epsilon > 0$ عدد $\delta > 0$ صغير بحيث يكون
 $|D(s) - D(s_0)| < \epsilon$ لكل s واقعة
بين s_0 و $s_0 + \delta$.

الدالة $D(s)$ في متغير واحد تكون متصلة
عند النقطة $s = s_0$ ، إذا كانت $D(s)$ معرفة
لجميع قيم s في جوار ما للنقطة s_0 وكان
نهاية $D(s) = D(s_0)$ ،
 $s \rightarrow s_0$

أى إذا كان لكل $\epsilon > 0$ يوجد $\delta > 0$ صغير
بحيث أنه إذا كان $|s - s_0| < \delta$ ، فإن
 $D(s)$ تكون معرفة وتحقق المتباينة
 $|D(s) - D(s_0)| < \epsilon$

دالة في متغيرين متصلة عند نقطة
continuous function of two variables
at a point

الدالة $D(s, t)$ في المتغيرين s, t ،
تكون متصلة عند النقطة (s_0, t_0) إذا كانت
معرفة على جوار للنقطة (s_0, t_0) وكانت
 $D(s, t)$ تقترب من القيمة $D(s_0, t_0)$ ،
عندما تقترب s من s_0 وتقترب t من t_0 ، أى
إذا كان لكل $\epsilon > 0$ صغير يوجد $\delta > 0$ صغير
بحيث إذا كان :

$|s - s_0| < \delta$ ، $|t - t_0| < \delta$ ، فإن
 $D(s, t)$ تكون معرفة وتحقق المتباينة
 $|D(s, t) - D(s_0, t_0)| < \epsilon$.

مباراة متصلة continuous game

مباراة غير محدودة لكل لاعب فيها اكتناز مترابط مغلق ومحدود من الاستراتيجيات الخالصة والتي تأخذ عادة ممثلة لأعداد الفترة المغلقة [صفر ، ١] .

سطح متصل في منطقة

continuous surface in a given region

التمثيل البياني لدالة متصلة في متغيرين ، أى المحل الهندسى للنقط التي تحقق إحداثياتها الديكارتية معادلة على الصورة :

ع = د (س ، ص) ، حيث د (س ، ص) دالة متصلة في المتغيرين س ، ص في منطقة المستوى س ص التي تكون مسقط هذا السطح على هذا المستوى . فمثلاً ، نصف الكرة $E = \sqrt{2} - (S^2 + V^2)$ هي سطح متصل لأنها دالة متصلة في المنطقة المكونة من الدائرة $S^2 + V^2 = 2$ وداخليتها في المستوى س ص .

تحويل متصل

continuous transformation

(انظر : تناظر متصل)
continuous correspondence

دالة متصلة قطعة - قطعة

continuous function, piecewise

تكون الدالة د متصلة قطعة قطعة على منطقة ك إذا كانت معرفة على ك ويمكن تجزئ ك إلى عدد محدود من الأجزاء تكون الدالة د متصلة على داخلية كل جزء من هذه الأجزاء وتقترب الدالة من نهاية محدودة عندما تتحرك النقطة المحسوبة عندها الدالة في داخلية أى جزء لتقترب من نقطة حدية بأى طريقة . إذا كانت الدالة د في متغير واحد فإن ك تكون جزءاً من خط مستقيم وتكون الأجزاء فترات لكل منها نقطتان حديتان ، وإذا كانت الدالة د في متغيرين فإن ك تكون جزءاً من المستوى وتكون الأجزاء محدودة بمنحنيات بسيطة مغلقة .

دالة منتظمة الاتصال

continuous function, uniformly

تكون الدالة د (س) منتظمة الاتصال في الفترة (٢ ، ب) إذا وجد لأى ه < صفر عدد و < صفر بحيث يكون $|d(s) - d(s_0)| < h$ لكل $|s - s_0| < w$ ، وذلك لأى نقطة $s_0 \in (2, b)$. أى أن د تعتمد فقط على ه ولا تعتمد على قيمة س في الفترة .

<p>(انظر : تكامل مركب) complex integration</p>	<p>اكتناز مترابط continuum فئة مترابطة مكتنزة . فمثلاً ، أى فترة مغلقة على خط الأعداد الحقيقية هي اكتناز مترابط . ويكون الاكتناز المترابط مكافئاً طوبولوجياً لفترة مغلقة من الأعداد الحقيقية إذا ، وفقط إذا ، كان لا يحتوى على أكثر من نقطتين غير قطعتين .</p>
<p>contour lines (in geometry) خطوط مناسيب (فى الهندسة) خطوط الارتفاع عن مستوى ثابت وترسم على خريطة وتمر بمساقط النقط التى لها الارتفاع نفسه . وبالتالى فإن خطوط المناسيب لسطح ما هي مساقط جميع مقاطعه بمستويات موازية لمستوى الإسقاط ومتساوية بُعد بعضها عن بعض . فمثلاً ، خطوط مناسيب كرة مركزها نقطة الأصل فى المستوى ع = صفراً هي دوائر فى هذا المستوى مركزها نقطة الأصل وهي مساقط مقاطع الكرة بمستويات موازية للمستوى ع = صفراً .</p>	<p>(انظر : فئة مكتنزة compact set وفئة مترابطة connected set) ميكانيكا الأوساط المتصلة continuum mechanics علم دراسة خواص المواد البسائلة والجامدة باعتبار أنها توزيعات متصلة للمادة دون أى فراغات فيها .</p>
<p>contracted tensor ممتد مقتضب (انظر : اقتضاب ممتد) contraction of a tensor</p>	<p>الاكتناز المترابط للأعداد الحقيقية continuum of real numbers فئة جميع الأعداد الحقيقية القياسية وغير القياسية .</p>
<p>contraction of a tensor اقتضاب ممتد عملية الحصول على ممتد من النوع</p>	<p>تكامل كفاف contour integral</p>

<p>برهان بالتناقض</p> <p>contradiction, proof by</p> <p>(reductio-ad-absurdum)</p> <p>إحدى طرق البرهان غير المباشر ، فمثلاً إذا أريد إثبات أن عدد الأعداد الصحيحة هو لانهاى وبرهن على أن الفرض بأن عددها محدود هو تناقض نكون قد أثبتنا المطلوب .</p>	<p>(١-١ ، ١-٢) من ممتد من نوع (١-٢ ، ١-٣) وذلك بوضع دليل سفل للممتد من النوع (١-٣ ، ١-٤) مساوٍ لدليل علوى له ثم الجمع بالنسبة لهذا الدليل . فمثلاً ، اقتضاب ممتد مركباته</p> $\begin{matrix} ١-١ & ١-٢ & ١-٣ & ١-٤ \\ ١-٢ & ١-٣ & ١-٤ & ١-٥ \\ ١-٣ & ١-٤ & ١-٥ & ١-٦ \\ ١-٤ & ١-٥ & ١-٦ & ١-٧ \end{matrix}$ <p>هو الممتد الذى مركباته</p>
<p>المعاكس الإيجابى لتضمين</p> <p>contrapositive of an implication</p> <p>التضمين الناشئ بإحلال المقدم بنفى التالى وإحلال التالى بنفى المقدم . فالمعاكس الإيجابى للعبارة الشرطية $p \Rightarrow q$ هو العبارة الشرطية $\sim q \Rightarrow \sim p$. فالمعاكس الإيجابى للعبارة هي العبارة الشرطية :</p>	<p>وهو</p> $\begin{matrix} ١-١ & ١-٢ & ١-٣ & ١-٤ \\ ١-٢ & ١-٣ & ١-٤ & ١-٥ \\ ١-٣ & ١-٤ & ١-٥ & ١-٦ \\ ١-٤ & ١-٥ & ١-٦ & ١-٧ \end{matrix}$ <p>يسمى الممتد الناتج ممتداً مقتضباً</p> <p>contracted tensor</p>
<p>إذا كانت S تقبل القسمة على ٤ ، فإن S تقبل القسمة على ٢ هي العبارة الشرطية :</p> <p>« إذا كانت S لا تقبل القسمة على ٢ ، فإن S لا تقبل القسمة على ٤ » .</p> <p>والتضمين والمعاكس الإيجابى له متكافئان فهما صائبان معاً أو خاطئان معاً . والمعاكس الإيجابى لتضمين هو عكس المعكوس للتضمين أو معكوس العكس للتضمين .</p>	<p>التناقض (فى المنطق)</p> <p>contradiction (in logic)</p> <p>تقابل بين الإيجاب والسلب فى حدين أو قضيتين تحتويان على عنصريين لا يجتمعان . أى تكون العبارة أو الصيغة الرياضية تناقضاً إذا كانت قيمة الصواب لها خطأ دائماً . مثل العبارة :</p> <p>($p \wedge q$) ، حيث \wedge أداة الربط « و » ، \sim أداة النفى .</p>

الرموز العلوية $^1, ^2, \dots, ^n$ ،
التي مركباته :

$$^1 \quad ^2 \quad \dots \quad ^n$$

هي الأدلة العلوية للممتد .

ممتد علوى **contravariant tensor**

ممتد له أدلة علوية فقط ، أى أن مركباته
تكون على الصورة :

$$^1 \quad ^2 \quad \dots \quad ^n$$

إذا كان للممتد n من الأدلة العلوية فيقال
له ممتد علوى من الرتبة النونية **contravariant**
tensor of order n . وإذا كانت المتغيرات هي
 $s^1, s^2, s^3, \dots, s^n$ ، فإن التفاضلات $s^1, s^2, s^3, \dots, s^n$
تكون مركبات ممتد علوى من
الرتبة الأولى .

مجال اتجاهاى علوى

contravariant vector field

مجال ممتدى علوى من الرتبة الأولى .
(انظر : مجال ممتدى **tensor field**) .

المشتقة العلوية لممتد

contravariant derivative of a tensor

المشتقة العلوية للممتد من رتبة (r, s) الذى
مركباته

$$^1 \quad ^2 \quad \dots \quad ^n$$

هى الممتد الذى مركباته

$$^1 \quad ^2 \quad \dots \quad ^n$$

$$= \frac{\partial}{\partial s^\alpha} T^{\alpha\beta} = \frac{\partial}{\partial s^\alpha} T^{\alpha\beta}$$

حيث يستخدم مفهوم الجمع ، $\frac{\partial}{\partial s^\alpha}$ يساوى

$\frac{1}{r}$ من المرات المعامل المرافق للعنصر $\frac{\partial}{\partial s^\alpha}$

فى المحدد $\frac{\partial}{\partial s^\alpha} = \left\{ \frac{\partial}{\partial s^\alpha} \right\}$ ،

$$^1 \quad ^2 \quad \dots \quad ^n$$

هو المشتقة السفلية

(انظر : الاشتقاق السفلى لممتد
covariant derivative of a tensor)

الأدلة العلوية لممتد

contravariant indices of a tensor

إحدى طرق تشغيل الحاسبات يتم بمقتضاها تخزين الأوامر بتتابع تنفيذها .

مجال ضبط (فى الحاسب)

control field (in computer)

مجال ثابت الطول والموقع يحتوى على بيانات تستخدم فى الأغراض المختلفة للضبط والرقابة .

زمرة الضبط (فى الإحصاء)

control group (in statistics)

قد يكون من الضرورى لتقدير تأثير عامل معين ، مقارنة النتيجة بنتيجة موقف آخر لا يتضمن العامل المراد اختبار تأثيره أو يكون فيه هذا العامل ثابتاً . زمرة الضبط هى العينة التى لا تتضمن هذا العامل .

برنامج ضبط (فى الحاسب)

control programme (in computer)

برنامج للإشراف على تنفيذ عمليات معينة وللتنبه على أى أخطاء أثناء التنفيذ ولإجراء التعديلات اللازمة .

بطاقة التحكم control card

بطاقة تحتوى على دائرة منطقية تحكم عملية معينة لبرنامج عام أو لنظام تشغيل معين ، ومن ثم يستخدم عدد من هذه البطاقات للتحكم فى نظام التشغيل وتنفيذ برنامج خاص عن طريق البيانات الموجهة التى تحتوىها هذه البطاقات .

خريطة الضبط (فى الإحصاء)

control chart (in statistics)

الرسم البيانى الممثل لنتائج تصنيف منتج لعملية ، وهو عادة يتكون من خط مستقيم أفقى يوضح القيمة المتوسطة المتوقعة لصفة كمية خاصة ، وخطين مستقيمين على الجانبين يوضحان القادر المسموح به للتصنيف و (أو) الانحرافات العشوائية للمنتج .

مفتاح الضبط (فى الحاسب)

control component (in computer)

مفتاح للاختبار فى الحاسب لبدء العمل .

عداد تحكم control counter

= التحكم المتتابع

= control, sequential

<p>التقارب في المتوسط</p> <p>convergence in the mean</p> <p>يقال لمتتابعة من الدوال $f_n(x)$ (س) أنها تقترب في المتوسط الذي رتبته m وعلى الفترة أو المنطقة E من الدالة $f(x)$ (س) إذا كان :</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) - f(x) ^m dx = 0$	<p>يقترب من أو يؤول إلى converge, to</p> <p>١ - يقال لمتسلسلة أنها تقترب من (أو تؤول إلى) المقدار L إذا آل مجموع n حداً الأولى منها إلى النهاية L عندما تؤول n إلى ما لا نهاية .</p> <p>٢ - يقال لمنحنى أنه يقترب من خط تقربى أو من نقطة عندما تقترب المسافة بين المنحنى والخط التقربى أو النقطة إلى الصفر . مثال ذلك ، المنحنى الحلزوني القطبي $r = \frac{1}{\theta}$ يقترب من نقطة الأصل ، عندما تؤول θ إلى ∞ ، والمنحنى $y = \frac{1}{x}$ يقترب من محور السينات عندما تؤول x إلى ∞ ويقترب من محور الصادات عندما تؤول x إلى 0 .</p>
<p>فترة التقارب</p> <p>convergence, interval of</p> <p>متسلسلة القوى</p> $a_0 + a_1(x-b) + a_2(x-b)^2 + \dots$ <p>لجميع قيم x وإما أن يوجد عدد له بحيث تكون المتسلسلة تقاربية لجميع قيم x التي تحقق $x-b < R$ له وتباعدية لجميع قيم x التي تحقق $x-b > R$ له .</p> <p>وتسمى الفترة $(b-R, b+R)$ (له ، b + له) فترة تقارب المتسلسلة ، وقد تساوى له الصفر .</p> <p>وتكون المتسلسلة مطلقة التقارب إذا كان $x-b < R$ له ، ومنتظمة التقارب على أى فترة (c, d) بحيث</p> $b - R < c < d < b + R$	<p>التقارب في القياس</p> <p>convergence in measure</p> <p>يقال لمتتابعة $\{f_n\}$ من الدوال القابلة للقياس أنها تتقارب في القياس إلى الدالة f على الفئة S إذا وجد لكل زوج (p, ϵ) من الأعداد الموجبة عدد N بحيث يكون مقياس μ أقل من $\frac{1}{N}$ لكل $n < N$ ، حيث μ فئة جميع قيم f_n التي تحقق :</p> $ f_n(x) - f(x) \geq \epsilon$

تتقارب تقارباً منتظماً عندما $s \rightarrow \infty$ إذا
وجد لكل $\epsilon > 0$ صفر عدد N بحيث يكون
 $|a_n(s) - L| < \epsilon$
لكل n عندما $|s - s_0| < \delta$.

تقارب حاصل الضرب اللانهائي
convergence of an infinite product

يقال لحاصل الضرب اللانهائي
 $s_1, s_2, \dots, s_n, \dots$ أنه تقاربى إذا أمكن
اختيار قيمة ما ϵ بحيث تترب المتتابعة
" $s_1, s_2, \dots, s_n, \dots$ " من نهاية لا تساوى الصفر.
وعندما تكون قيمة حاصل الضرب
لانهاية، أو إذا تقاربت المتتابعة السابقة من
الصفر لجميع قيم n فإن حاصل الضرب يقال له
تباعدى.

(انظر : تباعد divergence) .

وإذا وجد عدد ϵ بحيث لا تتقارب المتتابعة
أولا تصبح لا نهائية فيقال أن حاصل الضرب
متذبذب.

(انظر : تذبذب oscillatory)

والشرط الضرورى والكافى لتقارب كل من
حاصل الضرب $\prod (1 + a_n)$ ،
 $\prod (1 - a_n)$ ، حيث $a_n < 1$ صفر لكل n ، هو
تقارب المجموع $\sum a_n$.

التقارب المنتظم لمتسلسلة

convergence of a series, uniform

يقال إن متسلسلة لا نهائية حدودها دوال
فى متغير حقيقى منتظمة التقارب إذا كانت
القيمة العددية للباقي منها بعد النون حداً
الأولى صغيرة بالقدر الكافى على الفترة المعطاة
عندما تكون n أكبر من عدد مختار كبير بدرجة
سافية.

أى أنه، إذا كان مجموع النون حداً الأولى
من متسلسلة يساوى $f(x)$ فإن المتسلسلة
تتقارب بانتظام إلى الدالة $f(x)$ فى الفترة
(a, b) إذا وجد لكل عدد اختيارى موجب
 ϵ عدد N يعتمد على ϵ بحيث إن
 $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$
لكل n أكبر من N ولكل x فى الفترة (a, b).

التقارب المنتظم لفئة من الدوال

convergence of a set of functions,
uniform

تقارب فئة من الدوال يكون الفرق فيه بين
كل دالة ونهايتها أصغر من نفس العدد
الاختيارى الموجب لنفس الفترة لقيم المتغير
المستقل. أى أنه، إذا وجدت لكل دالة f_n نهاية
 L_n عندما $s \rightarrow \infty$ ، فإن هذه الدوال

$$1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1$$

تقاربية لأن مجموعها يؤول إلى ٢ .

التقارب المطلق لمتسلسلة لا نهائية
convergence of an infinite series,
absolute

خاصية أن يكون مجموع القيم المطلقة لحدود
المتسلسلة مكوناً لمتسلسلة تقاربية . ويقال لمثل
هذه المتسلسلة أنها تتقارب تقارباً مطلقاً
converges absolutely أو أنها مطلقة التقارب
absolutely convergent . فمثلاً المتسلسلة

$$1 - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \dots$$

مطلقة التقارب .

اختبارات التقارب لمتسلسلة لا نهائية
convergence of an infinite series, tests for

الطرق التي تستخدم لمعرفة ما إذا كانت
المتسلسلة اللانهائية تقاربية أو تباعدية ومنها
اختبارات "آبل" Abel ، المقارنة comparison ،
"دريشليه" Dirichlet ، النسبة ratio ،
(راجع الاختبارات المذكورة) .

التقارب المطلق لحاصل ضرب لا نهائي
convergence of an infinite product,
absolute

يقال لحاصل الضرب $\prod (1 + a_n)$ أنه
يتقارب تقارباً مطلقاً إذا كانت المتسلسلة
مجموع $|a_n|$ مطلقة التقارب .
ويكون حاصل الضرب اللانهائي تقاربياً إذا
كان مطلق التقارب

(انظر : متسلسلة مطلقة التقارب)
absolutely convergent series .

تقارب متتابعة لا نهائية
convergence of an infinite sequence
تكون المتتابعة اللانهائية تقاربية إذا آلت إلى
نهاية . مثال ذلك المتتابعة

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

تقاربية لأنها

تؤول إلى الصفر .

تقارب متسلسلة لا نهائية
convergence of an infinite series

تكون المتسلسلة اللانهائية تقاربية إذا آلت
مجموعها إلى نهاية ، ومثال ذلك المتسلسلة

الكسر المتسلسل الذى ينتهى عند أحد
خارج القسمة فى الكسر المتسلسل الأصيل
(انظر : كسر متسلسل)
(continued fraction)

متسلسلة تقاربية **convergent series**
متسلسلة مجموعها محدود . وتتقارب
المتسلسلة إلى المجموع ل إذا كانت نهاية الحد
النونى للمتتابعة المكونة من المجاميع الجزئية
لحدود المتسلسلة تساوى ل . وهذا التقارب
قد يكون مطلقاً أو مشروطاً فى فترة ما أو
منتظماً .

متسلسلة دائمة التقارب
convergent series, permanently
متسلسلة تقاربية لجميع قيم المتغير
أو المتغيرات المتضمنة فى حدودها مثال ذلك ،
المتسلسلة

$$1 + s + \frac{s^2}{2} + \frac{s^3}{3} + \dots$$

مجموعها $\frac{1}{1-s}$ لجميع قيم s ، وهى بالتالى
متسلسلة دائمة التقارب وتسمى المتسلسلة
الأسية .

تقارب التكامل

convergence of an integral

خاصية أن يكون لتكامل معتل نهاية . فمثلاً

التكامل

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$$

يقترّب من النهاية $\frac{1}{2}$ عندما $s \rightarrow \infty$

التقارب فى الاحتمال

convergence, probability

إذا كانت s_1, s_2, s_3, \dots متتابعة
من المتغيرات العشوائية ، فإن s_n تتقارب فى
الاحتمال إلى ثابت له إذا آل احتمال كون
 $|s_n - h| > \epsilon$ إلى الصفر عندما $n \rightarrow \infty$
وذلك لكل $\epsilon < \text{صفر}$.

convergent

تقاربى

صفة لها خاصية التقارب .

تقاربى لكسر متسلسل

convergent of continued fraction

<p>إذا كان $S \Rightarrow R$ صـ تقريراً شرطياً فإن عكسه هو التقرير $R \Rightarrow S$ ، حيث مقدمة كل تقرير هي تالى التقرير الآخر .</p>	<p>نظام تخاطبى - نمط تخاطبى (فى الحاسب) conversational system (in computer)</p>
<p>فترة أو مدة التحويل conversion interval or period الفترة الزمنية بين الإضافات المتعاقبة للربح إلى الأصل .</p>	<p>= conversational mode نمط لتشغيل الوحدات الطرفية فى الحاسبات أساسه تبادل السؤال والجواب بين المستخدم والحاسب .</p>
<p>تحويل البيانات (فى الحاسب) conversion of data (in computer) تحويل البيانات من صورة إلى أخرى ، مثل : ١ - تحويل البيانات من لغة آلة إلى لغة آلة أخرى . ٢ - تحويل البيانات من صورة مسجلة على شريط ممغنط إلى صورة مكتوبة .</p>	<p>عكس نظرية ما converse of a theorem إذا اتفق فى نظريتين أن كان الفرض فى إحداها هو النتيجة فى الأخرى ، وكانت النتيجة فى النظرية الأولى هى الفرض فى الثانية ، قيل أن كلا من النظريتين عكس الأخرى . مثال ذلك النظريتان التاليتان : أ) إذا كان مجموع الزاويتين المتقابلتين فى الشكل الرباعى مساوياً لقائمتين ، كان الشكل الرباعى دائرياً . ب) إذا كان الشكل الرباعى دائرياً ، فإن مجموع كل زاويتين متقابلتين فيه يساوى قائمتين .</p>
<p>تحويل الأعداد conversion of numbers تحويل الأعداد من نظام عددى إلى نظام عددى آخر .</p>	<p>عكس تقرير شرطى converse of an implication</p>

إذا و- ١. خط مستقيم أفقى يقع المنحنى أعلاه ويكون محدباً تجاهه فإن المنحنى يكون محدباً لأسفل . وأحد الشروط الكافية لكى يكون المنحنى الممثل للمعادلة $v = d(s)$ محدباً لأسفل فى فترة ما هو أن تكون المشتقة الثانية $\frac{d^2v}{ds^2}$ موجبة لجميع نقاط الفترة عدا عدد محدود منها .

convex function دالة محدبة
يقال لدالة حقيقية $v = d(s)$ يحتوى نطاق تعريفها على فترة s أنها محدبة فى s إذا كان $d(b) \geq d(l)$ لـ (s) لـ أى ثلاثة أعداد a, b, c ، c من الفترة s بحيث :
 $a > b > c$ ، $d(a) > d(b) > d(c)$ ، $d(a)$ هى الدالة الخطية التى تنطبق مع $d(s)$ عند كلاً من a, c .

دالة محدبة معممة
convex function, generalized
إذا كانت $\{d\}$ عائلة من الدوال المتصلة على الفترة (a, b) بحيث يوجد لـ أى نقطتين (s_1, v_1) ، (s_2, v_2) ، (s_3, v_3) حيث $s_1 < s_2 < s_3$ ، $v_1 > v_2 > v_3$ عدداً مختلفان فى الفترة (a, b)

جداول التحويل (فى التأمين)
conversion tables (in insurance)
جداول تعطى أقساط التأمين وذلك للمعدلات المختلفة للفائدة المكافئة لسنهية معينة .

convex body جسم محدب
(انظر : body, convex) .

منحنى محدب مستوى
convex curve in a plane
منحنى إذا قطعه خط مستقيم فإنه يقطعه فى نقطتين فقط .

منحنى محدب تجاه نقطة (أو خط)
convex curve toward a point (or line)
يقال لقوس من منحنى أنه محدب تجاه نقطة (أو خط) إذا وقعت كل قطعة من القوس مقطوعة بوتر على نفس جانب الوتر الذى تقع فيه النقطة (أو الخط) .

منحنى محدب لأسفل
convex downward, curve

الجواب، المحدب المغلق لفئة
convex hull of a set, closed
 أصغر فئة محدبة مغلقة تحوى الفئة المعطاة ،
 وهى مغلفة القلفة المحدبة .

محدب طبقاً لمفهوم " ينسن "
convex in the sense of Jensen
 يقال أن الدالة $d(s)$ (س) المعرفة فى الفترة
 $[a, b]$ محدبة فى معنى طبقاً لفهم
 " ينسن " إذا كان

$$d\left(\frac{s_1 + s_2}{2}\right) \leq \frac{d(s_1) + d(s_2)}{2}$$

لكل $s_1, s_2 \in [a, b]$ بحيث
 $a < s_1 < s_2 < b$.

ارتباط خطى محدب
convex linear combination
 (انظر : combination, convex linear) .

مضلع محدب
convex polygon
 مضلع يقع بالكامل على جانب واحد من كل
 ضلع من أضلاعه . أى أن المضلع يكون محدباً
 إذا كان قياس كل زاوية داخلية له أقل من 180°

عنصر وحيد d^* من عناصر $\{d\}$ بجهة :
 $d^*(s_1) = s_1$ ، $d^*(s_2) = s_2$.
 فإنه يقال للدالة d أنها دالة محدبة معممة بالنسبة
 للعائلة $\{d\}$.

دالة محدبة لوغاريتمياً
convex function, logarithmically
 دالة لزوجية أريتمها دالة محدبة ، ومن أمثلة
 الدوال المحدبة لوجاريتمياً دالة جابجا ، وهذه
 الدالة هى الدالة الوحيدة التى تكون سرفه
 زوجية لقيم s : حيث $s < 0$ و s و s^2 و s^3 و s^4 و s^5 و s^6 و s^7 و s^8 و s^9 و s^{10} و s^{11} و s^{12} و s^{13} و s^{14} و s^{15} و s^{16} و s^{17} و s^{18} و s^{19} و s^{20} و s^{21} و s^{22} و s^{23} و s^{24} و s^{25} و s^{26} و s^{27} و s^{28} و s^{29} و s^{30} و s^{31} و s^{32} و s^{33} و s^{34} و s^{35} و s^{36} و s^{37} و s^{38} و s^{39} و s^{40} و s^{41} و s^{42} و s^{43} و s^{44} و s^{45} و s^{46} و s^{47} و s^{48} و s^{49} و s^{50} و s^{51} و s^{52} و s^{53} و s^{54} و s^{55} و s^{56} و s^{57} و s^{58} و s^{59} و s^{60} و s^{61} و s^{62} و s^{63} و s^{64} و s^{65} و s^{66} و s^{67} و s^{68} و s^{69} و s^{70} و s^{71} و s^{72} و s^{73} و s^{74} و s^{75} و s^{76} و s^{77} و s^{78} و s^{79} و s^{80} و s^{81} و s^{82} و s^{83} و s^{84} و s^{85} و s^{86} و s^{87} و s^{88} و s^{89} و s^{90} و s^{91} و s^{92} و s^{93} و s^{94} و s^{95} و s^{96} و s^{97} و s^{98} و s^{99} و s^{100} و s^{101} و s^{102} و s^{103} و s^{104} و s^{105} و s^{106} و s^{107} و s^{108} و s^{109} و s^{110} و s^{111} و s^{112} و s^{113} و s^{114} و s^{115} و s^{116} و s^{117} و s^{118} و s^{119} و s^{120} و s^{121} و s^{122} و s^{123} و s^{124} و s^{125} و s^{126} و s^{127} و s^{128} و s^{129} و s^{130} و s^{131} و s^{132} و s^{133} و s^{134} و s^{135} و s^{136} و s^{137} و s^{138} و s^{139} و s^{140} و s^{141} و s^{142} و s^{143} و s^{144} و s^{145} و s^{146} و s^{147} و s^{148} و s^{149} و s^{150} و s^{151} و s^{152} و s^{153} و s^{154} و s^{155} و s^{156} و s^{157} و s^{158} و s^{159} و s^{160} و s^{161} و s^{162} و s^{163} و s^{164} و s^{165} و s^{166} و s^{167} و s^{168} و s^{169} و s^{170} و s^{171} و s^{172} و s^{173} و s^{174} و s^{175} و s^{176} و s^{177} و s^{178} و s^{179} و s^{180} و s^{181} و s^{182} و s^{183} و s^{184} و s^{185} و s^{186} و s^{187} و s^{188} و s^{189} و s^{190} و s^{191} و s^{192} و s^{193} و s^{194} و s^{195} و s^{196} و s^{197} و s^{198} و s^{199} و s^{200} و s^{201} و s^{202} و s^{203} و s^{204} و s^{205} و s^{206} و s^{207} و s^{208} و s^{209} و s^{210} و s^{211} و s^{212} و s^{213} و s^{214} و s^{215} و s^{216} و s^{217} و s^{218} و s^{219} و s^{220} و s^{221} و s^{222} و s^{223} و s^{224} و s^{225} و s^{226} و s^{227} و s^{228} و s^{229} و s^{230} و s^{231} و s^{232} و s^{233} و s^{234} و s^{235} و s^{236} و s^{237} و s^{238} و s^{239} و s^{240} و s^{241} و s^{242} و s^{243} و s^{244} و s^{245} و s^{246} و s^{247} و s^{248} و s^{249} و s^{250} و s^{251} و s^{252} و s^{253} و s^{254} و s^{255} و s^{256} و s^{257} و s^{258} و s^{259} و s^{260} و s^{261} و s^{262} و s^{263} و s^{264} و s^{265} و s^{266} و s^{267} و s^{268} و s^{269} و s^{270} و s^{271} و s^{272} و s^{273} و s^{274} و s^{275} و s^{276} و s^{277} و s^{278} و s^{279} و s^{280} و s^{281} و s^{282} و s^{283} و s^{284} و s^{285} و s^{286} و s^{287} و s^{288} و s^{289} و s^{290} و s^{291} و s^{292} و s^{293} و s^{294} و s^{295} و s^{296} و s^{297} و s^{298} و s^{299} و s^{300} و s^{301} و s^{302} و s^{303} و s^{304} و s^{305} و s^{306} و s^{307} و s^{308} و s^{309} و s^{310} و s^{311} و s^{312} و s^{313} و s^{314} و s^{315} و s^{316} و s^{317} و s^{318} و s^{319} و s^{320} و s^{321} و s^{322} و s^{323} و s^{324} و s^{325} و s^{326} و s^{327} و s^{328} و s^{329} و s^{330} و s^{331} و s^{332} و s^{333} و s^{334} و s^{335} و s^{336} و s^{337} و s^{338} و s^{339} و s^{340} و s^{341} و s^{342} و s^{343} و s^{344} و s^{345} و s^{346} و s^{347} و s^{348} و s^{349} و s^{350} و s^{351} و s^{352} و s^{353} و s^{354} و s^{355} و s^{356} و s^{357} و s^{358} و s^{359} و s^{360} و s^{361} و s^{362} و s^{363} و s^{364} و s^{365} و s^{366} و s^{367} و s^{368} و s^{369} و s^{370} و s^{371} و s^{372} و s^{373} و s^{374} و s^{375} و s^{376} و s^{377} و s^{378} و s^{379} و s^{380} و s^{381} و s^{382} و s^{383} و s^{384} و s^{385} و s^{386} و s^{387} و s^{388} و s^{389} و s^{390} و s^{391} و s^{392} و s^{393} و s^{394} و s^{395} و s^{396} و s^{397} و s^{398} و s^{399} و s^{400} و s^{401} و s^{402} و s^{403} و s^{404} و s^{405} و s^{406} و s^{407} و s^{408} و s^{409} و s^{410} و s^{411} و s^{412} و s^{413} و s^{414} و s^{415} و s^{416} و s^{417} و s^{418} و s^{419} و s^{420} و s^{421} و s^{422} و s^{423} و s^{424} و s^{425} و s^{426} و s^{427} و s^{428} و s^{429} و s^{430} و s^{431} و s^{432} و s^{433} و s^{434} و s^{435} و s^{436} و s^{437} و s^{438} و s^{439} و s^{440} و s^{441} و s^{442} و s^{443} و s^{444} و s^{445} و s^{446} و s^{447} و s^{448} و s^{449} و s^{450} و s^{451} و s^{452} و s^{453} و s^{454} و s^{455} و s^{456} و s^{457} و s^{458} و s^{459} و s^{460} و s^{461} و s^{462} و s^{463} و s^{464} و s^{465} و s^{466} و s^{467} و s^{468} و s^{469} و s^{470} و s^{471} و s^{472} و s^{473} و s^{474} و s^{475} و s^{476} و s^{477} و s^{478} و s^{479} و s^{480} و s^{481} و s^{482} و s^{483} و s^{484} و s^{485} و s^{486} و s^{487} و s^{488} و s^{489} و s^{490} و s^{491} و s^{492} و s^{493} و s^{494} و s^{495} و s^{496} و s^{497} و s^{498} و s^{499} و s^{500} و s^{501} و s^{502} و s^{503} و s^{504} و s^{505} و s^{506} و s^{507} و s^{508} و s^{509} و s^{510} و s^{511} و s^{512} و s^{513} و s^{514} و s^{515} و s^{516} و s^{517} و s^{518} و s^{519} و s^{520} و s^{521} و s^{522} و s^{523} و s^{524} و s^{525} و s^{526} و s^{527} و s^{528} و s^{529} و s^{530} و s^{531} و s^{532} و s^{533} و s^{534} و s^{535} و s^{536} و s^{537} و s^{538} و s^{539} و s^{540} و s^{541} و s^{542} و s^{543} و s^{544} و s^{545} و s^{546} و s^{547} و s^{548} و s^{549} و s^{550} و s^{551} و s^{552} و s^{553} و s^{554} و s^{555} و s^{556} و s^{557} و s^{558} و s^{559} و s^{560} و s^{561} و s^{562} و s^{563} و s^{564} و s^{565} و s^{566} و s^{567} و s^{568} و s^{569} و s^{570} و s^{571} و s^{572} و s^{573} و s^{574} و s^{575} و s^{576} و s^{577} و s^{578} و s^{579} و s^{580} و s^{581} و s^{582} و s^{583} و s^{584} و s^{585} و s^{586} و s^{587} و s^{588} و s^{589} و s^{590} و s^{591} و s^{592} و s^{593} و s^{594} و s^{595} و s^{596} و s^{597} و s^{598} و s^{599} و s^{600} و s^{601} و s^{602} و s^{603} و s^{604} و s^{605} و s^{606} و s^{607} و s^{608} و s^{609} و s^{610} و s^{611} و s^{612} و s^{613} و s^{614} و s^{615} و s^{616} و s^{617} و s^{618} و s^{619} و s^{620} و s^{621} و s^{622} و s^{623} و s^{624} و s^{625} و s^{626} و s^{627} و s^{628} و s^{629} و s^{630} و s^{631} و s^{632} و s^{633} و s^{634} و s^{635} و s^{636} و s^{637} و s^{638} و s^{639} و s^{640} و s^{641} و s^{642} و s^{643} و s^{644} و s^{645} و s^{646} و s^{647} و s^{648} و s^{649} و s^{650} و s^{651} و s^{652} و s^{653} و s^{654} و s^{655} و s^{656} و s^{657} و s^{658} و s^{659} و s^{660} و s^{661} و s^{662} و s^{663} و s^{664} و s^{665} و s^{666} و s^{667} و s^{668} و s^{669} و s^{670} و s^{671} و s^{672} و s^{673} و s^{674} و s^{675} و s^{676} و s^{677} و s^{678} و s^{679} و s^{680} و s^{681} و s^{682} و s^{683} و s^{684} و s^{685} و s^{686} و s^{687} و s^{688} و s^{689} و s^{690} و s^{691} و s^{692} و s^{693} و s^{694} و s^{695} و s^{696} و s^{697} و s^{698} و s^{699} و s^{700} و s^{701} و s^{702} و s^{703} و s^{704} و s^{705} و s^{706} و s^{707} و s^{708} و s^{709} و s^{710} و s^{711} و s^{712} و s^{713} و s^{714} و s^{715} و s^{716} و s^{717} و s^{718} و s^{719} و s^{720} و s^{721} و s^{722} و s^{723} و s^{724} و s^{725} و s^{726} و s^{727} و s^{728} و s^{729} و s^{730} و s^{731} و s^{732} و s^{733} و s^{734} و s^{735} و s^{736} و s^{737} و s^{738} و s^{739} و s^{740} و s^{741} و s^{742} و s^{743} و s^{744} و s^{745} و s^{746} و s^{747} و s^{748} و s^{749} و s^{750} و s^{751} و s^{752} و s^{753} و s^{754} و s^{755} و s^{756} و s^{757} و s^{758} و s^{759} و s^{760} و s^{761} و s^{762} و s^{763} و s^{764} و s^{765} و s^{766} و s^{767} و s^{768} و s^{769} و s^{770} و s^{771} و s^{772} و s^{773} و s^{774} و s^{775} و s^{776} و s^{777} و s^{778} و s^{779} و s^{780} و s^{781} و s^{782} و s^{783} و s^{784} و s^{785} و s^{786} و s^{787} و s^{788} و s^{789} و s^{790} و s^{791} و s^{792} و s^{793} و s^{794} و s^{795} و s^{796} و s^{797} و s^{798} و s^{799} و s^{800} و s^{801} و s^{802} و s^{803} و s^{804} و s^{805} و s^{806} و s^{807} و s^{808} و s^{809} و s^{810} و s^{811} و s^{812} و s^{813} و s^{814} و s^{815} و s^{816} و s^{817} و s^{818} و s^{819} و s^{820} و s^{821} و s^{822} و s^{823} و s^{824} و s^{825} و s^{826} و s^{827} و s^{828} و s^{829} و s^{830} و s^{831} و s^{832} و s^{833} و s^{834} و s^{835} و s^{836} و s^{837} و s^{838} و s^{839} و s^{840} و s^{841} و s^{842} و s^{843} و s^{844} و s^{845} و s^{846} و s^{847} و s^{848} و s^{849} و s^{850} و s^{851} و s^{852} و s^{853} و s^{854} و s^{855} و s^{856} و s^{857} و s^{858} و s^{859} و s^{860} و s^{861} و s^{862} و s^{863} و s^{864} و s^{865} و s^{866} و s^{867} و s^{868} و s^{869} و s^{870} و s^{871} و s^{872} و s^{873} و s^{874} و s^{875} و s^{876} و s^{877} و s^{878} و s^{879} و s^{880} و s^{881} و s^{882} و s^{883} و s^{884} و s^{885} و s^{886} و s^{887} و s^{888} و s^{889} و s^{890} و s^{891} و s^{892} و s^{893} و s^{894} و s^{895} و s^{896} و s^{897} و s^{898} و s^{899} و s^{900} و s^{901} و s^{902} و s^{903} و s^{904} و s^{905} و s^{906} و s^{907} و s^{908} و s^{909} و s^{910} و s^{911} و s^{912} و s^{913} و s^{914} و s^{915} و s^{916} و s^{917} و s^{918} و s^{919} و s^{920} و s^{921} و s^{922} و s^{923} و s^{924} و s^{925} و s^{926} و s^{927} و s^{928} و s^{929} و s^{930} و s^{931} و s^{932} و s^{933} و s^{934} و s^{935} و s^{936} و s^{937} و s^{938} و s^{939} و s^{940} و s^{941} و s^{942} و s^{943} و s^{944} و s^{945} و s^{946} و s^{947} و s^{948} و s^{949} و s^{950} و s^{951} و s^{952} و s^{953} و s^{954} و s^{955} و s^{956} و s^{957} و s^{958} و s^{959} و s^{960} و s^{961} و s^{962} و s^{963} و s^{964} و s^{965} و s^{966} و s^{967} و s^{968} و s^{969} و s^{970} و s^{971} و s^{972} و s^{973} و s^{974} و s^{975} و s^{976} و s^{977} و s^{978} و s^{979} و s^{980} و s^{981} و s^{982} و s^{983} و s^{984} و s^{985} و s^{986} و s^{987} و s^{988} و s^{989} و s^{990} و s^{991} و s^{992} و s^{993} و s^{994} و s^{995} و s^{996} و s^{997} و s^{998} و s^{999} و s^{1000} و s^{1001} و s^{1002} و s^{1003} و s^{1004} و s^{1005} و s^{1006} و s^{1007} و s^{1008} و s^{1009} و s^{1010} و s^{1011} و s^{1012} و s^{1013} و s^{1014} و s^{1015} و s^{1016} و s^{1017} و s^{1018} و s^{1019} و s^{1020} و s^{1021} و s^{1022} و s^{1023} و s^{1024} و s^{1025} و s^{1026} و s^{1027} و s^{1028} و s^{1029} و s^{1030} و s^{1031} و s^{1032} و s^{1033} و s^{1034} و s^{1035} و s^{1036} و s^{1037} و s^{1038} و s^{1039} و s^{1040} و s^{1041} و s^{1042} و s^{1043} و s^{1044} و s^{1045} و s^{1046} و s^{1047} و s^{1048} و s^{1049} و s^{1050} و s^{1051} و s^{10

convex set

فئة محدبة

فئة تحوى القطعة المستقيمة الواصلة بين أى نقطتين من نقطتها . وفى الفراغ الاتجاهى ، هى فئة بحيث تنتمى m مرس $+ (1 - m)$ ص \vec{u} للفئة لكل صفر $0 < m < 1$ ولكل \vec{u} ، \vec{u} فى الفئة .

convex set, locally

فئة محدبة محلياً

فئة يوجد لكل نقطة s من نقطتها ولكل جوار \vec{u} للنقطة s جوار محدب \vec{u} محتوى فى الجوار \vec{u} .

فراغ حتمى التحذب

convex space, strictly

فراغ خطى معيّر بحيث إذا كان \vec{u} ، \vec{v} عنصرين من عناصره وكان

$$\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$$


$$\|\vec{u}\| \neq 0$$

فإنه يوجد عدد n بحيث $\vec{u} = n\vec{v}$.
 ويكون الفراغ النهائى البعد حتمى التحذب إذا ، وفقط إذا ، كان منتظم التحذب ، أما الفراغ اللانهائى البعد فيمكن أن يكون حتمى التحذب دون أن يكون منتظم التحذب .

انظر الشكل :



مضلع غير محدب



مضلع محدب

كثير السطوح المحدب

convex polyhedron

كثير سطوح يقع بالكامل على جانب واحد من كل مستوياً من مستويات أوجهه . أى ، كثير سطوح كل مقطع مستو له يكون مضلعاً محدباً .

convex sequence

متتابعة محدبة

متتابعة من الأعداد a_1, a_2, a_3, \dots

بحيث $a_1 \geq \frac{1}{2}(a_1 + a_2)$ لكل n .

المستوى السطح في منحنٍ محدب بعيداً عن خط تقاطع المستويين .

سطح محدب تجاه مستوى

convex surface toward a plane

يقال لسطح أنه محدب تجاه مستوى عندما يقطع كل مستوي عمودي على هذا المستوى السطح في منحنى محدب تجاه خط تقاطع المستويين .

منحنى محدب لأعلى

convex upward, curve

إذا وجد خط مستقيم أفقى يقع المنحنى أسفله ويكون محدباً تجاهه فإن المنحنى يكون محدباً لأعلى وأحد الشروط الكافية لكي يكون المنحنى الممثل بالمعادلة $y = d(x)$ محدباً لأعلى في فترة ما هو أن تكون المشتقة الثانية $\frac{d^2y}{dx^2}$ سالبة لجميع نقاط الفترة عدا عدد محدود منها .

حَوِيَّة دالتين

convolution of two functions

فراغ منتظم التحدب

convex space, uniformly

الفراغ الخطي المعيار يكون منتظم التحدب إذا وجد لكل $\epsilon > 0$ عدد $\delta > 0$ بحيث أن $\|x - y\| < \delta$ وإذا كان $\|x\| < 1 + \delta$ ، $\|y\| < 1 + \delta$ ، $\|x + y\| < 2$.

ويكون الفراغ النهائي البعد منتظم التحدب إذا ، وفقط إذا ، تناسب العنصران x, y ، $\|x\| < 1 + \delta$ ، $\|y\| < 1 + \delta$ ، $\|x + y\| < 2$.

$\|x\| + \|y\| = \|x + y\|$. وفراغ " هلبرت " منتظم التحدب . وأي فراغ " بناخ " منتظم التحدب يكون عاكساً ، وتوجد فراغات " بناخ " عاكسة وغير متشاكلة مع أي فراغ منتظم التحدب .

سطح محدب **convex surface**

سطح كل مقطع مستوي له يكون منحنياً محدباً .

سطح محدب بعيداً عن مستوى

convex surface away from a plane

يقال لسطح ما إنه محدب بعيداً عن مستوى معين إذا قطع كل مستوي عمودي على هذا

coordinate

إحداثى

كل واحد من مجموعة الأعداد التي تحدد موقع نقطة في الفراغ . إذا كانت النقطة تقع على خط مستقيم معين فإنه يلزم لتعيينها إحداثى واحد ، وإذا كانت تقع في مستوى ما فإنه يلزم لتعيينها إحداثيان ، وإذا كانت تقع في الفراغ فإنه يلزم لتعيينها ثلاثة إحداثيات .

تغيير إحداثى

= تحويل إحداثى (في الهندسة التفاضلية)

coordinate change (differential geometry)

= coordinate transformation

راسم : φ . $\psi^{-1} : \psi \cap (U \cap V) \rightarrow \psi$
 $\varphi(U \cap V)$ حيث (U, φ) ، (V, ψ) زوجا إحداثيات .

coordinate function دالة إحداثية

دالة تعرف أحد إحداثيات منحنى ما بدلالة متغير وسيط (بارامتر) . فإذا كانت :

ص = د (س) متحققة بمجموعة النقاط
 (U, φ) ، (V, ψ) فإن الدالتين
 $\varphi = \psi \circ \varphi \circ \psi^{-1}$ ، $\psi = \varphi \circ \psi \circ \varphi^{-1}$ هما الدالتان
 الإحداثيتان .

يقال للدالة

$\varphi = \psi \circ \varphi \circ \psi^{-1}$ ، $\psi = \varphi \circ \psi \circ \varphi^{-1}$
 الدالتين د (س) ، φ ، ψ ، وأحياناً يقال
 للدالة

له (س) = $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) \psi(x) dx$
 أنها حوية د (س) ، φ ، ψ ، ويطلق عليها
 أيضاً حوية ثنائية .

حوية متسلسلتى قوى

convolution of two power series

حوية متسلسلتى القوى

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ، $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$
 هي المتسلسلة $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ حيث $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$
 حيث $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$

وهي حاصل ضرب المتسلسلتين شكلياً حداً
 بحد .

cooperative game مباراة تعاونية

مباراة يسمح فيها بتكوين تحالفات بين
 اللاعبين .

ومنها الإحداثيات الديكارتية والإحداثيات القطبية .	هندسة إحداثية coordinate geometry = هندسة تحليلية = analytic geometry (انظر : analytic geometry) .
ثلاثي إحداثيات coordinate trihedral ثلاثى محاور الإحداثيات فى نظام الإحداثيات الديكارتية فى الفراغ .	ورقة إحداثيات coordinate paper ورقة ذات تسطير خاص يساعد على تعيين النقط ورسم المحال الهندسية للمعادلات .
إحداثيات كتلية coordinates, barycentric (انظر : barycentric coordinates) .	مستويات الإحداثيات coordinate planes (انظر : الإحداثيات الديكارتية) (cartesian coordinates)
إحداثيات ديكارتية coordinates, cartesian (انظر : cartesian coordinates) .	فراغ إحداثى coordinate space فراغ نونى البعد يمثل نظاماً له n من درجات الحرية وفيه تعين الإحداثيات الديكارتية مواضع نقط النظام .
إحداثيات مركبة coordinates, complex ١ - الإحداثيات التى تكون أعداداً مركبة . ٢ - إحداثيات تستخدم لتمثيل الأعداد المركبة فى المستوى . (انظر : أعداد مركبة) (complex numbers)	نظام إحداثيات coordinate system كل فئة من الأعداد التى تحدد موقع النقطة والخط المستقيم وكل شكل هندسى فى الفراغ ،

والإحداثيات p ، φ من الإحداثيات الاسطوانية ، في أى مستوى مواز للمستوى $E = 0$ صفراً يعينان إحداثيات قطبية لنقط المستوى والمنحنيات $p = \text{ثابت}$ هي دوائر متحدة المركز (القطب) ، والمنحنيات $\varphi = \text{ثابت}$ هي أشعة رأسها المركز .

الإحداثيات الناقصية الفراغية
coordinates, ellipsoidal

إحداثيات انحنائية متعامدة λ ، μ ، γ . ترتبط بالإحداثيات الديكارتية (x ، y ، z) بالعلاقات :

$$x = \sqrt{\lambda - \mu} \sqrt{\lambda - \gamma} \cos \varphi, \quad y = \sqrt{\lambda - \mu} \sqrt{\lambda - \gamma} \sin \varphi, \quad z = \sqrt{\mu - \gamma} \sqrt{\lambda - \gamma}$$

$$x = \sqrt{\mu - \gamma} \sqrt{\mu - \lambda} \cos \varphi, \quad y = \sqrt{\mu - \gamma} \sqrt{\mu - \lambda} \sin \varphi, \quad z = \sqrt{\lambda - \gamma} \sqrt{\mu - \lambda}$$

$$x = \sqrt{\gamma - \lambda} \sqrt{\gamma - \mu} \cos \varphi, \quad y = \sqrt{\gamma - \lambda} \sqrt{\gamma - \mu} \sin \varphi, \quad z = \sqrt{\lambda - \mu} \sqrt{\gamma - \mu}$$

والمعادلات الثلاث تمثل ثلاث عائلات من السطوح الناقصية المتحدة البؤر والمتعامدة متنى متنى .

إحداثيات متجانسة

coordinates, homogeneous

الإحداثيات الاسطوانية القطبية
coordinates, cylindrical polar

إحداثيات انحنائية متعامدة (p ، φ ، E) حيث عائلات السطوح الثلاثة هي :

١ - عائلة الاسطوانات الدائرية القائمة المتحدة المحور (محور E) :

$$x^2 + y^2 = p^2, \quad z = E, \quad 0 \leq p < \infty$$


٢ - أنصاف مستويات الزوال المحددة

$$\text{بمحور } E : \varphi = \text{ظا } \frac{y}{x}, \quad \frac{z}{E} = \text{ص}$$

$$\text{صفر } \varphi \geq 2\pi$$

٣ - المستويات الموازية للمستوى

$$E = \text{صفرًا}, \quad -\infty \leq E \leq \infty, \quad (\text{انظر الشكل})$$



وتعطى الإحداثيات الديكارتية بدلالة

الإحداثيات الاسطوانية القطبية بالعلاقات

$$x = p \cos \varphi, \quad y = p \sin \varphi, \quad z = E$$

ص¹ = ص² = ... = صⁿ = صفراً .

الإحداثيات الانحنائية لنقطة في الفراغ
coordinates of a point in space, curvilinear

المعادلة د (س ، ص ، ع) = λ تعرف عائلة من السطوح ، حيث λ ثابت يأخذ قيمةً مناظرة لكل سطح من هذه السطوح . إذا كان لدينا ثلاث عائلات من السطوح

د (س ، ص ، ع) = λ ،

د (س ، ص ، ع) = μ ،

د (س ، ص ، ع) = γ

فإن قيم λ ، μ ، γ المناظرة لإحداثيات نقطة تقاطع السطوح الثلاثة م (س ، ص ، ع) تسمى الإحداثيات الانحنائية لهذه النقطة .

وعادة توضع قيود على مجال قيم كل من λ ، μ ، γ ، ليكون التناظر أحادياً . وإذا كانت عائلات السطوح الثلاث متعامدة متنى متنى فإن (λ ، μ ، γ) تسمى في هذه الحالة بالإحداثيات الانحنائية المتعامدة

orthogonal curvilinear coordinates

الإحداثيات المماسية لسطح
coordinates of a surface, tangential

إذا كان س ، ص الإحداثيين الديكارتيين لنقطة في المستوى فإن الإحداثيات المتجانسة لهذه النقطة تكون الأعداد الثلاثة س₁ ، س₂ ، س₃ بحيث

$$\frac{س_1}{س_3} = س ، \frac{س_2}{س_3} = ص$$

وترجع هذه التسمية إلى أن أى معادلة في الإحداثيات الديكارتية تصبح متجانسة عند إبدال الإحداثيات الديكارتية بالإحداثيات المتجانسة ، فمثلاً ، المعادلة س³ + س ص² + ٩ = صفراً تصبح

$$س_1^3 + س_1 س_2^2 + ٩ س_3^3 = \text{صفراً}$$

عند استخدام الإحداثيات المتجانسة . وتُعرف الإحداثيات المتجانسة للفراغات ثلاثية البعد أو إذا كانت ذات أبعاد أكبر بطريقة مماثلة .


إحداثيات جيوديسية في فراغ "ريمان"
coordinates in Riemannian space, geodesic

إحداثيات (ص¹ ، ص² ، ... ، صⁿ) لنقطة بحيث تتلاشى كل معاملات "كريستوفل"

لـ (ص¹ ، ص² ، ... ، صⁿ) عند هذه

النقطة والتي تؤخذ كنقطة أصل :

وتعطى الإحداثيات الديكارتية بدلالة الإحداثيات الكروية القطبية بالعلاقات :
 $s = r \cos \theta$ ، $v = r \sin \theta \cos \phi$ ، $e = r \sin \theta \sin \phi$.



الإحداثيات المتماثلة

coordinates, symmetric

الإحداثيان r ، y لسطح $s = r$:
 $s = r$ ، $v = r \cos \theta$ ، $e = r \sin \theta$ ،
 القوس f بالعلاقة $(f, \theta) = r$ ،
 أى بحيث تكون $h = r = 0$ ، حيث h ، و ،
 ثم معاملات الصيغة الأساسية الأولى .

(انظر : الصيغة الأساسية الأولى
 first fundamental form)

إذا كانت l ، m ، n جيب تمام اتجاه العمود لسطح $s = r$ ، $v = r \cos \theta$ ، $e = r \sin \theta$ ،
 و r بعد نقطة الأصل عن المستوى المماس للسطح عند النقطة (s, v, e) على السطح ،
 فإن $r = s^2 + v^2 + e^2$. وتعين الدوال l ، m ، n ، و r السطح $s = r$ تماماً وتسمى الإحداثيات المماسية له .

الإحداثيات الكروية القطبية

coordinates, spherical polar

إحداثيات انحنائية متعامدة (r, θ, ϕ) :
 حيث عائلات السطوح الثلاثة هي :
 ١ - عائلة الكرات المتحدة المركز :
 $s^2 + v^2 + e^2 = r^2$ ، صفر $r \geq 0$.

٢ - عائلة المخاريط القائمة المتحدة المحور (محور e) والرأس (نقطة الأصل)
 $\theta = \cos^{-1} \frac{\sqrt{s^2 + v^2}}{r}$ ،
 صفر $0 \leq \theta \leq \pi$ ،

٣ - أنصاف مستويات الزوال المحددة بمحور e ،
 $\phi = \cos^{-1} \frac{v}{r}$ ، صفر $0 \leq \phi \leq \pi$.

<p>الحدود ليس لهما أى قاسم مشترك عدا الواحد . وعندما يتحقق هذا فإن كلاً منهما يقال أنه أولى بالنسبة للآخر مثال ذلك : العددان ٨ ، ٩ .</p> <p>مستويات ذات نقطة مشتركة</p> <p>copunctal planes</p> <p>ثلاثة مستويات أو أكثر لها نقطة مشتركة أو أكثر .</p>	<p>تحويل الإحداثيات</p> <p>coordinates, transformation of</p> <p>تحويل إحداثيات نقطة في نظام إحداثيات ما إلى إحداثيات في نظام إحداثيات آخر قد يكون من نفس النوع أو من نوع آخر . ومن أمثلته التحويلات الأفينية (الترابطية) ، والتحويلات الخطية ، ونقل المحاور ، ودوران المحاور ، والتحويل من الإحداثيات الديكارتية - إلى الإحداثيات القطبية المستوية أو الإحداثيات القطبية الكروية .</p>
<p>القلب (في نظرية الزمر)</p> <p>core (in group theory)</p> <p>قلب زمرة G هو أكبر زمرة جزئية عمودية للزمرة G ومحتواه في G حيث G تقاطع جميع مرافقات الزمرة الجزئية للزمرة G .</p>	<p>متحد المستوى</p> <p>coplanar</p> <p>صفة لما يقع في مستوى واحد فمثلاً مستقيمتان واقعة في نفس المستوى coplanar lines ونقط تقع في نفس المستوى coplanar points .</p>
<p>ذاكرة الخلايا الممغنطة (ذاكرة لوية)</p> <p>core storage</p> <p>نوع من وسائل التخزين في الحاسبات يتكون من مصفوفات من الحلقات القابلة للمغنطة (magnetic cores) بحيث تصبح الحالة التي تتمغنط فيها الحلقة ممثلة للقيمة « ١ » بينما تصبح الحالة التي لا تتمغنط فيها الحلقة ممثلة للقيمة « صفر » ومعظم نظم الحاسبات الموجودة حالياً</p>	<p>قوى متحدة المستوى</p> <p>coplanar forces</p> <p>مجموعة من القوى تقع جميع خطوط عملها في مستوى واحد .</p> <p>متحدا الأولية</p> <p>coprime</p> <p>= أوليان نسبياً = relatively prime</p> <p>زوج من الأعداد الصحيحة أو من كثيرات</p>

correct

صحيح

صفة لما لا يحتوى على خطأ مبدئى
أو حسابى ، وترد عادة العبارات : الإثبات
الصحيح ، والحل الصحيح ، والإجابة
الصحيحة ، والحساب الصحيح .

صحيح لنون من المراتب العشرية

correct to n decimal places

= دقيق لنون من المراتب العشرية

= accurate to n decimal places

(انظر :
accurate to n decimal places)

correction

تصحيح

إضافة عدد أو كمية جبرية إلى نتيجة عملية
أو طرحها منها لزيادة صحتها ، وأحياناً يستخدم
المصطلح للدلالة على الكمية المضافة ويطلق
عليه عندئذ اسم مصحح .

معامل التصحيح (فى الإحصاء)

correction coefficient (in statistics)

معامل يدخل فى حساب كمية ما لتحسين
تقديرها .

تتكون ذاكرتها الرئيسية من هذه الحلقات .
ويرجع الانتشار الذى تلاقيه هذه الوسيلة إلى
كونها لا تحتاج إلى تيار قوى لتخزين
البيانات ، لأن التحويل من القيمة « صفر » إلى
القيمة « ١ » يتم عن طريق تيارات ضعيفة
نسبياً .

Coriolis force قوة « كوريوليس »

قوة ظاهرية تؤثر فى جسم يتحرك على
امتداد نصف قطر مناط إسناد دوار فى اتجاه
مضاد لاتجاه دوران الجسم بالنسبة لمناط الإسناد
الثابت . وفى حالة جسيم كتلته له يتحرك بسرعة
مقدارها ع بالنسبة لمناط إسناد يدور بسرعة زاوية
 ω فإن هذه القوة تساوى 2ω له ع ، وفى حالة
الجسيمات الأرضية تكون ω هى السرعة الزاوية
لدوران الأرض ، ع سرعة الجسيم الذى كتلته
له .

(انظر : مناط إسناد
frame of reference)

corollary

نتيجة

نظرية تنتج مباشرة من برهان نظرية أخرى
ولا تحتاج غالباً إلى إثبات أو يكون إثباتها بسيطاً
جداً ومباشراً .

إذا فرض أن L_1 ، L_2 دالتان خطيتان في فئتين F_1 ، F_2 لمتغيرات عشوائية على الترتيب . فإن النهاية العظمى للارتباط بين L_1 ، L_2 بالنسبة للدوال الخطية تسمى الارتباط المقنن بين فئتي المتغيرات .

معامل الارتباط

correlation coefficient

= معامل الارتباط الخطي

= correlation coefficient, linear

عدد يقع بين -1 ، 1 ويوضح درجة الارتباط الخطي بين مجموعتين للبيانات . إذا كانت $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ ، $\{V_1, V_2, \dots, V_n\}$ مجموعتي البيانات فإن معامل الارتباط بينهما يقيس مدى قرب النقط (S_1, V_1) ، (S_2, V_2) ، (S_n, V_n) من الوقوع على خط مستقيم . وإذا كان $r = 1$ فإن جميع النقط تقع على خط مستقيم واحد ، ويقال لمجموعتي البيانات في هذه الحالة أنها ذات ارتباط تام perfect correlation . ومعامل الارتباط يساوى خارج قسمة مجموع حواصل ضرب الانحرافات الجبرية لكل زوج من الأرقام المتناظرة في المجموعتين على الجذر التربيعي لحاصل ضرب مجموع مربعات الانحرافات لكل

تصحيح « شيبارد » (في الإحصاء)

correction, Sheppard's (in statistics)

حساب العزوم من توزيع في مجموعات لمتغير يحوى خطأ لافتراض أن التكرارات تتمركز عند النقطة المتوسطة للفترة أو أى نقطة وحيدة .

ويمكن إجراء تصحيح للحصول على تقدير يكون صحيحاً في المتوسط . إذا كان Y_1 ، Y_2 يرمزان للعزم الرائي للتوزيع المتصل وللتوزيع المجمع على الترتيب ، فإن $Y_1 = Y_2$ ،

$Y_1 = Y_2 - \frac{h^2}{12}$ ، ... حيث h هو العرض

المنتظم لفترات التجميع .

مصحح « يات » (في الإحصاء)

correction, Yate's (in statistics)

المقدار χ^2 المحسوب لجدول من النوع

2×2 ، أو لاختبار نسبة ملاحظة ذات درجة حرية واحدة ، يكون منحازاً ، وذلك لأن χ^2 متصلة ، كما χ^2 متفرقة لحالة درجة الحرية

الواحدة للجدول من نوع 2×2 .

ارتباط مقنن correlation, canonical

إذا لم تكن دالة الانحدار التي تربط بين القيمة المتوقعة لمتغير س والقيمة المعطاة لمتغير ص دالة خطية في ص فإن المتغيرات تكون انحنائية الارتباط .

القطع الناقص للارتباط

correlation ellipse

منحنى ثبات دالة التكرار الطبيعي ثنائي المتغيرات normal bivariate frequency function وهو قطع ناقص يسمى القطع الناقص للارتباط .

الارتباط (في الرياضيات البحتة)

correlation (in pure mathematics)

تحويل خطي يحيل كل نقطة في المستوى إلى خط مستقيم وكل خط مستقيم فيه إلى نقطة ، وفي الفراغ يحيل كل نقطة إلى مستوى وكل مستوى إلى نقطة .

ارتباط بين الفصول

correlation, interclass

ارتباط بين متغيرين أو أكثر مع اعتبار كل متغير على أنه فصلاً منفصلاً .

مجموعة من البيانات ، أى أن :

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

حيث \bar{x} ، \bar{y} المتوسطات المناظرة . ويعرف معامل الارتباط بهذا أحياناً بمعامل " بيرسون " Pearson's coefficient .

معامل ارتباط الرتب

correlation coefficient, rank

نفرض أن r_1, r_2, \dots, r_p رتب القيم s_1, s_2, \dots, s_p على الترتيب وأن z_1, z_2, \dots, z_p رتب القيم v_1, v_2, \dots, v_p على الترتيب . إذا كان $r_i = z_i - z_j$ فإن المقدار

$$r = \frac{\sum_{i=1}^p (r_i - \bar{r})(z_i - \bar{z})}{\sqrt{\sum_{i=1}^p (r_i - \bar{r})^2 \sum_{i=1}^p (z_i - \bar{z})^2}}$$

يسمى معامل ارتباط الرتب r_i ، z_i أو معامل ارتباط " سبيرمان " Spearman .

ارتباط انحنائي


correlation, curvilinear

<p>ارتباط متعدد correlation, multiple</p> <p>تعميم لمفهوم الارتباط لأكثر من متغيرين .</p>	<p>الارتباط داخل الفصول</p> <p>correlation, intraclass</p> <p>إذا كان هناك عدد من فصول المفردات ، بحيث يوجد أكثر من مفردة في كل فصل وتقاس كل مفردة بدلالة نفس المتغير ، فإن الارتباط داخل الفصول هو . يساوى</p> $\frac{2,6}{2,6 + 2,6}$ <p>حيث $2,6$ هو التباين داخل</p>
<p>ارتباط سالب correlation, negative</p> <p>ارتباط بين كميتين يكون التغير في إحداها بالتزايد وبالتناقص في الأخرى .</p> <p>ارتباط غير واقعي (سخيف)</p> <p>correlation, nonsense</p> <p>ارتباط بين متغيرين ينشأ عن أن كلا منهما له ارتباط بمتغير ثالث . مثال ذلك ، تعداد سكان جنوب أفريقيا واستهلاك الطاقة الكهربائية في مصر يمكن أن يوجد بينهما ارتباط لأن كلا منهما له ارتباط موجب مع الزمن .</p>	<p>الفصول ، $2,6$ هو التباين بين متوسطات الفصول ، وإذا حوى كل فصل له من العناصر فإن مدى $2,6$ يكون من $\frac{1}{1-2,6}$ إلى 1 ويمثل هذا حالة خاصة في تحليل التباين .</p>
<p>ارتباط طبيعي correlation, normal</p> <p>ارتباط بين متغيرين كل منهما موزع توزيعاً طبيعياً في حالة كون دالة التكرار المشتركة</p> $d(s, v) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{s^2}{v^2}}}$ <p>حيث s ، v ،</p> $y = \frac{1}{(1 - r^2)^2} \left(\frac{s^2}{v^2} - \frac{s^2}{v^2} + \frac{s^2}{v^2} \right)$ <p>وكل من s ، v موزع طبيعياً بمتوسط</p>	<p>ارتباط خطي correlation, linear</p> <p>إذا كانت الدالة $(s v)$ خطية (أى على الصورة $(s + b v)$ ، يقال أن ارتباط s ، v ارتباط خطي ، حيث b معامل التراجع للمتغير s بالنسبة للمتغير v . وعندما يعبر عن كل من s ، v بدلالة وحدات الانحراف القياسية ، فإن معامل التراجع للمتغير s بالنسبة للمتغير v هو وزن بيتا β weight للمتغير s بالنسبة للمتغير v ، وفيما عدا هذه الحالة فإن معامل التراجع يساوى b $v \setminus s$.</p>

<p>صفة للنقط وللمستقيمات وللزوايا المتشابهة الارتباط في الأشكال المختلفة . فمثلاً في المثلثين القائمى الزاوية يكون الوتران ضلعين متناظرين .</p>	<p>صفرى وتباين $\frac{K_1}{K_2}$ ، $\frac{K_2}{K_1}$ ، على الترتيب ، معامل الارتباط بين س ، ص .</p>
<p>الزوايا المتناظرة لمستقيمين مع قاطع لهما corresponding angles of two lines cut by a transversal</p>	<p>ارتباط تام correlation, perfect ارتباط معاملته $R = \pm 1$ ، حيث تقع النقط جميعها بالضبط على خط مستقيم .</p>
<p>(انظر : angles made by a transversal) .</p>	<p>ارتباط موجب correlation, positive ارتباط بين كميتين يكون التغير فيهما إما بالتزايد آتياً وإما بالتناقص آتياً .</p>
<p>المعدلات المتناظرة corresponding rates المعدلات التى تنتج نفس المقدار لنفس الأصل وفى نفس الفترة الزمنية مع فترات تحويل مختلفة . فمثلاً المعدل الاسمى ٦٪ مع إضافة الفائدة كل نصف سنة يناظر المعدل السنوى الفعلى ٦,٠٩٪ .</p>	<p>تناظر واحد لواحد correspondence, one- to- one تناظر بين عناصر فئتين بحيث يقابل كل عنصر من عناصر الفئة الأولى عنصراً واحداً وواحداً فقط من عناصر الفئة الثانية ، وبحيث يقابل كل عنصر فى الثانية عنصراً واحداً وواحداً فقط فى الأولى . فمثلاً يمكن عمل تناظر واحد لواحد بين عناصر الفئتين (٢ ، ب ، ح ، د ، ٤) ، (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) .</p>
<p>قاطع التمام (قتا) cosecant (cosec) (انظر : الدوال المثلثية) trigonometric functions</p>	<p>متناظرة corresponding</p>

$$\frac{\cos \theta}{\cos \theta} = 1$$

ومنحنى الدالة \cos = جتا θ موضح بالشكل



(انظر : الدوال المثلثية
trigonometric functions)

قانون جيب التمام cosine, law of
إذا كانت A ، B ، C أطوال أضلاع مثلث
مستوي، α الزاوية المقابلة للضلع A ، فإن
قانون جيب التمام هو
 $A^2 = B^2 + C^2 - 2BC \cos \alpha$ جتا α .

وتستخدم هذه الصيغة لحل المثلث عند معرفة
طولي ضلعين من أضلاعه وقياس إحدى زواياه
أو معرفة أطوال أضلاع المثلث الثلاثة . وفي
المثلث الكرى، تكون قوانين جيوب التمام
هي :

جتا $A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ جتا A ،
جتا $B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$ جتا B ،
حيث a ، b ، c الزوايا المقابلة للأضلاع A ،
 B ، C على الترتيب .

الفئة المصاحبة لزمرة جزئية لزمرة

coset of a subgroup of a group


الفئة التي تتكون من جميع حواصل الضرب
ل S أو جميع حواصل الضرب S ل للعناصر
س للزمرة الجزئية وعنصر ثابت ل من عناصر
الزمرة الكلية .

وإذا كان الضرب بالعنصر ل من اليمين
سميت الفئة المصاحبة يمينية (right coset) وإذا
كان الضرب بالعنصر ل من اليسار سميت الفئة
المصاحبة يسارية (left coset) والفئتان
المصاحبتان إما أن تكونا متطابقتين وإما أن تكونا
غير مشتركيتين في أى عنصر، وينتمى كل عنصر
من عناصر الزمرة الكلية لإحدى الفئات
المصاحبة .

جيب التمام (جتا)

cosine (cos)

في أى مثلث قائم الزاوية إذا كانت θ هي
إحدى الزاويتين الحادتين فيه، فإن جيب تمام
الزاوية θ هو النسبة بين طول الضلع المجاور
لهذه الزاوية وطول وتر المثلث .




ففى الشكل $\cos \theta = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypotenuse}}$

المعدات المستهلكة المباعة .

ظل التمام (ظتا) **cotangent (cot)**


نسبة طول الضلع المجاور لزاوية حادة في المثلث القائم الزاوية إلى طول الضلع المقابل لها . وهو يساوى مقلوب الظل . ففى الشكل

ب ح



$$\text{ظتا ه} = \frac{\text{ب ح}}{\text{ح ا}} = \frac{1}{\text{ظا ه}}$$

ومنحنى الدالة ص = ظتا س موضح بالشكل :



(انظر الدوال المثلثية)
Trigonometric Functions

زوايا مشتركة النهاية

coterminal angles

جيوب تمام الاتجاه (فى الفراغ)

cosines, direction (in space)

جيوب تمام الزوايا التى يميل بها خط مستقيم على محاور الإحداثيات الثلاثة المتعامدة وإذا كانت α ، β ، γ هى هذه الزوايا فإن :

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

cost, first

التكلفة الابتدائية

القيمة التى تدفع ثمناً للصنف غير شاملة لتكاليف الحياة والتصرف .

الربح المئوى على التكلفة

cost, per cent profit on

النسبة المئوية للفرق بين سعر البيع والتكلفة وقيمة هذه التكلفة . فإذا كانت قيمة تكلفة إنتاج سلعة ما تسعة جنيهات وتباع بعشرة جنيهات فإن المكسب المئوى يساوى

$$100 \times \frac{1}{9} = 100 \times \frac{9 - 10}{9}$$

أى ١١,١١ % .

cost, replacement : تكلفة الإحلال .

تكلفة المعدات الجديدة مطروحاً منها قيمة

<p> $\frac{y^3}{8} (v_1 + v_2 + v_3 + v_4) - \frac{y^3}{90} v^{(4)}(a), \dots$ </p> <p>حيث v قيمة v عند</p> <p> $s = s_1 + s_2 + s_3$ ، وقيمة وسط للمتغير s . ويحتوى حد التصحيح على المشتقة السادسة فى الصيغتين التاليتين للصيغ المعطاة ، وحيث أن الصيغ السابقة الذكر تحتوى على قيم v عند حدود التكامل ، يقال أنها من النوع المغلق closed type وصيغ " كوتس ونيوتن " من النوع المفتوح open type هى :</p> <p> $\left[\frac{y^3}{2} (v_1 + v_2) + \frac{y^3}{4} v^{(2)}(a), \dots \right]_{s_1}^{s_2}$ </p> <p>وتستخدم الصيغ من النوع المفتوح فى الحلول العددية للمعادلات التفاضلية .</p> <p> انظر : صيغ التكامل لـ " نيوتن وكوتس " (Cotes integration formulas, Newton) </p> <p> قانون " كولوم " للشحنات النقطية Coulomb's law for point charges قانون مؤداه أن القوة بين شحنتين نقطيتين </p>	<p> زوايا لها نفس الضلعين الابتدائى والنهائى ، وهى زوايا تنشأ عن دوران الضلع الابتدائى لزاوية ما حول رأسها بحيث ينطبق الوضع النهائى له بعد الدوران على الضلع النهائى للزاوية الأصلية . فمثلاً الزوايا 30° ، 90° ، 180° ، 270° مشتركة النهاية . </p> <p> صيغ " كوتس ونيوتن " للتكامل Cotes Newton integration formulas الصيغ التقريبية : </p> <p> $\left[\frac{y}{2} (v_1 + v_2) - \frac{y^3}{12} v^{(2)}(a), \dots \right]_{s_1}^{s_2}$ </p> <p> $\left[\frac{y}{3} (v_1 + v_2 + v_3) - \frac{y^3}{60} v^{(4)}(a), \dots \right]_{s_1}^{s_2}$ </p>
--	---

المسلمة الثانية لقابلية العد
countability, second axiom of
 يقال لفراغ طوبولوجى أنه يحقق المسلمة الثانية لقابلية العد إذا كان لطوبولوجى الفراغ أساس قابل للعد . والفراغ المترى يحقق المسلمة الثانية لقابلية العد إذا وفقط إذا ، كان هذا الفراغ قابلاً للانفصال .

فئة قابلة للعد **countable set**
 ١ - فئة يمكن وضع عناصرها فى تناظر واحد لواحد مع الأعداد الصحيحة الموجبة ، أى أنه يمكن ترتيب عناصرها فى متتابعة لانهاية ح_١ ، ح_٢ ، ح_٣ ، . . . بحيث لا يظهر كل عنصر إلا فى مكان وحيد .
 ٢ - فئة تحتوى على عدد نهائى من العناصر أو يمكن وضع عناصرها فى تناظر واحد لواحد مع الأعداد الصحيحة الموجبة من ١ إلى ∞ .
 فمثلاً فئة جميع الأعداد الصحيحة قابلة للعد وفئة جميع الأعداد الكسرية قابلة للعد ، أما فئة الأعداد الحقيقية فليست قابلة للعد .

عداد **counter**
 آلة أو مسجل أو جزء فى ذاكرة الحاسب لتسجيل مرات تكرار حدث ما .

تناسب طردياً مع حاصل ضرب شدتيهما وعكسياً مع مربع المسافة بينهما وتعمل فى الخط الواصل بينهما وتكون تجاذبية إذا اختلف نوع الشحنتين وتنافرية إذا كانتا من نفس النوع .

العد **'count**
 سرد مجموعة من الأعداد الصحيحة المتتالية تصاعدياً .

العد بمثنى أو بثلاث أو برباع
count by twos (threes, fours...)
 سرد مجموعة من الأعداد الصحيحة مرتبة بحيث يكون الفرق بين كل اثنين متتالين منها ٢ أو ٣ أو ٤ ، . . . فمثلاً عند العد بمثنى يقال ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، . . . وعند العد بثلاث يقال ٣ ، ٦ ، ٩ ، ١٢ ، . . .

المسلمة الأولى لقابلية العد
countability, first axiom of
 يقال لفراغ طوبولوجى أنه يحقق المسلمة الأولى لقابلية العد إذا وجد لكل نقطة قاعدة قابلة للعد فى جوار النقطة .

معجم الرياضيات

<p>counting measure القياس العاد</p> <p>دالة القياس التي تكون قيمتها لكل فئة جزئية نهائية من فئة ما مساوية عددها الكاردينالى .</p>	<p>counter, binary عَدَّاد ثنائى</p> <p>عَدَّاد يقوم بالعَدَّ طبقاً للنظام الثنائى .</p>
<p>couple ازدواج</p> <p>قوتان متساويتان ومتوازيتان ومتضادتان فى الاتجاه ومختلفتان فى خط العمل .</p>	<p>counterclock wise مضاد و الساعة</p> <p>صفة للدوران فى عكس اتجاه حركة عقارب الساعة .</p>
<p>couple, arm of ذراع الازدواج</p> <p>البعد العمودى بين خطى عمل قوتى الازدواج .</p>	<p>counter example مثال مضاد</p> <p>مثال يختار لفحص مقولة رياضية مطروحة وذلك بإثبات أن هذه المقولة لا تنطبق عليه .</p>
<p>couple, moment of عزم الازدواج</p> <p>حاصل ضرب مقدار إحدى قوتى الازدواج فى البعد العمودى بينهما ، والمجموع الجبرى لعزمتى قوتى الازدواج حول أى نقطة فى مستواه يساوى مقداراً ثابتاً هو عزم الازدواج .</p>	<p>counter image الصورة المضادة</p> <p>= inverse image = الصورة العكسية</p> <p>فئة العناصر التى صورتها براسم تقع فى فئة معطاة وتكون معرفة جيداً حتى لو كان الراسم العكسى غير معروف .</p>
<p style="text-align: center;">زوج مقترن من المعادلات</p> <p>coupled pair of equations</p> <p>معادلتان تتوقف كل منهما على الأخرى</p>	<p style="text-align: center;">عَدَّاد بمقياس ٢</p> <p>counter, modulo-2</p> <p>وحدة حساب بسيطة تسجل إحدى حالتى الاستقرار على حسب ما إذا كانت النبضات التى تتلقاها زوجية أم فردية .</p>

<p>التغاير (في الإحصاء)</p> <p>covariance (in statistics)</p> <p>مقياس للارتباط بين متغيرين عشوائيين يساوى القيمة المتوقعة لحاصل ضرب انحرافيهما عن المتوسط .</p>	<p>أو تكون لكل منها علاقة متبادلة مع الأخرى .</p> <p>ازدواجات مستوية couples, coplanar ازدواجات تقع جميع القوى المكونة لها في مستوى واحد .</p>
<p>مصفوفة التغاير (في الإحصاء)</p> <p>covariance matrix (in statistics)</p> <p>= مصفوفة التباين والتغاير = variance-covariance matrix</p> <p>إذا كانت { s_r } متتابعة من المتغيرات العشوائية فإن المصفوفة المربعة من درجة $n \times n$ التي فيها العنصر في الصف الرائي والعمود الميمى هو تغاير s_r ، s_m تسمى مصفوفة التغاير . وهذه المصفوفة متماثلة وعناصر القطر فيها هي تباينات s_r .</p>	<p>سندات قسيمية coupon bonds (انظر : سندات قسيمية) (bonds, coupon) .</p> <p>اتجاه إبحار السفينة course of a ship الزاوية الثابتة التي يصنعها خط إبحار السفينة مع خطوط الطول . ولتعيين هذه الزاوية يلزم حل مثلث مستو قائم الزاوية .</p>
<p>المشتقة السفلية لممتد</p> <p>covariant derivative of a tensor</p> <p>المشتقة السفلية لممتد من رتبة (ل ، م) مركباته</p> <p>هي ممتد مركباته</p> $\begin{matrix} & & & & 1 \\ & & & & 2 \\ & & & & \dots \\ & & & & l \\ 1 & & & & \\ 2 & & & & \\ \dots & & & & \\ l & & & & \\ m & & & & \end{matrix}$	<p>تحليل التغاير covariance, analysis of التحليل الإحصائي لتباين متغير يرتبط خطياً بمتغيرات أخرى ويتأثر بها .</p>

إذا كانت $\varphi_{\alpha\beta}$ من (s_1, s_2) ،
... (s_2) مركبات مجال ممتد سفل
متناوب tensor field ، فإن المشتقة السفلية
الإستوكية هي المجال الممتد السفل المتناوب من
رتبة $(l + 1)$ الذى تعرف مركباته

كالتالى :

$$\frac{\partial \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta}}{\partial x^{\gamma}} = \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta}$$

$$- \frac{\partial \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta}}{\partial x^{\gamma}} = \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta}$$

الأدلة السفلية covariant indices
الأدلة السفلية للممتد من رتبة (l, m)

الذى مركباته $\varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta}$ هي :

$\varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta}$ ، ... ، $\varphi_{\alpha\beta}$ ، $\varphi_{\alpha\beta}$.

ممتد سفل covariant tensor
ممتد له أدلة سفلية فقط وإذا كان m هو عدد
هذه الأدلة ، يقال إن هذا الممتد السفل من
رتبة m .

$$\frac{\partial \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta}}{\partial x^{\gamma}} = \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta}$$

حيث استخدم أسلوب الجمع الدليلي ،

{ لجم } معاملات كريستوفل من النوع الثانى .
وهذا الممتد (أى المشتقة السفلية) علوى من
رتبة l وسفل من رتبة $(m + 1)$. وعملية
الاشتقاق السفل ليست إبدالية .

فمثلاً ، $\varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta}$ بصفة عامة

وذلك لأن

$$\varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta} = \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta}$$

حيث $\varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta} \dots \varphi_{\alpha\beta}$ ممتد تقوس " ريمان " .

والمشتقة السفلية للدوال القياسية هي المشتقة
العادية لها .

المشتقة السفلية الإستوكية

covariant derivative, stokian

<p>من هذه الفئات أصغر من \in .</p> <p>غطاء \in من رتبة n لفراغ مترى</p> <p>covering of order n of a metric space, \in -</p> <p>غطاء \in لفراغ مترى بحيث توجد نقطة محتواة في n من الفئات الجزئية للغطاء ولا توجد نقطة محتواة في $(n+1)$ من الفئات الجزئية للغطاء .</p>	<p>مجال اتجاهاى سفلى</p> <p>covariant vector field</p> <p>يمتد اتجاهاى سفلى من الرتبة الأولى .</p> <p>غطاء فئة</p> <p>cover of a set</p> <p>غطاء فئة معطاة هو مجموعة من الفئات الجزئية لها تختار بحيث تنتمى كل نقطة من نقط الفئة المعطاة إلى واحدة على الأقل من هذه الفئات الجزئية .</p>
<p>قاعدة " كرامر " Cramer's rule</p> <p>قاعدة لحل عدد من المعادلات الجبرية الخطية لنفس العدد من المجاهيل . وتعين قيمة كل مجهول باستخدام المحددات وذلك للمعادلات التى لها حل وحيد ، أى المعادلات التى محدد معاملاتها لا يساوى الصفر . مثال ذلك ، قيمتا s ، v اللتان تحققان المعادلتين :</p> <p>$2s + 3v = 5$ ، $2s + 3v = 10$ صفرأ</p> <p>هما :</p>	<p>غطاء فئة مغلق</p> <p>cover of a set, closed</p> <p>غطاء للفئة بحيث تكون كل فئة من فئات الغطاء مغلقة .</p> <p>غطاء فئة مفتوح</p> <p>cover of a set, open</p> <p>غطاء للفئة بحيث تكون كل فئة من فئات الغطاء مفتوحة .</p>
<p>غطاء \in لفراغ مترى</p> <p>covering of a metric space, \in -</p> <p>غطاء فراغ مترى بعدد نهائى من الفئات بحيث يكون البعد بين أى نقطتين من نقط كل</p>	<p>غطاء \in لفراغ مترى</p> <p>covering of a metric space, \in -</p> <p>غطاء فراغ مترى بعدد نهائى من الفئات بحيث يكون البعد بين أى نقطتين من نقط كل</p>

<p>النسبة الحرجة (في الإحصاء) critical ratio (in statistics) إحصاء يستخدم لتعيين احتمال وجود عينة تحت اشتراطات خاصة تتعلق بالمجتمع الذى أخذت منه العينة ، كما يستخدم هذا الإحصاء في اختبارات وفروض الدلالة ، ومثال ذلك ، نسبة الفرق بين متوسط عينة والقيمة المفترضة إلى الانحراف المعيارى للمجتمع .</p>	<p>مشروع تجارى تسليفى (بالأجل) credit business مشروع تجارى تباع فيه البضائع دون دفع فوري مع تعهد بالسداد في زمن محدد .</p> <p>الدائن creditor الشخص الذى يقبل أن يؤدي إليه حقه مستقبلاً بدلاً من أدائه إليه فوراً .</p>
<p>منطقة حرجة منحازة (في الإحصاء) critical region, biased (in statistics) توصف المنطقة الحرجة التى اتساعها α بأنها منحازة إذا كان احتمال نبذ افتراض البطلان أقل من α عندما يكون افتراض البطلان هذا خاطئاً . مثال ذلك ، استخدام صفين متساويين لتوزيع كاي تربيع يكون منطقة حرجة منحازة لاختبار الفرض بأن تباين مجتمع طبيعى يكون مساوياً لقيمة ما محددة .</p>	<p>فيصل criterion قانون أو قاعدة يمكن بواسطتها اختبار صحة افتراض .</p> <p>نقطة حرجة critical point تكون النقطة (س ، ص) (نقطة حرجة للدالة الملاءة د (س ، ص) إذا كان : $D_s (س ، ص) = D_{ص} (س ، ص) = 0$ أى أن النقطة الحرجة هي نقطة يكون عندها المستوى المماس للسطح $E = D (س ، ص)$ أفقياً .</p>
<p>قيمة حرجة critical value قيمة للمتغير المستقل يكون للمتغير التابع عندها نهاية عظمى أو صغرى . ويطلق المصطلح أحياناً على قيمة المتغير المستقل عند نقطة الانقلاب لمنحنى الدالة .</p>	

حيث \vec{s}^* ، \vec{v}^* ، \vec{e}^* وحدات المتجهات
في اتجاهات محاور الإحداثيات .

نسبة غير توافقية **cross ratio**
(انظر : ratio, cross) .

مقطع مساحة أو مجسم
cross section of an area or solid
مقطع مستوي عمودي على محور التماثل أو على
المحور الأكبر (إذا كان هناك أكثر من محور)
للمساحة أو المجسم ، وعادة لا يستخدم هذا
المصطلح إلا في الحالات التي تكون فيها كل
المقاطع متطابقة كما في حالة الأسطوانة
الدائرية وحالة متوازي المستطيلات .

ورقة مقاطع = ورقة مسطرة
= ورقة مربعات
cross - section paper = ruled paper
= squared paper

ورقة مسطرة بخطوط مستقيمة رأسية وأفقية
متساوية البعد بعضها عن بعض وتستخدم في
رسم منحنيات المعادلات في الإحداثيات
الديكارتية .


طاقية صليب **cross cap**
السطح الناتج عن تحويل المنحنى المغلق
البسيط الذي يحد شريحة موبيس إلى دائرة بعملية
يسمح خلالها أن تقطع الشريحة نفسها وهو
سطح غير موجه .

حاصل ضرب الاتجاهي
cross product

= vector multiplication of two vectors
حاصل ضرب الاتجاهي للمتجهين \vec{A} ، \vec{B}
هو متجه \vec{C} معياره يساوي حاصل ضرب
معيار \vec{A} ، \vec{B} وجيب الزاوية بين \vec{A} ، \vec{B} واتجاهه
عمودي على مستوى المتجهين المعطيين ، بحيث
تكون المتجهات الثلاث \vec{A} ، \vec{B} ، \vec{C} على
الترتيب مجموعة يمينية ، ويكتب حاصل
الضرب الاتجاهي على الصورة $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$.
والضرب الاتجاهي لمتجهين ليس إبدالياً لأن
 $\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$ ويمكن التعبير عن حاصل
الضرب الاتجاهي للمتجهين $\vec{A} = (A_1, A_2, A_3)$ ،
 $\vec{B} = (B_1, B_2, B_3)$ على
الصورة :

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{s}^* & \vec{v}^* & \vec{e}^* \\ A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{vmatrix}$$

(انظر الشكل) .



cube

مكعب

في الفراغ الإقليدي الثلاثي البعد هو متعدد سطوح محدد بستة أوجه مستوية ، وجميع أحرفه الاثنى عشر متساوية الطول ، وجميع زوايا أوجهه قوائم .


وفي الفراغ الإقليدي النوني البعد يكون المكعب فئة جميع النقط $س = (س_1, س_2, \dots, س_n)$ حيث $س_r \geq س_{r+1}$ لكل $ر$ ، والأعداد $\{س_r\}$ ، تحقق العلاقة $س_r - س_{r+1} = ل$ له لجميع $ر$. العدد الثابت له هو طول حرف المكعب ، وحجم (أو قياس) المكعب هو $ل^n$. وهذا المكعب هو حاصل الضرب الديكارتي لعدد $ن$ من الفترات المغلقة ، طول كل منها له .

منحنى الصليب cruciform curve

المحل الهندسى للمعادلة :

$س^2 ص^2 - س^2 - ص^2 = صفر$ ، وهو منحنى متماثل بالنسبة لنقطة الأصل وبالنسبة لمحورى الإحداثيات ، وله أربعة فروع ، فرع فى كل ربع من مستوى الإحداثيات . والأربعة مستقيحات $س = \pm 1$ ، $ص = \pm 1$ ، هى خطوط تقريبية لهذا المنحنى ، ويسمى هذا المنحنى بالمنحنى الصليبي لشبهه بالصليب .

(انظر الشكل)



crunode

نقطة عقدية

نقطة على منحنى يمر بها فرعان للمنحنى لكل منهما مماس منفصل عند النقطة .

<p>منحنى تكعيبي ذو شقين</p> <p>cubic, bipartite</p> <p>المحل الهندسى للمعادلة :</p> <p>ص² = س (س - ٢) (س - ب) ،</p> <p>صفر > ٢ > ب .</p> <p>والمنحنى متماثل بالنسبة لمحور السينات</p> <p>ويقطعه عند نقطة الأصل ، وعند النقطتين</p> <p>(٢ ، صفر) ، (ب ، صفر) .</p>	<p>مضاعفة حجم المكعب</p> <p>cube, duplication of the</p> <p>عملية تعيين طول حرف المكعب الذى</p> <p>حجمه يساوى ضعف حجم مكعب معلوم</p> <p>باستخدام المسطرة والفرجار فقط ، وتمثل هذه</p> <p>العملية رياضياً بحل المعادلة س³ = ٢ ٢³ .</p> <p>cube of a number مكعب عدد</p> <p>القوة الثالثة لعدد ، مثال ذلك مكعب العدد</p> <p>٢ هو ٢ × ٢ × ٢ ويكتب ٢³ .</p>
<p>منحنى تكعيبي</p> <p>cubic curve</p> <p>(انظر : منحنى جبرى مستوى)</p> <p>algebraic plane curve .</p> <p>معادلة تكعيبية (من الدرجة الثالثة)</p> <p>cubic equation</p> <p>معادلة كثيرة حدود من الدرجة الثالثة . مثال</p> <p>ذلك المعادلة :</p> <p>٢ س³ + ٣ س² + س + ٥ = صفرأ .</p>	<p>cube of a quantity مكعب كمية</p> <p>القوة الثالثة لكمية ، مثال ذلك مكعب</p> <p>الكمية (س + ص) هو</p> <p>(س + ص) (س + ص) (س + ص) ويكتب</p> <p>(س + ص)³ ويساوى س³ + ٣ س² ص + ٣ س ص² + ص³ .</p>
<p>حل " كاردان " لمعادلة الدرجة الثالثة</p> <p>cubic equation, Cardan solution of the</p> <p>(انظر :)</p> <p>Cardan solution of the cubic equation .</p>	<p>الجذر التكعيبي لكمية معطاة</p> <p>cube root of a given quantity</p> <p>كمية مكعبها هو الكمية المعطاة .</p>

<p>منحنى تكعيبي لولبي</p> <p>cubic, twisted</p> <p>منحنى يقطع كل مستوى من مستويات الإسناد في الفراغ في ثلاث نقاط حقيقية أو تخيلية ، مختلفة أو غير مختلفة . مثال ذلك ، المعادلات :</p> <p>س = ٢ د ، ص = ب د ، ع = ح د ، حيث ١ ب ح ≠ ٠ صفراً ، تمثل منحنى تكعيباً لولبياً .</p>	<p>معادلة تكعيبية مختزلة</p> <p>cubic equation, reduced</p> <p>معادلة تكعيبية تختزل إليها المعادلة التكعيبية</p> <p>س^٣ + ٢ س^٢ + ب س + ح = صفراً وتكون على الصورة ص^٣ + ل ص + م = صفراً وذلك باستخدام التعويض</p> $س = ص - \frac{ب}{٣}$
<p>معامل التمدد الحجمي</p> <p>cubical expansion, coefficient of volume or</p> <p>(انظر : coefficient of volume (or cubical) expansion)</p> <p>قطع مكافئ تكعيبي cubical parabola</p> <p>المحل الهندسي المستوى لمعادلة على الصورة</p> <p>ص = له س^٣ عندما له < صفر . محور السينات يكون مماساً انقلابياً لهذا المنحنى ويمر المنحنى بنقطة الأصل وله فرعان لانهايان يقعان في الربعين الأول والثالث ، ويكون مقعراً لأعلى في الربع الأول . ولأسفل في الربع الثالث .</p>	<p>المعادلة التكعيبية المساعدة</p> <p>cubic, resolvent</p> <p>المعادلة التكعيبية التي تساعد على حل معادلة الدرجة الرابعة</p> <p>س^٤ + ل س^٣ + م س^٢ + ن س + ي = صفراً . وتكون على الصورة :</p> $له^٣ - \frac{١}{٢} م له^٢ + \frac{١}{٤} (ل - ٤ م - ٤ ن) له + \frac{١}{٨} (٤ م ي - ل^٢ ي - ن^٢) = صفراً$ <p>انظر أيضاً : حل " فيراري " لمعادلة الدرجة الرابعة .</p> <p>(Ferrari's solution of the quartic)</p>

إمكان التعبير عن φ (ى) بدلالة متسلسلة قوى .

التكرار التراكمى

cumulative frequency

= التكرار المتراكم


= accumulated frequency

مجموع التكرارات السابقة لإجراء ترتيب معين . مثال ذلك ، إذا كان عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات من ٦٠٪ إلى ٧٠٪ ، ومن ٧٠٪ إلى ٨٠٪ ومن ٨٠٪ إلى ٩٠٪ ، ومن ٩٠٪ إلى ١٠٠٪ هو ٢ ، ٤ ، ٧ ، ٣ (التى تسمى التكرارات) على الترتيب ، فإن التكرارات التراكمية تكون ٢ ، ٦ ، ١٣ ، ١٦ . ومجموع التكرارات المطلقة (أو النسبية) لقيم س التى تكون أقل من أو تساوى س_١ هى التكرار التراكمى المطلق (أو النسبى) الأعلى للمتغير س . وبالمثل يمكن إيجاد التراكم الأدنى .

المنحنى التكرارى التراكمى

cumulative frequency curve

منحنى الإحداثيات السينية لنقطة هى فترات



متوازي مستطيلات cuboid

مجسم له ستة أوجه مستوية مستطيلة الشكل ويتوازي كل وجهين متقابلين منها .

المتراكمات cumulants

مجموعة من البارامترات لمر لتوزيع ما تقيس خواصه وتعينها فى فترات قصيرة وبدلالة العزوم ح_١ تعطى هذه البارامترات كالتالى :

$$ل_١ = ح_١ ، ل_٢ = ح_٢ - ٣ ح_١^٢$$

$$ل_٣ = ح_٣ - ٣ ح_٢ ح_١ - ٢ ح_١^٣$$

وبصفة عامة لمر يساوى معامل $\frac{(ت(ى))^٢}{١٢}$ فى

مفكوك لو φ (ى) ، حيث φ (ى) الدالة المميزة المشتقة من دالة تكرار التوزيع بشرط

س* ، ص* ، ع* هي متجهات الوحدة في اتجاهات المحاور .

الفصل والإحداثيات الصادية لها هي التكرارات التراكمية .

السعر السارى للفائدة

current rate = prevailing interest rate


(انظر : فائدة interest) .

نسبة العائد السارى current yield rate
النسبة بين فائدة السند في تاريخ حسابها وبين سعر شراء السند .

المضلع التكرارى التراكمى

cumulative frequency polygon

مضلع ينتج من رسم قطع مستقيمة بين نقاط في المستوى ، الإحداثى الصادى لكل منها هو مجموع التكرارات للقيم التى تقل عن إحداثيتها السينى أو تساويها ويكون بوجه عام على الصورة الموضحة بالشكل :



سنية مقتضبة curtate annuity

(انظر : سنية مقتضبة)
annuity, curtate

لف دالة موجهة

curl of a vector function

إذا كانت \vec{d} (س ، ص ، ع) دالة موجهة فإن
انفها يرمز له بالرمز $\nabla \times \vec{d}$ ويعرف في نظام
الإحداثيات الديكارتية كالتالى :

$$\nabla \times \vec{d} = \frac{\partial d_z}{\partial y} \vec{s} - \frac{\partial d_z}{\partial x} \vec{v} + \frac{\partial d_y}{\partial x} \vec{v} - \frac{\partial d_y}{\partial z} \vec{s} + \frac{\partial d_x}{\partial z} \vec{s} - \frac{\partial d_x}{\partial y} \vec{v}$$

حيث ∇ المؤثر

التوقع المقتضب للحياة

curtate expectation of life

العدد المتوسط للسنوات التى يتوقع أن
يعيشها أعضاء مجموعة معينة من الأفراد .

curvature, center of

مركز التقوس

$$\vec{s} \cdot \frac{\partial \vec{d}}{\partial x} + \vec{v} \cdot \frac{\partial \vec{d}}{\partial y} + \vec{e} \cdot \frac{\partial \vec{d}}{\partial z}$$

التقوس في حالة الدائرة هو مقلوب نصف القطر . وللمنحنيات الأخرى يمكن اعتبار التقوس عند نقطة ما على أنه تقوس الدائرة التي تقترب من المنحنى أكثر ما يمكن عند هذه النقطة . وفي حالة منحني مستوي ، يكون التقوس هو القيمة المطلقة لمعدل تغير زاوية ميل المماس للمنحنى بالنسبة لطول قوسه ، أى القيمة المطلقة لمعدل تغير ظل⁻¹ ($\frac{\kappa}{\sigma}$) بالنسبة لطول

قوس المنحنى ، ويعطى التقوس له بدلالة الإحداثيات الديكارتية بالعلاقة :

$$\text{له} = \sqrt{\left[\left(\frac{\kappa}{\sigma} \right)^2 + 1 \right]}$$

وبدلالة الإحداثيات البارامترية :

$$\text{له} = \frac{\left| \left(\frac{\kappa}{\sigma} \right) \left(\frac{\kappa}{\sigma} \right) - \left(\frac{\kappa}{\sigma} \right) \left(\frac{\kappa}{\sigma} \right) \right|}{\sqrt{\left\{ \left(\frac{\kappa}{\sigma} \right)^2 + \left(\frac{\kappa}{\sigma} \right)^2 \right\}}}$$

حيث σ ، κ دوال في البارامتر θ . وبدلالة الإحداثيات القطبية

$$\text{له} = \frac{\left| \left(\frac{\kappa}{\sigma} \right) \left(\frac{\kappa}{\sigma} \right) - \left(\frac{\kappa}{\sigma} \right) \left(\frac{\kappa}{\sigma} \right) \right|}{\sqrt{\left\{ \left(\frac{\kappa}{\sigma} \right)^2 + \left(\frac{\kappa}{\sigma} \right)^2 \right\}}}$$

(انظر : مركز تقوس منحنى مستوي)
center of curvature of a plane curve

(مركز تقوس منحنى فراغى عند نقطة)
center of curvature of a space curve
at a point

دائرة التقوس curvature, circle of

الدائرة التي تمس المنحنى (المستوي) من ناحية الجانب المقعر له ، ويسمى مركز هذه الدائرة بمركز التقوس centre of curvature .

التقوس التكاملى لمثلث جيوديسى على سطح

curvature of a geodesic triangle on a surface, integral

يعرف هذا التقوس بأنه مجموع زوايا المثلث بالتقدير الدائرى مطروحاً منه 2π .

(انظر : التقوس التكاملى لمنطقة على سطح)
integral curvature of a region on a surface

تقوس منحنى مستوي

curvature of a plane curve

التقوس الثانى لمنحنى فراغى هو لى هذا المنحنى
(انظر : اللى torsion) .

تقوس " جاوس " لسطح عند نقطة
curvature of a surface at a point,
Gaussian

= التقوس الكلى لسطح عند نقطة
= curvature of a surface at a point,
total

= التقوس الكلى العمودى لسطح
= curvature, total normal

يعرف هذا التقوس بأنه حاصل ضرب
التقوسين الأساسيين للسطح عند هذه النقطة .

التقوس المتوسط لسطح عند نقطة
curvature of a surface at a point,
mean

= متوسط التقوس العمودى لسطح
= curvature of a surface, mean
normal

مجموع التقوسين الأساسيين للسطح عند

النقطة : $\frac{1}{\ell_1} + \frac{1}{\ell_2} = \text{ق هـ}$

التقوس التكاملى لمنطقة على سطح
curvature of a region on a surface,
integral

التكامل : $\int \text{ق هـ} \, d\text{س}$
حيث ق هـ هو تقوس " جاوس " ، المنطقة .

تقوس منحنى فراغى عند نقطة
curvature of a space curve at a point

إذا كانت م نقطة ثابتة ، م نقطة متغيرة على
منحنى فراغى موجه س ، طول قوس المنحنى
س من م إلى م ، $\Delta \theta$ قياس الزاوية بين
الاتجاهين الموجبين للمماسين للمنحنى س عند
م ، م ، فإن التقوس

$\text{ق هـ} = \frac{1}{\ell}$ للمنحنى س عند م يعرف على أنه

$\text{ق هـ} = \frac{1}{\ell} = \frac{\Delta \theta}{\Delta \text{س}}$

أى أن التقوس هو مقياس معدل دوران
المماس للمنحنى س بالنسبة لطول القوس س .
ويسمى ℓ طول نصف قطر التقوس
radius of curvature .

التقوس الثانى لمنحنى فراغى
curvature of a space curve, second

<p>أنه مقلوب التقوس العمودى فى الاتجاه المعلوم ، كما يعرف مركز التقوس العمودى للسطح فى اتجاه ما عند نقطة عليه بأنه مركز تقوس المقطع العمودى للسطح عند النقطة نفسها فى الاتجاه المعلوم .</p> <p>التقوس الكلى لمثلث جيوديسى على سطح</p> <p>curvature of geodesic triangle on a surface, total</p> <p>انظر : التقوس التكاملى لمثلث جيوديسى على سطح integral curvature of a geodesic triangle on a surface</p>	<p>خطوط تقوس سطح</p> <p>curvature of a surface, lines of</p> <p>الخطوط على سطح ما s : $s = s(u, v)$ ، $s = s(u, v)$ ، $s = s(u, v)$ ، $s = s(u, v)$ ، التي تعطى بالمعادلة : $(H_{xx} - H_{yy})^2 + 4H_{xy}^2 = 0$ $(H_{xx} - H_{yy})^2 + 4H_{xy}^2 = 0$ وهذه المنحنيات تشكل مجموعة متعامدة على السطح s ، ويعين منحني المجموعة الماران بنقطة $m \in s$ الاتجاهين الأساسيين للسطح s عند m .</p> <p>(انظر : الاتجاهان الأساسيان لسطح عند نقطة) principal directions of a surface at a point</p>
<p>نصف قطر التقوس ،</p> <p>curvature, radius of</p> <p>نصف قطر دائرة التقوس ويساوى مقلوب التقوس .</p> <p>سطح تقوسه الكلى سالب</p> <p>curvature, surface of negative total</p> <p>سطح تقوسه الكلى سالب عند كل نقطة من نقطه وفى هذه الحالة يقع السطح على جانبى المستوى المماسى فى جوار نقطة التماس .</p>	<p>التقوس العمودى لسطح</p> <p>curvature of a surface, normal</p> <p>التقوس العمودى لسطح s عند نقطة عليه فى اتجاه معلوم هو تقوس المقطع العمودى m للسطح s عند النقطة نفسها فى الاتجاه المعطى مع الاختيار المناسب للإشارة . وتكون الإشارة موجبة إذا انطبق الاتجاه الموجب للعمودى الأساسى للمنحنى m على الاتجاه الموجب للعامودى على السطح s . وتكون الإشارة سالبة إذا لم يتحقق هذا الشرط . ويعرف نصف القطر العمودى للتقوس على</p>

<p>القطرين الأساسيين للثقبوس العمودى للسطح عند النقطة .</p> <p>(انظر: الاتجاهان الأساسيان لسطح عند نقطة)</p> <p>principal directions on a surface at a point</p>	<p>مثال ذلك ، السطح الداخلى للسطح الكعكى (torus) وكذلك السطح الزائدى ذو الطية الواحدة .</p>
<p>منحنى curve</p> <p>المحل الهندسى لنقطة لها درجة حرية واحدة . فمثلاً الخط المستقيم فى مستوى هو المحل الهندسى للنقطة التى يرتبط إحداثياتها الديكارتيان ارتباطاً خطياً ، والدائرة التى مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها الوحدة هى المحل الهندسى للنقطة التى يرتبط إحداثياتها بالمعادلة $s^2 + v^2 = 1$.</p>	<p>سطح تقوسه الكلى موجب curvature, surface of positive total</p> <p>سطح تقوسه الكلى يكون موجباً عند كل نقطة من نقطه . مثال ذلك السطح الكروى والسطح الناقصى .</p> <p>سطح تقوسه الكلى صفر curvature, surface of zero total</p> <p>سطح تقوسه الكلى يساوى الصفر عند كل نقطة من نقطه . مثال ذلك ، السطح الأسطوانى والسطح المغلف بمستويات .</p>
<p>منحنى مستو جبرى curve, algebraic plane</p> <p>منحنى مستو معادلته بدلالة الإحداثيات الديكارتية على الصورة $D(s, v) = 0$ صفراً ، حيث الدالة D هى كثيرة حدود فى s, v . وإذا كانت الدالة من الدرجة n ، يقال أن المنحنى هو منحنى جبرى من درجة n ، وعندما تكون $n = 1$ يكون المنحنى خطاً مستقيماً ، وعندما تكون $n = 2$ يكون المنحنى قطعاً مخروطياً .</p>	<p>التقوسان الأساسيان لسطح عند نقطة curvatures of a surface at a point, principal</p> <p>التقوسان الأساسيان لسطح عند نقطة هما $\frac{1}{r_1}, \frac{1}{r_2}$ فى الاتجاهين الأساسيين عند النقطة ، حيث r_1, r_2 نصفيا</p>

مجمع اللغة العربية - القاهرة

<p>يقطعها جسم ما والزمن الذي يستغرقه لقطعها .</p>	<p>وإذا كانت d (س ، ص) = له (س ، ص) ، ل (س ، ص) ، حيث له ، ل كثيرتا حدود في س ، ص فإن كلاً من له (س ، ص) ، ل (س ، ص) تمثل منحنياً آخر يسمى مركبة للمنحنى الأصلي . ويقال أن المنحنى المستوى غير قابل للاختزال إذا كانت له مركبة واحدة فقط .</p>
<p>منحنى تجريبي (وضعي) curve, empirical منحنى يرسم ليوافق تقريباً فئة من البيانات الإحصائية .</p>	<p>فمثلاً الدائرة التي معادلتها : $s^2 + ص^2 - ٩ = ٠$ صفراً غير قابلة للاختزال أما المنحنى (ص - س) $(٢س + ص - ١) = ٠$ صفراً ، فهو قابل للاختزال ومركبته هما : ص - س = صفراً ، $٢س + ص - ١ = ٠$ صفراً .</p>
<p>توفيق المنحنيات curve fitting تعيين المنحنى الذي يلائم على قدر الإمكان مجموعة من البيانات التجريبية أو الإحصائية .</p>	<p>منحنى تحليلي curve, analytic (انظر : منحنى تحليلي analytic curve) .</p>
<p>منحنى التكرار (في الإحصاء) curve, frequency (in statistics) (انظر : تكرار frequency) .</p>	<p>منحنى مشتق curve, derived (انظر : منحنى مشتق derived curve) .</p>
<p>منحنى النمو (في الإحصاء) curve, growth (in statistics) منحنى مصمم لتوضيح النمط العام لنمو متغير ما ، له أنواع متعددة .</p>	<p>منحنى المسافة والزمن curve, distance - time التمثيل البياني للعلاقة بين المسافة التي</p>

وبدلالة الإحداثيات القطبية r, θ ، يكون طول المنحنى بين النقطتين (r_1, θ_1) ، (r_2, θ_2) هو :

$$\theta \leq \frac{1}{r} \left\{ \frac{r_2^2}{\theta_2} + \frac{r_1^2}{\theta_1} \right\}$$

منحنى صفري الطول

curve of zero length

= منحنى متناهي الصغر

= minimal curve

(انظر : منحنى متناهي الصغر)
minimal curve

المنحنى المكافئ curve, parabolic

منحنى جبرى معادلته بدلالة الإحداثيات الديكارتية على الصورة :

$$y^2 = ax^2 + bx + c$$

منحنى المواقع (المنحنى البدالى)

curve, pedal

المحل الهندسى لموقع العمود الساقط من نقطة ثابتة على مماس متغير لمنحنى معلوم ، فمثلاً

منحنى مستو curve in a plane

= plane curve

منحنى تقع جميع نقطه فى مستوى واحد .

طول منحنى curve, length of a

طول منحنى بين نقطتين A, B واقعيتين عليه هو أصغر حد أعلى لمجموع أطوال الأوتار :

$$\overline{A_1 A_2} + \overline{A_2 A_3} + \dots + \overline{A_{n-1} A_n}$$

حيث A_1, A_2, \dots, A_n نقط مختارة على المنحنى بحيث $A_1 = A, A_n = B$. ويشترط وجود حد أعلى لمجموع الأوتار وإلا كان طول المنحنى بين A, B غير معرف .

طول منحنى مستو

curve, length of a plane

إذا كانت $s = d(s)$ معادلة منحنى

مستو ، $s_1 \geq s_2 \geq s_3$ وكان $\frac{ds_1}{ds_2}$


متصلاً فإن طول المنحنى بين النقطتين

$(s_1, r_1), (s_2, r_2)$ على المنحنى يساوى

$$\int_{s_1}^{s_2} \left\{ 1 + \left(\frac{dr}{ds} \right)^2 \right\}^{1/2} ds$$

<p>اتصالها إذا أزيلت منها أى نقطتين عشوائياً .</p> <p>منحنى أملس curve, smooth</p> <p>إذا كان م منحنى فى فراغ إقليدى ، فإنه يكون صورة لفترة $[a, b]$ تحت تأثير تحويل متصل ، وإذا رمزت s إلى الإحداثى الديكارتي ذى الترتيب i للنقطة على المنحنى التى تناظر t فى $[a, b]$. فإن المشتقة الأولى لجميع الدوال s_i تكون متصلة على $[a, b]$ وتعنى العبارة « المنحنى م أملس » كما تعنى العبارة « المنحنى أملس قطعة قطعة <i>piecewise</i> » أن هذه المشتقات الأول متصلة إلا عند عدد محدود من النقط ، وتكون الدالة قابلة للاشتقاق على كل من يمين ويسار هذه النقطة .</p>	<p>إذا كان المنحنى المعلوم هو قطعاً مكافئاً . كانت النقطة الثابتة هى رأس هذا القطع فإن المنحنى الواقع هو منحنى السيسويد <i>cuspid</i> وإذا كانت معادلة القطع المكافئ هى $y^2 = 4ax$ فإن معادلة هذا المنحنى هى</p> $s = (s_1^2 + s_2^2) + p s_3^2 = 0 \text{ صفراً .}$ <p>منحنى أصلي curve, primitive</p> <p>منحنى تشتق منه منحنيات أخرى ، فمثلاً المنحنى الأصلى $s = 0$ (خط مستقيم) يشتق منه مقلوبه $s = \frac{1}{s}$ (قطع زائد قائم) .</p>
<p>منحنى كروى curve, spherical</p> <p>منحنى يقع بأكمله على سطح كرة .</p>	<p>منحنى تربيعى</p> <p>curve, quadric (or quadratic)</p> <p>منحنى معادلته من الدرجة الثانية .</p>
<p>تخطيط منحنى curve tracing</p> <p>رسم المنحنى بإيجاد نقط عليه. وتستخدم أيضاً فى تحديد شكل المنحنى طرق متقدمة مثل التماثل ، المدى ، الخطوط التقريبية ، استخدام المشتقات لتحديد النقط الحرجة ، والميل والتحدب</p>	<p>منحنى مغلق بسيط</p> <p>curve, simple closed</p> <p>= منحنى « جوردان » Jordan curve</p> <p>فئة من النقط (اثنتان على الأقل) يمكن وضعها فى تناظر أحادى مع نقط دائرة وتكون مثل هذه المجموعة من النقط متصلة وتفقد</p>

الزاوية بين منحنين متقاطعين
curves, angle between two
intersecting



عائلة منحنيات curves, family of
فئة من المنحنيات يمكن الحصول على
معادلاتها من معادلة معلومة بتغيير عدد n من
الثوابت الأساسية المتضمنة في هذه المعادلة ،
وتسمى هذه الفئة عائلة منحنيات ذات n
بارامتر . مثال ذلك :

(١) فئة المنحنيات التي معادلاتها حلول غير
شاذة (حالات خاصة من الحل العام) لمعادلة
تفاضلية من الرتبة n .

(٢) فئة الدوائر المتحدة المركز هي عائلة
منحنيات وحيدة البارامتر ، وهو نصف القطر .
(٣) فئة الدوائر المستوية والتي طول نصف قطر
كل منها يساوى طولاً معلوماً هي عائلة منحنيات
ذات بارامترين هما إحداثيا مركز الدائرة .

(٤) جميع الدوائر في المستوى تمثل عائلة منحنيات
ذات ثلاثة بارامترات .

(٥) فئة القطاعات المخروطية المستوية تكون
عائلة منحنيات ذات خمسة بارامترات .

(٦) فئة جميع المستقيمية المستوية هي عائلة ذات

والتقعر وما إلى ذلك .

نقطة دوران (رجوع) على منحنى
curve, turning point on a

نقطة على المنحنى يتوقف عندها الإحداثى
الصادى عن الزيادة ويبدأ فى النقصان أو يتوقف
عندها الإحداثى الصادى عن النقصان ويبدأ فى
الزيادة . وتكون مثل هذه النقطة نهاية عظمى
أو صغرى للمنحنى .



منحنى ملتو
curve, twisted = curve skew

منحنى فراغى غير مستو ، ويقال للمنحنى
الملتوى أنه من الرتبة n إذا قطع أى مستوى فى
نقط عددها n ، وقد تكون هذه النقط حقيقية
أو تخيلية وقد تكون متفرقة أو منطبقة .

منحنى السرعة والزمن
curve, velocity-time

التمثيل البيانى للعلاقة بين قيمة سرعة جسم
ما والزمن الذى تحسب عنده هذه السرعة .

<p>لكل منهما ومحصران قطعاً متساوية من هذه الأعمدة والمماسان لهما عند نقطتين على نفس العمودى متوازيان .</p>	<p>بارامترين . (٧) فئة المستقيمات المماسية لدائرة معينة هي عائلة منحنيات ذات بارامتر واحد .</p>
<p>منحنيات مسارية curves, path منحنيات تعطى معادلاتها في صورة بارامترية ، ويرسم المنحنى المسارى بالنقط الناشئة عن تغير البارامتر .</p>	<p>منحنيات تكاملية curves, integral عائلة منحنيات معادلاتها هي حلول معادلة تفاضلية معينة ، ومثال ذلك المنحنيات التكاملية للمعادلة التفاضلية $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$ هي عائلة الدوائر $x^2 + y^2 = c^2$ حيث c بارامتر اختياري .</p>
<p>منحنيات دورية curves, periodic منحنيات يتكرر الإحداثى الصادى فيها كلما زاد أو نقص الإحداثى السينى بمقدار معين ثابت . المحال الهندسية للدوال $y = \sin x$ ، $y = \cos x$ هي منحنيات دورية تكرر نفسها كلما زادت قيمة x بمقدار 2π .</p>	<p>منحنيات بارامترية على سطح curves on a surface, parametric إذا كان لدينا سطح $S: x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v)$ حيث u, v بارامتران فإن منحنيات العائلتين $u = \text{ثابت}$ ، $v = \text{ثابت}$ تسميان بالمنحنيات البارامترية للسطح .</p>
<p>منحنيات فراغية curves, space منحنيات قد تكون مستوية أو غير مستوية .</p>	<p>منحنيان متوازيان (فى مستوى) curves, parrallel (in a plane) منحنيان تتناظر نقطتهما على نفس العمودى</p>
<p>زاوية انحنائية curvilinear angle زاوية ضلعاها قوسا منحنيين .</p>	


<p>عند نقطة الأصل . (انظر الشكل) .</p> 	<p>إحداثيات انحنائية خطية curvilinear coordinates (انظر : coordinates, curvilinear) .</p>
<p>والآخر ناب يقع فرعا المنحنى عنده في جانب واحد من المماس المزدوج . مثال ذلك المنحنى $ص = س^2 \pm \sqrt[3]{س^3}$ له ناب من النوع الثانى عند نقطة الأصل . (انظر الشكل) .</p> 	<p>شكل انحنائى curvilinear figure شكل هندسى أضلاعه أقواس منحنيات .</p> <p>حركة انحنائية curvilinear motion حركة نقطة على منحنى .</p>
<p>السيكلويد التحتى ذو الأنياى الأربعة cusps, hypocycloid of four تحت سيكلويد معادلته هى :</p> $\frac{3}{4}س^3 + \frac{3}{4}ص^3 = 1$ <p>وأنيابه الأربعة موضحة بالشكل (انظر : تحت السيكلويد hypocycloid) .</p>	<p>حركة انحنائية حول مركز قوة curvilinear motion about a center of force حركة جسم على منحنى تحت تأثير قوة مركزية مثل حركة الأجسام السهوية حول الشمس .</p>
<p>ناب cusps نقطة مزدوجة ينطبق عندها المماسان للمنحنى ، الناب من نوعين الأول البسيط يكون للمنحنى عنده فرعان على جانبيه المماس المزدوج في جوار نقطة التماس ، مثال ذلك القطع المكافئ نصف التكعيبى $ص^2 = س^3$ له ناب من النوع الأول</p>	<p>ناب cusps نقطة مزدوجة ينطبق عندها المماسان للمنحنى ، الناب من نوعين الأول البسيط يكون للمنحنى عنده فرعان على جانبيه المماس المزدوج في جوار نقطة التماس ، مثال ذلك القطع المكافئ نصف التكعيبى $ص^2 = س^3$ له ناب من النوع الأول</p>

القطع \mathcal{C} من فئة (\mathcal{S}) هو فئة جزئية منها عندما يكون $\mathcal{S} - \mathcal{C}$ غير مترابط . إذا كان القطع \mathcal{C} هو نقطة فإنها تسمى نقطة قطع وإذا كان \mathcal{C} خطأً يسمى خط قطع .

السبرينيات
cybernetics
أحد فروع العلم وجده العالم الرياضى الشهير " ن . فينر N. Wiener " تعميم فيه الخواص المشتركة فى الأنظمة المتنوعة كالمصانع الأوتومية والحاسبات ، والكائنات الحية وتوضع لها نظريات مشتركة .

دورة
cycle
الفترة الزمنية اللازمة لإتمام عملية ضمن سلسلة متتابعة من العمليات أو الفترة الزمنية الواقعة بين أحداث تتكرر بانتظام وعلى العموم فترة تكتمل خلالها عملية تكرارية .

دورة التخزين (فى الحاسب)
cycle, storage (in computer)
التتابع الدورى للعمليات الذى يحدث عند تخزين معلومات أو استدعائها من الذاكرة الرئيسية .




قطع " ديديكند " cut, Dedekind
تجزئ فئة الأعداد القياسية (الكسرية) إلى فئتين جزئيتين غير خاليتين ومتباعدتين \mathcal{L} ، \mathcal{B} بحيث :

- ١ - إذا كان $\mathcal{S} \ni \mathcal{L}$ ، \mathcal{B} ، فإن $\mathcal{S} > \mathcal{B}$ ،
- ٢ - الفئة \mathcal{L} لا تحتوى على أى عنصر يكون أكبر من بقية جميع العناصر (هذا الشرط يمكن إحلاله بالشرط أن \mathcal{B} لا تحتوى على أى عنصر يكون أصغر من بقية جميع العناصر) مثال ذلك \mathcal{L} قد تكون فئة جميع الأعداد القياسية أصغر من ٣ ، \mathcal{B} فئة جميع الأعداد أكبر من أو تساوى ٣ .

قطع فئة cut of a set

غلاف عائلة الكرات التي يمس كل منها ثلاث كرات ثابتة .

cycloid السيكلويد (الدويرى)
المحل الهندسى المستوى لنقطة ثابتة على محيط دائرة تتدحرج على خط مستقيم .
والمعادلتان البارامتريتان للسيكلويد هما :
س = $p(1 - \cos \theta)$ ، ص = $p(1 - \sin \theta)$ (انظر الشكل)



حيث p نصف قطر الدائرة ، θ الزاوية التي يقابلها القوس الواصل بين الموضع الابتدائى للنقطة الثابتة على الدائرة وموضعها عند أى لحظة عند مركز الدائرة ، ومحور السينات هو خط الدحرجة ومحور الصادات العمودى عليه عند الموضع الابتدائى للنقطة الثابتة .
ولنحنى السيكلويد ناب عند كل نقطة يقابل فيها خط الدحرجة (محور السينات) وقد برهن

cyclic change تغيير دورى
تغيير يتم على فترات دورية .

cyclic group زمرة دورية
زمرة تتولد عناصرها من عنصر واحد ، أى الزمرة التى كل عنصر من عناصرها قوة نونية لعنصر واحد يسمى مولد (generator) الزمرة .
وكل زمرة دورية هى بالضرورة زمرة إبدالية .

cyclic interchange تبادل دورى
تبادل يتم على فترات دورية .

تبديل دورى (فى الجبر)

cyclic permutation (in algebra)

(انظر : تبدل دورى .
permutation, cyclic)

cyclic polygon كثير أضلاع دائرى
كثير أضلاع تقع رؤوسه على محيط دائرة .

cyclides of Dupin سيكليد " دوبان "

<p>دالة دورية التماثل cyclosymmetric function دالة لا تتغير بأى تبديل دورى لمتغيراتها مثال ذلك الدالة : $D = (S, V, E) = (S - V)(V - E)(E - S)$</p>	<p>" هيجتز " على أنه إذا انزلق جسيم أملس بدون احتكاك على سلك على هيئة سيكلويد مقلوب فإن زمن وصوله إلى قاع السيكلويد يكون ثابتاً مهما كانت النقطة التى يبدأ منها الجسيم الانزلاق ، وتسمى هذه الخاصية أيضاً بخاصية البندول السيكلويدى .</p>
<p>معادلة سيكلوتومية cyclotomic equation معادلة على الصورة : $S^n + S^{n-1} + \dots + S + 1 = 0$ صفرأ . حيث n عدد أولى ، ومثل هذه المعادلة لا تقبل الاختزال فى حقل الأعداد الحقيقية .</p>	<p>سيكلويد مقتضب (متقاصر) . cycloid, curtate منحنى عجلى ليس له عروات ولا يمس خط القاعدة ومعادلتاه البارامتريتان : $S = 2 - \theta \text{ حـا } \theta , V = 2 - \theta \text{ جـتا } \theta$ حيث $\theta > 2$ ، البارامتر . (انظر : منحنى عجلى trochoid) .</p>
<p>أسطوانة cylinder سطح مغلق يتكون من قاعدتين مستويتين متوازيتين محدودتين بمنحنيين بسيطين مغلقين متطابقين م₁ ، م₂ ، و سطح جانبى يمثل اتحاد جميع القطع المستقيمة التى تصل النقط المتناظرة فى م₁ ، م₂ وجميع هذه القطع توازى خطأ مستقيماً ثابتاً ، ويسمى كل من المنحنيين م₁ ، م₂ دليل الأسطوانة كما تسمى القطع المستقيمة التى تصل بين النقط المتناظرة فى م₁ ، م₂</p>	<p>سيكلويد متطاوول cycloid, prolate منحنى عجلى معادلتاه البارامتريتان هما : $S = 2 - \theta \text{ حـا } \theta , V = 2 - \theta \text{ جـتا } \theta$ حيث $\theta < 2$ ، البارامتر . وهذا المنحنى له عروة بين كل قوسين ، وعقد عند $\theta = 0 , \theta = 2\pi$ حيث $\theta > 0 , \theta < 2\pi$ صفرأ .</p>

إحداثياته الكروية القطبية (r, θ, ϕ) فوق
 فئة من نقط المستوى إحداثياتها (y, x)
 ويعطى بصيغ من النوع :
 $y = r \sin \theta$ ، $x = r \cos \theta$ حيث $r = (x^2 + y^2)^{1/2}$
 صفراً ، $\theta = \arctan(y/x)$ لكل $\phi < \pi$.

راسم أسطواني متساوي التباعد
cylindrical map, even spaced
 راسم أسطواني يعطى بالصيغتين $y = r \sin \theta$ ،
 $x = r \cos \theta$

إسقاط أسطواني مركزي
cylindrical projection, centre
 راسم أسطواني يعطى بالصيغتين $y = r \sin \theta$ ،
 $x = r \cos \theta$. وهو إسقاط لكرة من مركزها فوق
 أسطوانة دائرية قائمة مماسة لها تسطح بعد عملية
 الإسقاط .
 (انظر : راسم أسطواني cylindrical map) .

سطح أسطواني **cylindrical surface**
 سطح مولد بخط مستقيم يتحرك موازياً دائماً
 لخط مستقيم آخر ويقطع منحنى معيناً .
 ويسمى الخط المستقيم المتحرك مولد أو راسم

بالعناصر أو بالرواسم ، وتكون الأسطوانة قائمة
 إذا كان الراسم الجانبي ل عمودياً على مستوى
 القاعدتين . وارتفاع الأسطوانة هو البعد
 العمودي بين مستويي القاعدتين .

أسطوانات دائرية قائمة متشابهة
cylinders, similar right circular
 أسطوانات دائرية قائمة ، النسبة بين نصف
 القطر والارتفاع لكل منها واحدة .

إحداثيات أسطوانية
cylindrical coordinates
 (انظر : coordinates, cylindrical polar) .

دالة أسطوانية **cylindrical function**
 اسم يطلق على كل حل لمعادلة " بيسل"
 التفاضلية ، ويطلق هذا الاسم في بعض
 الأحيان على دوال بيسل نفسها .

راسم أسطواني **cylindrical map**
 راسم أحادي متصل من سطح كروي

مجمع اللغة العربية - القاهرة

السطح الأسطوانى generator أو generatix ويسمى المنحنى دليل السطح الأسطوانى	directrix ، كما يسمى المولد فى أى موضع معين عنصراً element للسطح الأسطوانى .
--	---

صدر لمجمع اللغة العربية المطبوعات الآتى بيانها

١ - المعجمات :

- * معجم ألفاظ القرآن الكريم (ستة أجزاء) .
- * معجم ألفاظ القرآن الكريم (جزءان - الطبعة الثالثة) .
- * المعجم الوسيط (جزءان - قطع صغير وكبير) .
- * المعجم الوجيز (قطع صغير وكبير - تجليد عادى وفاخر) .
- * معجم ألفاظ الحضارة .
- * معجم الكيمياء والصيدلة .
- * معجم الفيزيكا النووية .
- * معجم الفيزيكا الحديثة (جزءان) .
- * المعجم الفلسفى .
- * معجم الهيدرولوجيا .
- * معجم البيولوجيا (جزءان) .
- * معجم الجيولوجيا .
- * معجم علم النفس والتربية .
- * المعجم الجغرافى .
- * معجم المصطلحات الطبية (جزءان) .
- * المعجم الكبير (صدر منه ثلاثة أجزاء) .
- * معجم النفط .

٢ - كتب التراث العربى :

- * كتاب الجيم (أربعة أجزاء) .

- * التنبيه والإيضاح (جزءان) .
- * الأفعال (أربعة أجزاء) .
- * ديوان الأدب (أربعة أجزاء) .
- * الإبدال .
- * الشوارد .
- * التكملة والذيل والصلة (ستة أجزاء) .
- * عجالة المبتدئ وفضالة المنتهى .
- * غريب الحديث (خمسة أجزاء) .

٣ - مجموعة المصطلحات العلمية والفنية (خمسة وثلاثون جزءاً) .

٤ - مجلة مجمع اللغة العربية (أربعة وسبعون عدداً) .

٥ - كتب القرارات العلمية :

- * القرارات العلمية في ثلاثين عاماً .
- * القرارات العلمية في خمسين عاماً .
- * أصول اللغة (ثلاثة أجزاء) .
- * الألفاظ والأساليب (جزءان) .

٦ - محاضرات جلسات مجلس ومؤتمر المجمع حتى الدورة السابعة والأربعون .

٧ - كتب في شئون جمعية مختلفة :

- * المجمعيون .
- * مع الخالدين .
- * مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً .
- * مجمع اللغة العربية في خمسين عاماً .
- * كتاب لغة تميم .

* شرح شواهد الإيضاح .

٨ - إعادة طبع :

تم إعادة طبع الأعداد الخمسة الأولى من مجلة مجمع اللغة العربية .

رقم الإيداع
٩٥ / ٥٠٥٩

مطابع الدار الهندسية

